


# Suicidio en Adolescentes: lo que el Equipo de Salud debe saber



**Dra. Paz Robledo**  
**Hospital Padre Alberto Hurtado**  
**Comité Adolescencia Sochipe**

# CONTENIDOS

- Suicidio
- Intento de Suicidio
- Ideación suicida
- Suicidabilidad
- Estadísticas
- Factores predisponentes y protectores
- Manejo ambulatorio/hospitalario

# Suicidio

- Etimológicamente Suicidio significa “Muerte de sí mismo”
- Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida.
- La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

# Intento de Suicidio:

Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.


# Ideación suicida:

- Pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida expresado en ideas tales como “no querer seguir viviendo”.
- Estas expresiones pueden o no contener la **planificación del suicidio**, que se refiere a cómo, cuando y donde llevar a cabo la conducta de autodestrucción. (Serfaty, 1998)

# Clasificación Ideaciones Suicidas

- **Leve:** sólo ganas de morir
- **Moderada:** ganas de morir con esbozo de planificación
- **Grave:** decisión de morir, con planificación exhaustiva para su concreción.

# Suicidabilidad



Espectro de conductas e impulsos que abarcan desde ideación, planificación, intento suicida y suicidio consumado.

# EPIDEMIOLOGIA

- Tanto para los suicidios como para los intentos de suicidio existe un importante subregistro.
- Por cada muerte por suicidio existirían 7 muertos no notificados (Dolto 1997).




# EPIDEMIOLOGIA

En cuanto a los métodos para consumar el suicidio, dependerán de las realidades locales. En general se han mantenido estables en el tiempo,

- siendo ahorcamiento el más utilizado en Chile sobre el 70% de los casos
- armas de fuego en aproximadamente el 10%
- ingestión de sustancias entre un 8 y 9%.



# Datos Existentes



- Existe un alza sostenida de Intentos Suicidas que requieren hospitalización en ÁREA ssmo 1999: **0,55%** a 2005:**1,78%**
- Tasa suicidio adolescente según INE 2002 adolescente 6,7 c/ 100.000
- En intento suicidio existen diferencias con mundo adulto en relación 6/1 mujer/hombre a 2,9/1 en adolescentes

# **FACTORES DE RIESGO**

- **Factores de Riesgo Generales**
- **Factores Precipitantes o Estresantes (Ulloa,1994; Beautrais,1997)**
- **Significados conductas suicidas**

# Factores Generales Asociados a suicidio consumado

- Sexo masculino 3:1 en adolescentes (Reinherz, 1995, Minsal 1999)
- Riesgo suicida aumenta con la edad (Peterson 1996) > 15 a 19 años (J. AACP 2001)
- Riesgo suicida post- intento es 4 veces > los siguientes 5 años (Kotila y Lonquist 1989)

# Factores de Riesgo Generales

- **Familiares**
- **Patologías Psiquiátricas** : (Kovacs 1993, Shaffer 1996, Stein 1998)
- **Conductas de Riesgo**: (Woods,1997)
- **Ideación Suicida**: (Peterson,1996, Negron,1997)
- **Intento previo y Método utilizado**: (Kotila,1987).
- **Maltrato Infantil y Abuso Sexual**: (Hider,1998)
- **Factores Hereditarios**: (Bell,1998)
- **Enfermedades Físicas**: (Bell, 1998)

# Factores Precipitantes o Estresantes

(Ulloa, 1994; Beautrais, 1997)

- Problemas de conducta y de rendimiento escolar
- Discusiones con familiares y amigos
- Maltrato físico y abuso sexual
- Conflictos interpersonales
- Conflictos con la justicia
- Exposición a conductas suicidas o suicidio de familiares o amigos
- Duelos (pérdida de pareja, fracaso escolar, pérdida de trabajo, muerte de un familiar o amigo, pérdida de alguna capacidad física por accidente o enfermedad).



# Significado

- La fuga
- El duelo ( juego de una perdida )
- El castigo ( culpa )
- Crimen ( otro en la muerte )
- Venganza ( remordimiento a otra persona )
- Chantaje ( presionar a otra persona)
- Sacrificio ( mítico )
- Juego ( control de su vida)



# Intento de suicidio en adolescentes: Riesgo y protectores

Borowski IW, Ireland M, Resnick M. Pediatrics. 2001; 107(3):485-493

- **Factores de riesgo**
  - Intento suicidio previo
  - Actos de violencia
  - Uso OH, drogas
  - Síntomas somáticos
  - Intento suicidio cercano
  - Psicopatología
  - Uso de armas (en hombres)
  - Homosexualidad (en hombres)
- **Factores protectores**
  - Vínculo parental
  - Bienestar emocional
  - Promedio de notas
  - Vínculo escolar
- La presencia de 3 factores protectores reduce el riesgo de suicidio en 70% a 85%, tengan o no factores de riesgo.





# ¿Qué hacer?



# EVALUACION DEL INTENTO SUICIDIO

- La actitud abierta, empática e interesada con el entrevistado, es fundamental para lograr los objetivos.
- Se debe **evitar** la crítica de la conducta o buscar culpables en el relato de los padres y del adolescente.

# Esquema de Intervención en Crisis

(Serfaty 2000)

- Intervención rápida breve, intensiva, integral
- Inclusión de la familia y los amigos
- Rápido abordaje de la situación desencadenante
- Indicación psicofarmacológica
- Acción psicoterapéutica directiva
- Vigilancia permanente del riesgo suicida
- Valoración permanente de la contención familiar y profesional
- Intervención domiciliaria
- Hospitalización

# EVALUACION DEL INTENTO SUICIDIO

## **Objetivos de la evaluación inicial:**

- Identificar potenciales factores individuales, familiares o ambientales que pueden influir aumentando o aminorando las dificultades
- Determinar si existe el riesgo de un reintento a corto plazo, y si factor precipitante persiste
- Recomendar la interconsulta oportuna o en calidad de urgente para su hospitalización y tratamiento, facilitando la colaboración del grupo familiar.

# Áreas a explorar

## Antecedentes personales :

- Género
- Disfunción familiar
- Sistema educacional
- Descartar enfermedad psiquiátrica grave de base como depresión, esquizofrenia.
- Descartar comorbilidad psiquiátrica como abuso de drogas y depresión, T. de conducta y abuso de alcohol.

# Áreas a explorar

## Antecedentes personales :

- Enfermedad crónica y/o discapacidad
- Abuso sexual y maltrato físico y/o psicológico
- Conductas antisociales
- Arresto reciente y/o otros problemas con la justicia
- Persistente ideación suicida después del intento
- Jóvenes institucionalizados (cárcel, hogar de menores)

# Características que le otorgan gravedad al intento:

- No contactó ni notificó auxiliador potencial
- Planificación del intento suicidio
- Dejó nota suicida
- Buscaba la muerte
- Creyó que el intento lo mataría
- Letalidad del método
- El evento desencadenante persiste en forma intensa
- Está descontento de haberse recuperado
- Oculta información durante la entrevista para evitar la ayuda
- Ingirió alcohol o droga para ser capaz del intento



# Antecedentes familiares

- Pérdidas interpersonales
- Violencia intrafamiliar
- Pérdida o ausencia parental
- Antecedentes familiares de intento de suicidio o suicidio consumado
- Psicopatología en los padres
- Inestabilidad y desorganización familiar
- Mala comunicación entre padres e hijos





# Factores sociales



- **Dificultades en la adaptación y mal rendimiento escolar.**
- **Mal control de medicamentos y armas de fuego.**
- **Creencias religiosas y culturales que no se oponen al suicidio.**
- **Publicidad exagerada respecto al tema del suicidio de personas destacadas.**
- **Suicidio adolescente cercano**

# Examen Pacientes

- Evaluar apariencia, desarrollo global y específico
- Evaluar como responde a los estímulos
- Lenguaje
- Cognición
- Afectos
- Interacción social



# Examen Pacientes

- Signos de enfermedad depresiva
- Signos de enfermedad orgánica que predisponen a la aparición de un cuadro depresivo (hipotiroidismo, hipercortisolismo, trastorno neurológico)
- Signos de enfermedad física crónica, cuya existencia puede desencadenar el cuadro
- Signos y síntomas autonómicos de manifestaciones ansiosas
- Signos de maltrato o abuso sexual reciente
- Signos de abuso de drogas
- Señales o marcas del método usado en el intento suicidio reciente
- Cicatrices o intentos previos

# Manejo Ambulatorio

- Acoger al adolescente.
- Explicar al adolescente que dada la gravedad del hecho, no se podrá aplicar el principio de confidencialidad, como medida de protección de su propia vida.
- Si no existe riesgo vital se realizará anamnesis actual, remota y examen mental destinados a evaluar el intento.

# Manejo Ambulatorio

- Contactar a la familia y evaluar la situación familiar. Jamás el adolescente deberá irse sin evaluar el compromiso familiar.
- Realizar con el adolescente un ***Contrato Escrito de No Suicidio***, firmado por el adolescente, en que se compromete a no atentar contra su vida. Este contrato también debe ser firmado por un familiar responsable.

# Manejo Ambulatorio

- Entregar indicaciones específicas a la familia para eliminar o poner a resguardo todo objeto potencialmente letal, de manera de disminuir el riesgo de un nuevo intento y responsabilizar a la familia del cuidado del adolescente.
- Comprobar que exista en el hogar alguien que sea un soporte efectivo y afectivo (informado de los pasos a seguir en caso de urgencia), con sistema de vigilancia (no se quede solo).

# Manejo Ambulatorio

- Alertar al paciente y a la familia de los efectos desinhibitorios sobre la conducta, que tienen el alcohol y las drogas.
- **Todos los pacientes con intento suicidio que no son hospitalizados se deben derivar con interconsulta al Equipo de Salud Mental a la brevedad y/o Programa de Salud Adolescente que funcionen en su red de salud.**

# En caso de llegar a Servicio de Urgencia

- Estabilizar en caso de riesgo vital: ABC
- Explorar intencionalidad acto y persistencia ideación suicida
- Evaluar gravedad del intento
- Explorar factores de riesgo
- **SIEMPRE** se debe contactar a la familia y determinar la capacidad de manejo familiar .



# Criterios de Hospitalización:

(Shaffer, 1994)

- Todo paciente con **riesgo vital** producto del intento suicida quedará hospitalizado en Area de Cuidados Críticos : (ABC).
- **Género:** Se debe hospitalizar todo varón con intento o mujer con intento recurrente, o que considera seriamente quitarse la vida y carece de apoyo familiar.
- **Estado Mental:** Depresión moderada a severa con alta desesperanza, Psicosis y deseo profundo de muerte.

# Criterios de Hospitalización:

(Shaffer, 1994)

- **Naturaleza del intento:** Medidas violentas (ahorcamiento, salto al vacío, herida por arma de fuego, cortes profundos), intento serio por ingestión (antidepresivos, cáusticos, insecticidas)
- **Antecedentes individuales:** Intento de suicidio previo, impulsividad marcada
- **Antecedentes del hogar:** Familia disfuncional, ausencia de adulto responsable en el hogar, desinterés familiar por el joven

# Indicaciones durante la hospitalización

- Una vez que el paciente esté fuera de riesgo vital debe ser evaluado al igual que sus familiares por el Equipo de Salud Mental y Asistente Social.
- Mientras permanezca hospitalizado en sala se le debe otorgar **vigilancia permanente**. La sala debe estar cerca de enfermería, las ventanas deben tener seguro y la puerta del baño no debe tener llave.
- Al alta debe tener hora dada en Salud Mental (psicología o psiquiatría o ambas según indicación) e idealmente en Programa de Adolescentes.



¿Preguntas?

FIN

