


ANTICONCEPCIÓN PARA ADOLESCENTES

Dra. Soledad Díaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
Santiago, Chile, 2017



ANTICONCEPCIÓN PARA ADOLESCENTES

Contenidos de esta presentación:

- **Consideraciones éticas y legales y confidencialidad**
- **Denuncia de actividad sexual**
- **Vida sexual, embarazo y uso de anticoncepción en la adolescencia**
- **Aspectos biomédicos**
- **Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS**
- **Opciones anticonceptivas para adolescentes**
- **Condiciones especiales**
- **Orientación y consejería**
- **Servicios de regulación de fertilidad para adolescentes**

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES Y CONFIDENCIALIDAD

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES

- La legislación actual reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, debiendo estimularse el goce efectivo de sus derechos en función de su etapa evolutiva.
- No se puede condicionar la entrega de anticoncepción a las y los adolescentes según la aprobación de los padres.

CONFIDENCIALIDAD

- El Código Penal Chileno considera la violación del Secreto Profesional como un delito.
- La Ley 20.418 que “Fija las normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de Regulación de la fertilidad”, garantiza la protección de la confidencialidad sin discriminación de ningún tipo, por lo que **la edad no es condición para romper la confidencialidad.**
- La única excepción es la anticoncepción de emergencia en menores de 14 años: se le deberá entregar el método para luego informar a su padre, madre o adulto responsable que ella defina.

DENUNCIA DE ACTIVIDAD SEXUAL

- La ley 20.418 señala que, si al momento de solicitarse un anticonceptivo de emergencia se presume la existencia de un delito sexual, se deberá entregar los antecedentes al Ministerio Público.
- Esta denuncia **es para proteger a una posible víctima** y no limita o modifica la atención que debe entregársele a la joven.
- Esta atención incluye anticoncepción de emergencia y la protección contra una ITS.


DENUNCIA DE ACTIVIDAD SEXUAL

- La Ley 19.927 establece que las personas menores de 14 años no tienen capacidad para consentir la actividad sexual y sanciona a quien tiene actividad sexual con un/a menor de 14 años.
- No se puede proceder penalmente cuando la diferencia de edad es hasta dos años de en el delito de violación y tres años en otros delitos sexuales.
- No hay señales de un delito por actividad sexual en el caso de una niña menor de 14 años que solicita anticonceptivos para prevenir un embarazo. Esta solicitud sólo hace **explícita la posibilidad o intención de tener actividad sexual, lo cual no es constitutivo de delito por lo que la necesidad de denunciar no se aplica.**

CONDUCTA SEXUAL Y USO DE ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES

INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL

48% de adolescentes entre 15 y 19 años declara haber iniciado su vida sexual




Fuente: VI Encuesta Nacional de la Juventud, INJUV 2009

USO DE ANTICONCEPTIVOS

Primera relación sexual	51,4
Última relación sexual	74,3

- Mayor uso en
- Segmento ABC1 vs segmento E
- Educación universitaria o técnica superior vs educación secundaria e inferior
- Zonas urbanas vs zonas rurales


USO MÉTODO DE PREVENCIÓN PRIMERA RELACIÓN SEXUAL SEGÚN SEXO, NIVEL SOCIOECONÓMICO, TRAMO ETARIO, LOCALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO
Muestra: Iniciados/as sexualmente (Porcentajes)



Fuente: Sexta Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2009)

Fuente: VI Encuesta Nacional de la Juventud, INJUV 2009


Razón de fecundidad en menores de 15 años y Tasa fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, Chile 2005- 2014




Fuente: Elaboración propia Depto. Ciclo Vital, Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes, a partir de base de datos DEIS, 2016, INE, 2016. (Para el período 2005-2011 se utilizó la base de proyecciones poblacionales Censo 2002, para el período 2012-2014, la base de proyecciones poblacionales Censo 2012).

PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS DE MADRES ADOLESCENTES


Comunas de la Región Metropolitana, año 2006



GSE BAJO



GSE ALTO



TASA DE EMBARAZO POR 1000 MUJERES DE 15 A 19 AÑOS SEGÚN COMUNA (2006)

< 15		> 100	
Vitacura	2,91	Alhué	212
Las Condes	10,43	A. Carmen	188
Providencia	11,49	A. Biobío	131
Dinamarca	5,5	RD Congo	135
Suecia	5,9	Bangladesh	133
Italia	6,5	Burkina Faso	130
Alemania	9,2	Camerún	127
Noruega	9,5	Gambia	104

NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE



Año	Total	Edad de la madre (años)			
		<15	15-19	20-34	≥35
2007	240.569	955	38.650	162.754	38.165
2014	250.997	852	29.454	177.999	42.692

16.4% → 12.07%

RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

- **Criterios médicos de elegibilidad (CME) para el uso de los métodos anticonceptivos**
- **Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas (RPS) para el uso de los métodos anticonceptivos**

Estas recomendaciones representan el consenso de las agencias que trabajan en salud reproductiva.



ASPECTOS BIOMÉDICOS Y RECOMENDACIONES DE LA OMS A CONSIDERAR PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES



CATEGORÍAS USADAS EN LOS CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD (CME) DE LA OMS

Si una condición se clasifica en:

- ***Categoría 1:*** No hay limitaciones para el uso del método.
- ***Categoría 2:*** Las ventajas de usar el método superan los posibles riesgos.
- ***Categoría 3:*** Los posibles riesgos superan las ventajas de usar el método.
- ***Categoría 4:*** El uso del método representa un riesgo inaceptable.

CME PARA LA ELECCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES: EDAD

Categoría 2:

- Menor de 18 años implica cautela en el uso de DMPA por su efecto en el metabolismo óseo.
- Menor de 20 años, nulípara, requiere considerar el riesgo de expulsión del DIU y su asociación con infecciones pélvicas.



Categoría 1:

- La edad no es factor que limite el uso de otros métodos.

CME PARA LA ELECCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES: PARIDAD

Categoría 2:

En la nuligesta, considerar:

- El retraso en recuperación de la fertilidad y el riesgo para la masa ósea con DMPA .
- El riesgo de expulsión e IP con el uso de DIU.



Categoría 1:

- Si hay antecedente de embarazo, no hay restricción en la elección .

**EVIDENCIA CIENTÍFICA QUE APOYA LOS
CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD DE LA
OMS PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS EN
ADOLESCENTES**

BENEFICIOS PARA LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES Y USO DE ACO

Reducción del riesgo de:

- **Anemia**
- **Infecciones pélvicas**
- **Síndrome premenstrual**
- **Cáncer ovárico**
- **Cáncer del endometrio**



Peralta O, Díaz S. Anticoncepción hormonal combinada. En Ginecología, 4ta Edición. (ed.) A. Pérez Sánchez. Editorial Mediterráneo Ltda. Santiago, Chile. Pp. 809-826. 2014.

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS Y RIESGO DE CANCER DE OVARIO y ENDOMETRIO

CANCER	USO	RIESGO RELATIVO
Ovario*	Todo	0.7
	5 años	0.5
	10 años	0.2
Endometrio*	1 año	0.8
	4 años	0.5

**La protección se mantiene por >10 años después del uso*



Adaptado de WHO Technical Report Series. Oral Contraceptives and Neoplasia, 1992 y Lancet 347:1713, 1996

USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS (ACOS) EN ADOLESCENTES: PREOCUPACIONES

- **Maduración del eje hipotálamo-pituitaria-ovario**
- **Enfermedades cardiovasculares**
- **Cáncer de mama y cuello uterino**



MADURACIÓN DEL EJE HIPOTALAMO-PITUITARIA-OVARIO Y USO DE ACO

- ***Sujetos:*** 103 adolescentes 2-5 años después de la menarquia, que usaron ACO (50 y 30 ug EE) por 3 a 24 meses y 17 adolescentes no-usuarias.
- ***Resultados:*** Frecuencia igual de ovulación, niveles similares de estradiol, progesterona, FSH y LH, igual respuesta a LHRH.
- ***Conclusión:*** El uso de ACO no afecta la maduración del eje hipotálamo-pituitaria-ovario.



Rey-Stocker et al. Pediatr Ann 1981;10:480-5

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES ARTERIALES Y USO DE ACO

- **Infarto del miocardio, accidente vascular (AV) cerebral hemorrágico: no están asociados al uso de ACO en mujeres jóvenes, sanas, no fumadoras, con presión arterial normal.**
- **AV cerebral isquémico: el uso de ACO en adolescentes tiene un riesgo extra de cerca de 1 por 1,000,000.**



*WHO Technical Report Series 877. 1998. WHO
Farley et al. Contraception 1998;57:211-30*

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y USO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS: PÍLDORAS, ANILLOS Y PARCHES

- En adolescentes, la Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) es el único riesgo cardiovascular y el uso de hormonales combinados tiene un riesgo extra de 5 a 10 por 100.000.
- El riesgo **depende del progestágeno**: menor con levonorgestrel y mayor con desogestrel, gestodeno, drospirinona y acetato de ciproterona.



WHO, Lancet 1996, 346:1582; Van Hylckama y cols, BMJ 2009,339:b2921, Lidegaard y col, BMJ 2009,339:b2890; Jick SS, Hernandez RK BMJ 2011;340:d2151; Parkin L y cols BMJ 2011;340:d2139

CANCER DE MAMA Y USO DE ACO

El riesgo relativo de cáncer de mama durante el uso de ACO es de 1.24 y se expresa hasta 10 años después de discontinuar.

El riesgo extra asociado al uso de ACO entre los 16 y 19 años es mínimo:

- **0.5 por 10,000 en mujeres de países desarrollados**
- **0.25 por 10,000 en mujeres de países en desarrollo**



*Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer.
Lancet 1996; 347: 1713-27.*

CANCER CERVICAL Y USO DE ACO

Los estudios muestran que el uso de ACO por más de 5 años se asocia a un incremento en el riesgo relativo de cáncer cervical **sólo en mujeres infectadas con tipos oncogénicos del virus del papiloma humano (2.8, IC 1.5-5.4).**



WHO. Cervical cancer, oral contraceptives and parity.

WHO WER77:167-8, 2002

USO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS

Se considera que la información disponible para los anticonceptivos combinados orales se puede aplicar a la anticoncepción combinada administrada en inyectables mensuales, anillos vaginales y parches transdérmicos.



USO DE PROGESTAGENO SOLO EN ADOLESCENTES: MASA OSEA

- **La masa ósea se acumula en la adolescencia.**
- **El uso de DMPA atrasa la acumulación fisiológica de hueso y no se sabe si esto es totalmente reversible.**



- **Los implantes y la píldoras de progestágeno solo no afectan la masa ósea.**



Cundy 1991;Petitti 2000; Cromer 1996; Scholes, 2005;
Lara-Torre, 2004; Cromer BA, 2004; Beksinska, 2007.

USO DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (AE) EN ADOLESCENTES

- Es el **único** método anticonceptivo que las adolescentes pueden usar después de una relación sexual sin protección para prevenir un embarazo no deseado.
- Es el **único** método anticonceptivo para prevenir un embarazo en casos de violación.
- Puede usarse en el caso de una relación en que se usó un anticonceptivo cuando ocurrió un accidente con éste (como rotura del condón, olvido de las pastillas, expulsión del DIU).
- No debe usarse como método anticonceptivo de uso regular porque es menos efectiva que la anticoncepción de uso regular.
- No tiene contraindicaciones.



USO DE DIU EN ADOLESCENTES: PREOCUPACIONES

- **Infecciones pélvicas (IP)**
- **Expulsión del DIU**



RIESGO DE IP EN ADOLESCENTES

- **En mujeres sexualmente activas, la tasa de hospitalización por IP es 2 a 3 veces mayor en adolescentes que entre los 25-29 años.**
- **Esto puede ser por razones sociales, conductuales y biológicas.**



Bell et al. Sex Transm Dis 1984;11:291-5. Westrom et al. In Holmes & Mardh eds. International perspectives on neglected sexually transmitted diseases. New York: McGraw-Hill, 1983; 235-50.

EXPULSIÓN DE DIU EN ADOLESCENTES

- **20 expulsiones por 100 inserciones (T-Cu 200, 7-Cu, 226 adolescentes nulíparas, Suecia)¹**
- **18 expulsiones por 100 inserciones (7-Cu, 120 adolescentes, 81% nulíparas, EEUU)²**
- **Expulsiones más altas en adolescentes madres que en adultas, pero sin diferencia significativa (T-Cu 200B, Brasil)³**



¹Weiner et al. *Br Obstet Gynaecol* 1978;85:204-6

²Kulig et al. *J Pediatr* 1980;96:746-59.

³Díaz et al. *Contraception* 1993;48:23-8

EXPULSIONES Y EXTRACCIONES POR SANGRADO/DOLOR SEGÚN PARIDAD

En mujeres nulíparas, las expulsiones y las extracciones, ocurren con mayor frecuencia que en las mujeres que han tenido un parto previo.

En 20 artículos revisados, se describe una diferente distribución de expulsiones o extracciones en relación a la paridad de las usuarias:

	Nulípara	Parto previo
	(N de artículos con mayor tasa según población)	
Expulsiones	13	4
Extracciones	15	3



Hubacher D. Contraception 75 (2007) S8-S11

USO DE METODOS DE BARRERA EN ADOLESCENTES

- **El uso consistente y correcto del condón masculino protege contra las ITS y el VIH, es el único anticonceptivo que lo hace.**
- **La eficacia anticonceptiva se ve afectada por el uso inconsistente o incorrecto.**
- **La seguridad no es problema.**



CONDÓN MASCULINO: Protección contra infección por VIH

Uso de Condón	Parejas (N)	Seroconversión Tasa por 100 años/persona
Consistente	124	0.0
No consistente	121	4.8 (2.5-8.4)



Adaptado de De Vicenzi I. N Engl J Med 331:341, 1994

USO DE OTROS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES

- **Condón femenino: no hay estudios en adolescentes.**
- **Coito interrumpido, espermicidas, diafragma: su eficacia es baja.**
- **Abstinencia periódica: la práctica puede ser difícil.**



USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES : RESUMEN

- **Los métodos hormonales combinados (orales, inyectables anillos vaginales y parches transdérmicos) y los progestágenos solos (pastillas e implantes) son seguros y efectivos.**
- **El condón masculino es efectivo y seguro y es el único método que protege de ITS y VIH si se usa en forma consistente y correcta.**
- **La AE es segura pero menos efectiva que la anticoncepción de uso regular.**

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES : RESUMEN

- **DMPA es efectiva, pero no la primera elección por el posible efecto en la masa ósea.**
- **Los DIU son efectivos y son una buena elección para adolescentes con hijos y pareja estable; en nulíparas: considerar riesgo de expulsiones y de IP.**


SEGURIDAD Y EFICACIA

La *eficacia* del anticonceptivo y la *consistencia de uso* son aspectos importantes de la seguridad, en especial, donde y cuando el aborto inducido es de riesgo por lo que los métodos se muestran ordenados de acuerdo a su eficacia.

Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos

Más efectivo

Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año




Implantes



DIU




**Esterilización
femenina**



Vasectomía




Inyectables



Píldoras, anillos, parches




**Método de la Amenorrea de
Lactancia- (MELA)**



Condón masculino



Diafragma



Condón femenino



Métodos de abstinencia periódica



Espermicidas

Menos efectivo

Aproximadamente
30 embarazos por
cada 100 mujeres
en un año

OPCIONES ANTICONCEPTIVAS PARA ADOLESCENTES

Métodos muy efectivos:

- **Implantes de progestágeno solo (C1 de los CME)**
- **Dispositivo Intrauterino (C2 de los CME)**


Tasas de continuación al año de uso entre 72% y 88% en jóvenes menores de 20 años (estudio Choice, EEUU)*

*Mestad et al, Contraception 84 (2011):493-498

OPCIONES ANTICONCEPTIVAS PARA ADOLESCENTES

Métodos efectivos:

- Inyección combinada mensual (C1)
- Inyectables de progestágeno solo (C2)
- Píldoras combinadas (C1)
- Anillos vaginales combinados (C1)
- Parches combinados (C1)
- Pastillas de progestágeno solo (C1)
- Condón masculino de látex (C1)
- Anticoncepción de emergencia (C1)



Tasas de continuación al año de uso alrededor del **54%** en jóvenes menores de 20 años (estudio Choice, EEUU).*

*Mestad et al, Contraception 84 (2011):493-498

OPCIONES ANTICONCEPTIVAS PARA ADOLESCENTES

Métodos poco efectivos:

- **Condón femenino**
- **Diafragma**
- **Coito Interrumpido**
- **Espermicidas**
- **Abstinencia periódica**

CONDICIONES ESPECIALES

- La patología psiquiátrica, discapacidad o adicción a drogas pueden interferir con el uso correcto y consistente de ciertos métodos y es recomendable el uso de implantes de progestágeno solo o de inyectables combinados mensuales.
- El DIU es una opción muy efectiva si se usan medicamentos que interfieran con la eficacia de los métodos hormonales y si no hay conductas que pongan a la adolescente en riesgo de ITS. En este caso, también puede considerarse el inyectable de progestágeno solo.

SERVICIOS DE REGULACIÓN DE FERTILIDAD PARA ADOLESCENTES

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA

Objetivos

- **Apoyar a las y los adolescentes, solos o en pareja, en la toma de decisión para escoger un anticonceptivo eficaz.**
- **Fomentar el reconocimiento de la actividad sexual protegida con doble método.**
- **Identificar las conductas sexuales de riesgo, fortaleciendo la necesidad de autocuidado y cuidado mutuo.**

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA

Utilizar un modelo no directivo centrado en el o la adolescente donde el o la profesional es un facilitador del proceso de cambio.

Respetar la confidencialidad de acuerdo a la Ley 20.418 que establece que la edad no es condición para romper la confidencialidad.

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA

Aspectos que hay que explorar y considerar en el desarrollo de la consejería:

- **Aspectos biomédicos**
- **Situación familiar**
- **Actitudes y comportamiento**
- **Aspectos culturales y religiosos**
- **Aspectos de género**
- **Relación con los profesionales de salud**

REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN DE FERTILIDAD PARA ADOLESCENTES

- **Es importante la calidad de atención, que los servicios sean de fácil acceso, gratuitos o de muy bajo costo y que garanticen la privacidad y confidencialidad.**
- **El personal debe estar entrenado en aspectos técnicos, de comunicación y en educación sexual.**

REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN DE FERTILIDAD PARA ADOLESCENTES

- La actuación de las/los profesionales se debe basar en el respeto a la persona, en su integridad, en un marco de derechos.**
- Son esenciales las actitudes que favorecen el diálogo, la empatía y acogida, dar refuerzo positivo a quienes consultan y escuchar activamente, con un lenguaje corporal que demuestre interés y aceptación.**

CONCLUSIÓN

- **Las adolescentes pueden usar la mayoría de los métodos anticonceptivos disponibles sin daño para su salud.**
- **Las opciones más adecuadas para cada adolescente dependen de su situación de vida.**
- **Identificar la mejor opción depende de la calidad de los servicios disponibles.**

Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl