


**PREPARANDO LA INTRODUCCION DE LAS
VACUNAS CONTRA EL VPH:
ORIENTACION PARA POLITICAS Y
PROGRAMAS DE LOS PAÍSES**

UNFPA/WHO, 2006

Dra. Soledad Díaz

Instituto Chileno de Medicina reproductiva





<http://www.who.int/reproductive-health/new/index.html>


EL DOCUMENTO DE OMS/FNUAP

- 1. **Introducción**
- 1.1 **Cáncer Cervical e Infección por VPH**
- 1.2 **Vacunas contra el HPV**
- 1.3 **Poblaciones objetivo para la Inmunización contra HPV**
- 2. **Características Innovadoras de la Vacuna contra HPV**
- 2.1 **Tecnología Inusual**
- 2.2 **Tecnología Cara**
- 2.3 **Tecnología Desafiante**
- 2.4 **No se trata de lo usual**
- 3. **Preparando la Introducción de la Vacuna contra HPV**
- 3.1 **Abogacía, Información y Comunicación**
- 3.2 **Entrega de los Servicios**
- 3.2.1 **Llegando a las Poblaciones Objetivo**
- 3.2.2 **Implicancia para los Programas de SSR**
- 3.2.3 **Colaboración entre los programas**
- 3.2.4 **Monitoreo y Evaluación**
- 3.3 **Liderazgo y Financiamiento**
- 4. **Epilogo**



ICMER

EVOLUCION DE LA INFECCION Y POBLACION OBJETIVO



POBLACIONES OBJETIVO

- Al definir las es esencial considerar que la infección por el VPH se transmite por vía sexual y que habitualmente se adquiere en los primeros años después del inicio sexual.
- Por lo tanto, idealmente, la vacunación debe hacerse antes del inicio de la vida sexual, antes de la exposición al VPH.



POBLACIONES OBJETIVO

Las vacunas probablemente se registrarán para mujeres entre 9 y 26 años. Este rango se debe subdividir en dos categorías:

- Población objetivo primaria: niñas entre 9 y 13 años según la edad de inicio sexual
- Segundo grupo: mujeres en las edades siguientes (catch-up group)



OTRAS POBLACIONES OBJETIVO

- Hombres: las vacunas entregarían un beneficio directo por prevenir cánceres ano-genitales relacionados con VPH 16/18
- Grupos más jóvenes (<9 años): la vacunación sería más fácil de incorporar a los programas de inmunización existentes (no hay estudios en estas edades)
- Personas infectadas con VIH: no se conoce la eficacia y seguridad de la vacuna en estas personas pero hay estudios en curso
- Embarazadas: no se conoce la eficacia y seguridad de la vacuna en ellas
- Mujeres >25 años y en las que tienen o han tenido una infección con VPH 16 o 18: hay estudios en curso para evaluar los efectos de la vacuna en estos grupos

INTRODUCCION DE LAS VACUNAS

Requiere de la participación del sector público y privado:

- Programas nacionales de inmunización, de control de cáncer, de prevención de VIH, de salud sexual y reproductiva, de salud de adolescentes y de la mujer.
- Organizaciones de la sociedad civil interesadas en la salud de las mujeres y en la prevención de cáncer e ITS/VIH.
- Industria farmacéutica



INTRODUCCION DE LAS VACUNAS

- La población objetivo es diferente de la habitual para programas de vacunación
- Algunos de los mensajes de promoción se ubican en la esfera de las conductas sexuales
- Es la primera vez que los programas de salud sexual y reproductiva trabajarían con una vacuna
- El uso de las vacunas contra el VPH requiere nuevos enfoques para la entrega de servicios



ABOGACIA, INFORMACION Y COMUNICACION

La introducción de las vacunas contra el VPH, su promoción y la entrega de servicios debe basarse en consideraciones específicas para cada país sobre lo que es posible hacer y financiar y lo que es culturalmente aceptable.

Vacunar niñas contra el cáncer o contra una ITS puede ser un tema sensible en algunos países y hay que evitar que sea contraproducente para los programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes.



ABOGACIA, INFORMACION Y COMUNICACION

- Debe hacerse con mensajes complementarios sobre la postergación del inicio sexual, uso de condón para la prevención de ITS/ VIH y pesquisa precoz y tratamiento oportuno del cáncer cervical.
- El programa informativo para la educación del público debe incluir VPH, cáncer cervical y otros cánceres y enfermedades relacionados con el VPH y para explicar los beneficios y limitaciones de las vacunas.



ENTREGA DE SERVICIOS: UNA MIRADA INTEGRAL

- La entrega de la vacunas contra el VPH a niñas antes del inicio sexual ofrece una oportunidad única para realizar otras acciones de educativas y de prevención en salud en este grupo difícil de acceder.
- La vacunación debe usarse como mecanismo para reforzar los programas y servicios existentes para adolescentes ya que intervenciones en un área pueden tener un impacto positivo en otras.



ENTREGA DE SERVICIOS: UNA MIRADA INTEGRAL

- Las contribuciones que los programas nacionales de inmunización, salud sexual y reproductiva y control de cáncer pueden hacer al preparar la introducción de las vacunas contra el VPH a nivel nacional.
- La necesidad de integrar la información sobre las vacunas en la educación en los colegios sobre sexualidad, prevención de VIH/SIDA, nutrición, prevención de tabaquismo y drogas.



TEMAS PENDIENTES

Tópicos en estudio que son particularmente relevantes para los programas y servicios:

- Eficacia a largo plazo
- Duración de la inmunidad y necesidad de re-vacunar
- Inmunogenicidad, seguridad y eficacia en poblaciones específicas, como embarazadas y personas con inmunidad comprometida



LOS DESAFIOS

La vacuna VPH es una necesidad crítica de salud pública para todas las mujeres, especialmente para las más pobres en los países menos desarrollados

- ¿Como tendrán esas mujeres **acceso equitativo** a vacunas **que se pueda financiar** en dichos países?
- ¿Habrán **cantidades adecuadas** de vacuna para los programas de los países en desarrollo?



LOS DESAFIOS


- ¿Cómo se incorporará la introducción de las vacunas contra el VPH en los programas existentes?
- ¿Qué mensajes son los mas adecuados: vacuna contra el cáncer o vacuna contra una infección de transmisión sexual?
- ¿Cómo integrar los roles y responsabilidades de diferentes actores que no han colaborado en el pasado?




**¿SON ADECUADAS ESTAS
RECOMENDACIONES
PARA CHILE?**



RESULTADOS ENCUESTAS NACIONALES EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES SEGUN NIVEL SOCIOECONOMICO



RESULTADOS ENCUESTAS NACIONALES PORCENTAJE DE ALUMNOS/AS de 7° BÁSICO A 1° MEDIO QUE HA TENIDO RELACIONES SEXUALES ALGUNA VEZ EN LA VIDA



Fuente: MINSAL/OMS (2006). ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD ESCOLAR, CHILE 2004
<http://epi.minsal.cl/epi/html/frames/frame3.htm>

INFECCION POR VPH EN CHILE




Figure 1. A. Prevalence of HR HPV by age groups among 955 women (Chile, 2000). Nonparametric regression and 95% CIs. **B.** Prevalence of LR HPV by age groups among 955 women (Chile, 2000). Nonparametric regression and 95% CIs.

Ferreccio C y cols, 2004

LA INTERROGANTE

¿CÓMO PRESENTAR LA VACUNA EN CHILE?

¿Prevención de una infección transmisible por vía sexual?

¿Prevención del cáncer cervical?



EL OBJETIVO FINAL: SALVAR LA VIDA DE MILLONES DE MUJERES

Para combatir el cáncer cervical, la mejor estrategia es combinar la vacunación, la detección precoz y el tratamiento oportuno del cáncer.

