

ANTICONCEPCIÓN EN MUJERES EN PERIODO POST-PARTO

Dra. Soledad Díaz

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva¹

El intervalo entre los embarazos es importante para la salud de las madres, ya que les permite recuperarse del embarazo y parto y del esfuerzo que requiere la atención de niños y niñas. La duración de la lactancia materna y del intervalo entre los embarazos son determinantes para la calidad de vida de los y las recién nacidos/as, especialmente en los países en vías de desarrollo. La anticoncepción post-parto contribuye a prolongar el intervalo entre los embarazos.

Las mujeres y las parejas, adecuadamente informadas, pueden decidir acerca de la lactancia y anticoncepción en la forma más conveniente para su situación y sus necesidades. Es importante considerar que el temor a otro embarazo, la necesidad de la mujer de reincorporarse a su trabajo remunerado, sus condiciones de salud y las presiones familiares, sociales o económicas influyen en la duración de la lactancia y en la decisión de cuando iniciar un método anticonceptivo.

Las recomendaciones para el uso de métodos anticonceptivos que se describen son distintas para las mujeres que amamantan y las mujeres que no amamantan.

ANTICONCEPCIÓN PARA LA MUJER QUE NO AMAMANTA

La fertilidad se recupera rápidamente en las mujeres que no amamantan y la primera ovulación se produce entre cuatro semanas y dos meses después del parto. Cuando una mujer no amamanta, puede usar cualquier método anticonceptivo de su elección, si no hay condiciones de salud que restrinjan su uso. Los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS para este grupo de mujeres son los siguientes:

- Los anticonceptivos orales combinados deben iniciarse después de las 3 semanas post-parto para evitar riesgo de trombosis.
- Los métodos de progestágeno solo (pastillas, inyecciones o implantes) no tienen este problema y pueden iniciarse en cualquier momento.

¹ Este capítulo forma parte de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile

- Los dispositivos intrauterinos pueden insertarse después de las cuatro semanas post-parto, teniendo precauciones especiales por la condición del útero en esta etapa de involución. La inserción en el post-parto inmediato, apenas se ha expulsado la placenta, es un procedimiento seguro si lo practica personal debidamente entrenado. El DIU no debe insertarse entre las 48 horas y las 4 semanas post-parto. Deben seguirse las recomendaciones generales (categorías 3 y 4) descritas en la sección sobre DIU.
- El uso de los métodos de barrera puede iniciarse en cualquier momento. Los métodos de barrera, especialmente el condón, protegen del embarazo y de las infecciones transmitidas durante el acto sexual. Dado que la eficacia anticonceptiva de estos métodos depende de que se usen correctamente en todas las relaciones sexuales, las mujeres y sus parejas deben recibir instrucciones claras de cómo usarlos y guardarlos. Si una mujer ha usado previamente el diafragma y quiere usarlo después del parto, se debe evaluar nuevamente la medida anatómica ya que la vagina puede haber variado por los cambios corporales que ocurren con el embarazo y parto.
- Los métodos basados en el reconocimiento de los signos y síntomas de la fertilidad, como el método de la ovulación, se pueden aprender y usar cuando se reinician los ciclos menstruales.
- La esterilización quirúrgica de la mujer es un procedimiento más simple en el post-parto temprano que durante otras etapas de su vida reproductiva, siempre que se realice en condiciones adecuadas por un equipo debidamente entrenado. Se puede practicar en los primeros 7 días y después de los 42 días, pero debe postergarse entre los 7 y los 42 días porque hay más riesgos. También se debe postergar en casos de pre-eclampsia severa, rotura de membranas por más de 24 horas, infecciones o hemorragia severa. Se requiere consentimiento informado y que la orientación sobre este método y la elección de la mujer se haga con tiempo suficiente, durante el embarazo, y que no sea una decisión tomada bajo la presión de las circunstancias que rodean al parto.

ANTICONCEPCIÓN PARA LA MUJER QUE AMAMANTA

En el caso de la mujer que amamanta, hay consideraciones adicionales para el uso de los métodos anticonceptivos, ya que no deben interferir con la lactancia ni el crecimiento de los/as niños/as.

Métodos no hormonales

Los métodos no hormonales se consideran la mejor opción para la mujer que amamanta, ya que no interfieren con la lactancia ni el crecimiento de los/las lactantes y tampoco implican la transferencia de esteroides a través de la leche.

Amenorrea de lactancia

La amenorrea de lactancia ofrece una protección anticonceptiva muy alta a las mujeres que están en lactancia exclusiva, con tasas de embarazo menores de 1% en los primeros seis meses post-parto. Los/as prestadores/as de servicios deben tener claro que:

- La eficacia anticonceptiva disminuye rápidamente después del primer sangrado post-parto, con la introducción de alimentación suplementaria y cuando se cumplen seis meses post-parto. Cuando ocurre cualquiera de estas condiciones, es necesario comenzar a usar otro método anticonceptivo.
- La lactancia se debe apoyar con una elevada frecuencia de succión para que sea exitosa, para mantener la amenorrea y para evitar que se requiera alimentación suplementaria del o la lactante.
- Además de la protección anticonceptiva, la amenorrea de lactancia proporciona un período de tiempo de varios meses, durante los cuales la mujer puede comenzar otro método anticonceptivo sin temor de que esté embarazada (por ejemplo: se puede insertar un DIU sin esperar el primer sangrado). La seguridad de que la mujer no se va a embarazar en los primeros meses post-parto, si está en amenorrea, también permite postergar el inicio de la anticoncepción hormonal. Así se evita el paso de esteroides al lactante, si esta es la anticoncepción elegida.

Dispositivos Intrauterinos (DIU):

Los DIU con cobre, como la T Cobre 380 A, son uno de los métodos reversibles de mayor eficacia anticonceptiva con tasas de embarazo menores de 1% al final del año, lo que representa una gran ventaja en este período en que un embarazo puede perjudicar tanto la salud de la madre como la de su hijo o hija.

- La inserción es segura después de las cuatro semanas post-parto, cuando se ha completado la involución uterina, durante la amenorrea de lactancia o en las primeras menstruaciones post-parto. No es necesario esperar la primera menstruación. También puede hacerse en el post-parto inmediato, teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en la mujer que no amamanta.

- Es importante recordar que se necesita entrenamiento adecuado y tomar precauciones especiales con relación al tamaño y posición del útero para realizar la inserción en este período, con el fin de evitar perforaciones.
- Se deben usar los Criterios de Elegibilidad de la OMS descritas en la sección sobre DIU.
- Las inserciones en mujeres que amamantan son menos dolorosas y las mujeres tienen menos problemas con los sangrados y menos molestias durante el uso, en comparación con las inserciones realizadas en mujeres que no amamantan. La eficacia anticonceptiva y las tasas de continuación son muy buenas.

Esterilización quirúrgica:

La esterilización quirúrgica de la mujer no tiene consecuencias negativas para la lactancia, si se evita la separación prolongada de la madre y el/la lactante. El post-parto es también un período adecuado para la vasectomía ya que si la mujer está en amenorrea de lactancia la pareja no necesita protección adicional durante los tres meses después del procedimiento.

Métodos de barrera:

Su eficacia anticonceptiva puede ser más alta durante la lactancia, ya que hay una reducción parcial de la fertilidad en los primeros ciclos post-parto. El uso del condón protege de las ITS/VIH y algunas mujeres pueden estar en situación más vulnerable en este período. El diafragma puede ser usado después de 6 semanas, cuando la anatomía de la mujer ha recuperado la normalidad, efectuando la medición para determinar el tamaño adecuado.

Abstinencia periódica:

El reconocimiento de los signos y síntomas de la fertilidad, como en el método de la ovulación, se puede aprender durante la amenorrea de lactancia para aplicarlo cuando se reinician los ciclos menstruales. La interpretación de la temperatura basal y de los cambios en el moco cervical puede ser más difícil durante la lactancia. Algunos estudios han encontrado tasas de embarazo algo más elevadas en los ciclos después de la amenorrea de lactancia, en comparación con las tasas observadas en mujeres que no amamantan.

Métodos hormonales

Métodos de progestágeno solo:

Pueden ser administrados después de las primeras 6 semanas post-parto y pueden usarse pastillas, inyecciones e implantes (ver capítulo correspondiente).

- Estos métodos no tienen efectos negativos sobre la lactancia, ni sobre el crecimiento y el desarrollo temprano de los lactantes. Por lo tanto, son una buena elección cuando los métodos no hormonales representan un riesgo para la salud de la madre o no son aceptables para ella.
- Tienen una elevada eficacia anticonceptiva, con tasas de embarazo menores de 1% al final del año de uso y son bien tolerados.
- Cuando se inician durante la lactancia, prolongan el período de amenorrea y las mujeres presentan ciclos más largos y escasos días de sangrado cuando se reanudan los ciclos menstruales, lo que tiene un efecto positivo sobre los niveles de hemoglobina.
- Cuando se usan estos métodos, una pequeña cantidad de hormona pasa a la leche, la que va desde 10 mcg de acetato de medroxiprogesterona en el caso de este inyectable, hasta menos de 100 ng del progestágeno contenido en pastillas e implantes (Tabla 1). Estas hormonas son activas por vía oral, y no se conoce el efecto que puedan tener a largo plazo sobre el desarrollo de los/as niño/as. Por eso se recomienda comenzar su uso después de las seis semanas post-parto para evitar la ingestión de la hormona en un/a lactante en la etapa en que los sistemas metabólicos y la barrera hematoencefálica son más inmaduros.

Anillos Vaginales de Progesterona:

La progesterona es la hormona natural producida por el ovario en la fase lútea del ciclo menstrual y durante el embarazo y no es activa por la vía oral. La progesterona se administra a través de anillos vaginales, iniciando su uso a las seis semanas post-parto. Se ha demostrado que son muy efectivos como anticonceptivos, sin alterar la lactancia ni el crecimiento de las/os lactantes. La progesterona prolonga el período de anovulación y amenorrea post-parto, por lo que actuaría reforzando los mecanismos naturales de la infertilidad asociada a la lactancia.

Anticonceptivos hormonales combinados:

Los ACO tienen un efecto negativo sobre la cantidad y calidad de la leche, acortan la duración de la lactancia y afectan el crecimiento de las/los lactantes. Por estas razones, no se recomienda su uso en los primeros seis meses post-parto cuando las mujeres están amamantando, salvo que sea la única opción posible. Si este es el caso, se deben iniciar lo más tarde posible, postergándolos hasta después del primer sangrado post-parto o hasta la introducción de alimentación suplementaria al/la lactante. La misma recomendación se aplica a los anticonceptivos inyectables que contienen estrógenos, ya que esta hormona es la responsable de los efectos negativos sobre la lactancia.

Tabla 1. Dosis estimada del esteroide que ingieren niños/as en lactancia exclusiva cuyas madres usan métodos de progestágenos puros

Método (dosis)	Ingesta diaria del lactante*
Inyectables	
AMPD (150 mg / 3 meses)	1 - 13 mcg
EN-NET (200 mg / 8 semanas)	0.5 - 2.4 mcg
Implantes	90 - 100 ng**
Norplant® (levonorgestrel, 100 mcg/día)	75 - 120 ng**
Implanon® (etonogestrel, 60 mcg/día)	
Orales	
Levonorgestrel (30 mcg/ día)	40 - 140 ng
Etinodiol Diacetato (500 mcg/ día)	150 - 600 ng
Noretisterona (350 mcg/ día)	100 - 300 ng
Anillo Vaginal	
Progesterona (10 mg/día)	6 mcg***

* Estimado de las concentraciones en leche, asumiendo una ingestión diaria de leche de 600-800 mL.

** Primer mes después de la inserción.

*** La progesterona es inactiva por vía oral.

Adaptado de Díaz y cols., 2001.

Orientación a las usuarias

En los servicios de salud ofrecidos a las mujeres durante el embarazo y el post-parto, debe considerarse la orientación integral, que incluya la lactancia, la infertilidad asociada a la amenorrea post-parto, los anticonceptivos disponibles y sus efectos sobre la lactancia.

Cuando la duración de la amenorrea de lactancia es breve, como ocurre en las ciudades chilenas, el personal de los servicios de salud se debe esforzar por hacer educación en regulación de la fertilidad durante el embarazo y el post-parto temprano para que las mujeres puedan tomar una decisión en los primeros meses post-parto. La orientación durante el embarazo es particularmente importante cuando se considera la AQV femenina o la inserción de un DIU en el post-parto temprano.

Se debe considerar cual es el momento más adecuado para iniciar el método según los Criterios Médicos de la OMS (Tabla 2) y la posibilidad de la mujer de volver al servicio de salud. La anticoncepción no se debe postergar más allá de la aparición del primer sangrado post-parto, de la introducción de alimentación suplementaria al /la lactante o del sexto mes post-parto.

Tabla 2.- MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS PARA EL PERIODO POST-PARTO

Método Anticonceptivo	Puede Usarse	
	Amamantando	No Amamantando
Amenorrea de lactancia (1)	SI	-
Condón	SI	SI
DIU (2)	SI	SI
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (3)	SI	SI
Diafragma (4)	+ 6 semanas	+ 6 semanas
Abstinencia periódica (5)	Con ciclos menstruales	Con ciclos menstruales
Progestágeno solo (6)		
	Oral	+ 6 semanas
	Inyectable	+ 6 semanas
	Implante	+ 6 semanas
	AV Progesterona	+ 6 semanas
Combinados de estrógeno y progestágeno (7)		
	Oral	+ 6 meses
	Inyectable	+ 6 meses

(1) Método de la amenorrea de la lactancia (MELA): La tasa de embarazos es 1 a 2% si la mujer no ha menstruado, si aún no han transcurrido 6 meses desde el parto y si la lactancia es exclusiva.

(2) Dispositivos intrauterinos (DIU): Son métodos seguros y efectivos en el período post-parto. La inserción se puede hacer en los siguientes momentos:

a) Inserción inmediata después de la expulsión de la placenta (dentro de 10 minutos).

b) Inserción en las primeras 48 horas del puerperio.

c) Inserción después de las 4 semanas post-parto, ya sea con el primer sangrado o en los primeros 6 meses de amenorrea.

(3) AQV: La AQV solo se puede en el parto si se ha obtenido el consentimiento informado previamente.

(4) Diafragma: Se puede usar después de las 6 semanas, determinando en ese momento la medida adecuada.

(4) Los métodos de abstinencia periódica son más difíciles de usar en el post-parto inmediato, por la irregularidad de los ciclos menstruales y la dificultad de reconocer los signos que acompañan a la ovulación.

(5) Métodos hormonales de progestágeno solo: Su uso es seguro en el período post-parto. No causan disminución de la leche materna. En la mujer que no está amamantando se pueden administrar desde el post-parto inmediato, mientras que en la mujer que está amamantando deben iniciar después de las 6 semanas.

(6) Métodos hormonales combinados de estrógeno y progestágeno: Pueden producir trastornos de coagulación por lo que no se deben usar antes de la tercera semana post-parto. No se deben usar antes del sexto mes post-parto si la mujer está amamantando porque disminuyen la producción de leche y la duración de la lactancia.

Referencias

- Amatayakul K, Wongsawasdi L, Munglapruks A, y cols. Successful sustained lactation following postpartum tubal ligation. *Adv Contracept* 7:363-370, 1991.
- American College of Obstetricians and Gynecologists: Postpartum tubal sterilization *Int J Gynecol Obstet* 39:244, 1992.
- Croxatto HB, Díaz S, Peralta O y cols. Fertility regulation in nursing women IV. Long term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. *Contraception* 27:13, 1983.
- Chi I-Ch, Wilkens LR, Champion CB, Macheimer RE, Rivera R: Insertional pain and other IUD insertion-related rare events for breastfeeding and non-breastfeeding women - A decade's experience in developing countries. *Adv Contracept* 5:101-19, 1989.
- Chi I-Ch, Potts M, Wilkens LR, Champion ChB: Performance of the Copper T-380. A intrauterine device in breastfeeding women. *Contraception* 39:603-18, 1989.
- Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM, Miranda P, Durán E, Croxatto HB: Fertility regulation in nursing women. III. Short-term influence of a low-dose combined oral contraceptive upon lactation and infant growth. *Contraception* 27:1-11, 1983.
- Díaz S, Croxatto HB. Contraception in lactating women. *Curr Opin Obstet Gynecol* 5:815-22, 1993.
- Díaz S, Zepeda A, Maturana, X y col. Fertility Regulation in Nursing Women: IX. Contraceptive performance, duration of lactation, infant growth and bleeding patterns during use of progesterone vaginal rings, progestin-only pills, NORPLANT[®] implants and Copper T 380-A intrauterine devices. *Contraception* 56:223-32, 1997.
- Díaz S. Breast-feeding and concurrent use of contraceptive implants. *Contraception* 65:39-44, 2002.
- Dunson TR, McLaurin VL, Grubb GS, Rosman AW: A multicenter trial of a progestin-only oral contraceptive in lactating women. *Contraception* 47:23-35, 1993.
- Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER). Anticoncepción postparto. En: *Salud Reproductiva en el Período Postparto: Manual para el Entrenamiento del Personal de los Servicios de Salud.* (ed) S. Díaz . Santiago de Chile, 1997.
- Jiménez J, Ochoa M, Soler MP, Portales P: Long-term follow-up of children breast-fed by mothers receiving depot-medroxy-progesterone acetate. *Contraception* 30:523-33, 1984.
- Labbok MH, Stallings RY, Shah F, Pérez A, Klaus H, Jacobson M, Muruthi T: Ovulation method use during breastfeeding: Is there increased risk of unplanned pregnancy? *Am J Obstet Gynecol* 165:2031-6, 1991.
- Massai R, Díaz S, Jackanicz T, Croxatto HB. Vaginal rings for contraception in lactating women. *Steroid* 65:703-7, 2000.
- Sivin I, Díaz S, Croxatto HB y cols. Contraceptives for lactating women: A comparative trial of a progesterone-releasing vaginal ring and the copper T 380A IUD. *Contraception* 55:225-32, 1997.
- World Health Organization: Effects of hormonal contraceptives on breast milk composition and infant growth. *Stud Fam Plann* 6:361-9, 1988.
- World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. *Contraception* 50:35-55, 1994.
- World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health: Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. *Contraception* 50:55-68, 1994.
- Zinaman M, Stevenson W: Efficacy of the symptothermal method of natural family planning in lactating women after the return of menses. *Am J Obstet Gynecol* 165:2037-9, 1991.