



LACTANCIA Y SALUD MATERNA

María Verónica Reyes, Matrona
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
(ICMER)

Para lograr una buena lactancia y proteger la salud del lactante, debemos priorizar los cuidados de la salud materna

**La salud materna
incluye aspectos
biológicos,
psicológicos y
sociales.**

Riesgos de la salud materna en el post parto temprano

- ❖ Complicaciones obstétricas (hemorragias, infecciones, crisis hipertensivas, entre otras)
- ❖ Complicaciones de las mamas
- ❖ Complicaciones hematológicas
- ❖ Trastornos anímicos

Riesgos para la salud materna a largo plazo durante la lactancia

- ❖ Deterioro de la nutrición materna
- ❖ Deterioro de la densidad mineral ósea
- ❖ Vulnerabilidad psicológica por cansancio y/o stress

Los cuidados necesarios

Prevención de hemorragias

- ❖ Vigilancia de la retracción e involución uterina, del volumen de sangrado y de la presión arterial entre otras
- ❖ Es importante el estímulo precoz de lactancia materna directa para
 - mantener la secreción endógena de oxitocina y prolactina
 - asegurar una buena hemostasia de los campos uterinos sangrantes

Prevención de infecciones tempranas

Vigilancia de

- ❖ Las condiciones de asepsia y antisepsia en la atención del trabajo de parto, del parto y del alumbramiento
- ❖ Los signos vitales, de los loquios, de las zonas de rotura tisular
- ❖ La aparición de signos y síntomas de infección local o sistémica

Prevención de alteraciones derivadas de eclampsia y otras formas de hipertensión

- ❖ Vigilancia seriada y frecuente de la presión arterial, de la hidratación, de la diuresis, mantener vía venosa y/o central permeable
- ❖ Mantener las medidas activas para evitar cambios hemodinámicos bruscos que desestabilicen la presión arterial durante las dos primeras semanas post parto

Evitar complicaciones de la mama y pezón

- ❖ Entrenamiento activo de la madre y el lactante en técnicas adecuadas de amamantamiento para evitar la grieta del pezón
- ❖ Vaciamiento de la leche sobrante para evitar la mastitis
- ❖ Educar a la madre y su familia, sobre la importancia de mantener lactancia exclusiva con una alta frecuencia de succión diurna y nocturna

Atender al equilibrio de los sistemas hematopoyéticos

- ❖ La depleción de los sistemas de coagulación aumenta el riesgo de hemorragia tardía
- ❖ La activación intensa del sistema fibrinolítico en las semanas siguientes al parto, sumado a una disminución de la actividad de la mujer o a traumas extensos, podrían desencadenar una complicación tromboembólica

Prevención de anemia

La depleción de las reservas de hierro pueden llegar a producir anemia, por lo que es importante mantener el aporte de hierro durante los primeros meses post parto y suplementarlo en caso necesario

Pesquisar trastornos psiquiátricos post parto

- ❖ Durante el puerperio, factores bioquímicos entre ellos hormonales y el estrés psicológico pueden desencadenar trastornos psiquiátricos en la mujer
- ❖ La psicosis puerperal y tristeza post parto es un cuadro autolimitado que dura 3 a 6 días

Depresión post parto

- ❖ La depresión post parto, una condición seria, en general, no es autolimitada
- ❖ Su prevalencia es de alrededor del 15% durante los primeros 6 meses, siendo más frecuente en mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos

Signos y síntomas de la depresión post parto

- ❖ Tristeza y/o irritabilidad
- ❖ Pérdida de interés en actividades habituales
- ❖ Dificultad en toma de decisiones simples
- ❖ Sentimientos de culpa inexplicables
- ❖ Sensación de angustia y alerta extrema
- ❖ Desánimo y astenia
- ❖ Trastorno del sueño: insomne y/o hipersomne
- ❖ Abandono (no alimentar) o maltrato (mostrarse o estar irritable) del bebé
- ❖ Ideación suicida

Cansancio físico y mental

- ❖ Cansancio o agotamiento
- ❖ Malestar y/o cansancio post esfuerzo
- ❖ Trastornos del sueño
- ❖ Dolores musculares y/o articulares
- ❖ Presentar cambios de humor y/o pérdida de memoria

¿Síndrome de Fatiga Crónica?

Prevención del daño nutricional

- ❖ La lactancia representa un gran gasto nutricional
- ❖ Esto se debe al esfuerzo metabólico que requiere la producción de alrededor de un litro de leche diario
- ❖ Cuando la alimentación diaria no aporta lo necesario, puede afectarse la cantidad de leche producida, pero su composición se modifica poco

Necesidades energéticas

- ❖ La producción de leche implica un gasto de energía que se estima en 800 Kcal por litro de leche producido
- ❖ La cantidad de energía requerida por la nodriza se estima de mínimo 2500 K cal /día
- ❖ La grasa en la leche materna refleja el patrón de grasa ingerida por la madre
- ❖ Los requerimientos de lípidos son los de una dieta normal y balanceada

Necesidades proteicas

- ❖ La necesidad de ingerir proteínas aumenta un 30% con respecto a una mujer que no amamanta
- ❖ Se sugieren unos 15 gramos de proteínas por sobre la recomendación habitual incluyendo proteínas de origen vegetal y animal

Ingesta de fibras y agua

- ❖ Durante el embarazo, post parto y lactancia, se produce frecuentemente estreñimiento, por lo que es recomendable aumentar en gran cantidad el consumo de fibras (frutas, verduras y cereales integrales)
- ❖ El consumo de líquidos durante la lactancia debe ser alrededor de 2 a 2,5 litros al día

Ingesta de calcio y fósforo

- ❖ Al igual que en el embarazo, durante la lactancia aumentan los requerimientos de calcio y fósforo en unos 400 mg
- ❖ La cantidad recomendada de calcio durante la lactancia alcanza los 1200 mg diarios
- ❖ Se debe aumentar el consumo de lácteos, frutos secos y legumbres, entre otros, para garantizar el aporte de calcio

Cuando complementar la dieta materna

IMPORTANTE:


Se requieren suplementos medicamentosos de calcio, vitaminas y oligoelementos sólo cuando se sospecha o se tiene la certeza, de que la dieta de la mujer no es equilibrada y completa

Protección de la masa ósea materna

- ❖ Se necesita mantener un estrecho balance entre la pérdida y la recuperación de la masa ósea durante la lactancia ya que es un período de gran remodelamiento óseo
- ❖ La ingestión insuficiente de calcio puede desabastecer las reservas de la madre y conducir a una disminución de su densidad mineral ósea o a otros trastornos por deficiencia

Importancia del período de destete en la recuperación de la masa ósea de las nodrizas

Porcentaje de cambio, respecto a un grupo contemporáneo de mujeres no nodrizas (línea basal)



ICMER

Tiempo de recuperación de la masa ósea materna

- ❖ Los estudios muestran que la mujer debe esperar a lo menos seis meses después el destete, antes de iniciar un nuevo embarazo, para recuperar su masa ósea basal
- ❖ Esto tiene una gran importancia en su salud futura

Anticoncepción post parto

En general, se recomiendan:

- ❖ Los métodos no hormonales como los dispositivos intrauterinos, la amenorrea de lactancia y los métodos de barrera
- ❖ Los métodos de progestágeno solo iniciados después de las 6 semanas post parto.
- ❖ No se deben usar anticonceptivos combinados en los primeros seis meses post parto

Duración de la amenorrea de lactancia según método anticonceptivo

METODO


MELA

T de Cobre

Progestágeno oral


Norplant

AV Progesterona



ICMER

Porcentaje de madres en lactancia exclusiva al 6^o mes post parto según método anticonceptivo



ICMER

Aumento de peso (0 - 6 meses) de los niños en lactancia exclusiva según método anticonceptivo

METODO


MELA

T de Cobre

Progestágeno oral

Norplant


AV Progesterona




Kg. (promedio)

ICMER

Proporción de mujeres en lactancia exclusiva



Incremento de peso de niños en lactancia exclusiva



Atención de la sexualidad en el post parto

Causas de disminución del deseo sexual en el post parto

- ❖ Cansancio, a veces depresión y estrés
- ❖ Falta de sueño
- ❖ Atención focalizada en el recién nacido/a
- ❖ Cambios hormonales
- ❖ Temor al dolor
- ❖ Temor al desempeño sexual
- ❖ Sentimiento de que el cuerpo es poco atractivo

Aconsejar a la pareja en

- ❖ Lograr condiciones que permitan y estimulen el deseo sexual
- ❖ Abordar la actividad sexual en forma gradual, progresiva
- ❖ Como estimular el deseo y producir placer en ambos, adaptándose a los cambios

Ayuda práctica

- ❖ Indicar momentos de descanso para la mujer durante el día
- ❖ Resolver el temor al embarazo con un método anticonceptivo adecuado
- ❖ Recomendar el uso de lubricantes inertes, cuando la lubricación espontánea de la mujer no es suficiente
- ❖ Entrenar a la pareja en prácticas sexuales no penetrativas (focalización sensorial)

Protección de infecciones de transmisión sexual

- ❖ El período post parto es vulnerable a las ITS/VIH por razones conductuales y biológicas
- ❖ Es importante educar a la pareja durante el embarazo y el período post parto en la prevención de ITS/VIH mediante el uso de condón
- ❖ Los proveedores deben tratar de pesquisarlas y/o prevenirlas

Lactancia y drogas ilícitas

Cocaína, Anfetamina, Marihuana:

- ❖ Se concentran en leche
- ❖ Aumentan la frecuencia de muerte súbita
- ❖ Pueden producir irritabilidad, vómitos, taquicardia, hipertensión arterial, agitación y/o convulsiones, insomnio y ceguera transitoria (anfetamina)
- ❖ Pueden disminuir la producción láctea y ocasionar menor peso y disminución del desarrollo físico y motor del bebé

Fuente: Presentación Dra. Patricia Mena

Lactancia y drogas consideradas lícitas

- ❖ Tabaco: disminuye la producción de leche, disminuye su concentración de yodo, altera el sueño del bebé , aumenta el riesgo de muerte súbita
- ❖ Alcohol: disminuye la producción de leche, produce menor desarrollo físico y motor del bebé, altera el sueño del lactante, aumenta el riesgo de muerte súbita

Fuente: Presentación Dra. Patricia Mena

Recordemos

La mujer generalmente posterga sus propias necesidades, para suplir las del bebé y de todas las otras personas que requieren de su apoyo

Sin embargo durante éste período, es ella quien debe tener una red de apoyo constante de su pareja, de su familia, de su red social, del estado como sociedad y del personal de salud que cuida de ella y de su lactante

Nuestro compromiso como prestadores de salud es promover y cuidar la salud de la mujer, en beneficio de ella misma, de su hijo/a y de su grupo familiar

Finalmente ese es nuestro aporte a la salud de nuestra sociedad