

**NUTRICION de LA MUJER en el POSTPARTO**  
**MARIA EUGENIA CASADO**  
**INSTITUTO CHILENO DE MEDICINA REPRODUCTIVA ( ICMER )**

## **INTRODUCCION**

Para analizar la nutrición durante la lactancia es necesario mirar lo que sucede durante el embarazo. Junto con gestarse una nueva vida, el organismo de la mujer se prepara para alimentarla una vez nacida. Esta preparación incluye el crecimiento y desarrollo de las mamas y la acumulación de nutrientes y energía. Aún las mujeres mal nutridas acumulan estas reservas, incluso a expensas del crecimiento del feto.

Los riesgos nutricionales del embarazo y la lactancia dependen de la alimentación de la mujer en estos períodos y de la nutrición en etapas anteriores. También influyen, la capacidad de acumulación de nuevas reservas durante el embarazo y los mecanismos adaptativos, que le permiten a la mujer disminuir el gasto nutricional.

## **LA PREPARACIÓN PREVIA**

Debemos recordar que:

- La nutrición en la infancia y adolescencia es muy importante desde el punto de vista de las reservas con que cuenta la mujer para el embarazo y la lactancia. Por ejemplo, el mayor depósito de calcio en el hueso se produce durante los años que siguen a la menarquia. Las mujeres que han tenido una adecuada ingesta cálcica en la adolescencia, tienen menor riesgo de presentar osteoporosis después de la menopausia por la pérdida de calcio durante el embarazo y la lactancia. También las reservas de hierro protegen contra la posibilidad de desarrollar anemia.
  
- El intervalo adecuado entre los embarazos es otro factor importante, ya que las gestaciones muy seguidas impiden que la mujer recupere sus reservas entre una y otra. Por

ejemplo, hay un período de varios meses después del destete, en que se recupera el depósito de calcio en el hueso a los niveles que hay antes del embarazo y la lactancia. Si este intervalo no se mantiene, el próximo embarazo representa un riesgo importante para el esqueleto de la mujer.

Además, en los países subdesarrollados, la sobrevivencia de los niños es mayor si la lactancia es larga y si la madre puede dedicarles mayor atención. Por estas razones se sugiere que los nacimientos se espacien dos o más años, o más de seis meses después del destete; especialmente si la mujer no está bien nutrida.

## **INFLUENCIA DE LA NUTRICION EN LA LACTANCIA**

Diferentes estudios han correlacionado el estado nutricional o variables del estado nutricional materno con la lactancia:

- El estado nutricional materno al inicio del embarazo (medido por el índice peso/talla) influye en el volumen de la leche producida y en su contenido graso, ambos son mayores en las mujeres mejor nutridas.
- En mujeres que amamantan con frecuencia similar, su estado nutricional y el incremento de peso durante el embarazo influyen en la duración de la lactancia.
- El estado nutricional de la embarazada y el incremento de peso durante el embarazo influyen en el peso de los niños al nacer. A su vez los niños de mayor peso tienen más posibilidades de tener una lactancia prolongada.
- La ingesta de la madre durante la lactancia influye en el contenido de aminoácidos, ciertos ácidos grasos y vitaminas hidrosolubles de la leche, pero no en el contenido de proteínas totales y el calcio.

## **GASTO ENERGETICO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA**

Se ha estimado que el gasto de energía total en el embarazo es de 80 mil Kcal cuando la mujer es eutrófica y mantiene una actividad normal. Puede bajar hasta 60 mil Kcal si disminuye la actividad

física. La mitad de esta energía se ocupa en la formación y mantención del feto y en el aumento del metabolismo basal, por el mayor trabajo cardíaco y respiratorio de la mujer. La otra mitad son reservas grasas que se estiman en 36.000 Kcal.

Un incremento de peso de 12.5 Kg durante el embarazo es adecuado para una mujer eutrófica, recomendándose que esta alza sea mayor en las desnutridas y menor en las obesas. Este aumento de peso corresponde a placenta y anexos, útero, feto, volumen sanguíneo, mamas y grasa acumulada (4 Kg aproximadamente), que proporcionará la energía necesaria durante los primeros meses de lactancia.

Se estima que el organismo de una mujer normal recupera su composición original después de unos 6 meses postparto, si es que utiliza esta reserva grasa durante la lactancia. El costo energético de la mujer para producir leche es de alrededor de 700 Kcal por día en el primer semestre y 500 Kcal por día en el segundo semestre (FAO/OMS/ONU 1985). Alrededor de 200 calorías por día provienen de la reserva y las otras deben provenir de la dieta de la mujer.

## **RECOMENDACIONES**

EL tema de la nutrición durante el embarazo y la lactancia es complejo. Lo más probable es que existan diferencias entre individuos y poblaciones, en cuanto a la cantidad de nutrientes que asegura la integridad y buen funcionamiento del organismo. Esto dificulta el cálculo del requerimiento nutricional de cada embarazada o nodriza. Por esto, los organismos de salud hacen recomendaciones generales para grupos o poblaciones de características semejantes. Estas recomendaciones cubren las necesidades de dichos grupos, dejando un margen de seguridad.

Lo importante es tener conciencia de la vulnerabilidad nutricional de la mujer durante estas etapas y adecuar las recomendaciones al estado nutricional basal de ella y a su nivel de actividad física. Si sabemos que al año 2003, alrededor de la mitad de las embarazadas tenían sobrepeso al final del embarazo, se debe considerar lo siguiente:

- **Calorías:** Se recomienda una ingesta calórica de alrededor de 2300 Kcal. por día desde el segundo trimestre del embarazo y de alrededor de 2500 Kcal por día durante la lactancia, para sustentar los procesos descritos. Esta recomendación debe adaptarse al estado nutricional de la mujer y a su actividad física. En general, significa la adición de alrededor de 300 Kcal. a la dieta de la mujer embarazada, las que se pueden reducir a 200 Kcal en las mujeres eutróficas con poca actividad física.

Hay que evaluar la disponibilidad de recursos alimentarios, optimizando el uso de alimentos más abundantes y económico, para aportar las calorías adicionales (pan, cereales). Por ejemplo, se pueden obtener ingiriendo 1/2 Kg de pan y 1/2 litro de leche extra por día.

- **Proteínas:** en mujeres bien nutridas, el requerimiento adicional durante el embarazo es de 10 g por día. Se considera que una ingesta total de alrededor de 65 a 70 g por día es adecuada durante la lactancia. Las mujeres desnutridas requieren un aporte mayor, por lo que hay que educarlas, para que ingieran proteínas en alimentos de menor costo económico que los de origen animal (porotos, soya, etc) cuando los recursos son escasos.
- **Líquidos:** Las nodrizas deben ingerir abundante líquido, lo que tienden a olvidar en el ajetreo diario. Una recomendación práctica es que beban un vaso de líquido (agua, leche, infusiones, sopas, etc.) cada vez que amamantan.

Además de las calorías y las proteínas, hay otros nutrientes que deben ingerirse durante el embarazo y la lactancia, ya que su carencia puede afectar la salud de la madre o el desarrollo del niño/a. Por ejemplo:

- **Fierro:** El requerimiento de fierro es elevado. El depósito de fierro puede ser de 500 mg en el embarazo (en hemoglobina y depósitos fetales, masa muscular y reservas de la madre). Se recomienda una ingesta diaria de alrededor de 30 mg durante el embarazo y de 10 mg o más durante la lactancia. Es importante adicionar fierro en dosis terapéuticas a las embarazadas y nodrizas con anemia ferropriva (si la hemoglobina es menor de 11 o 12 g/100 mL), recomendar alimentos ricos en vitamina C y evitar el té y el café por la influencia que tienen en la absorción del fierro.

- **Calcio:** Se estima que el 30% del calcio fetal proviene del esqueleto de la madre y el 70% de su ingesta. Durante el embarazo se recomienda una ingesta de 1000 mg por día, lo que se mantiene en el período de lactancia, dado el alto contenido de calcio de la leche. Un estudio realizado en Chile mostró que hay una pérdida mínima de masa ósea si la nodriza consume esta cantidad de calcio diariamente, y que esta pérdida se recupera rápidamente al suspender la lactancia. Por esto, también debe mantenerse una elevada ingesta de calcio después del destete ya que en este período se forma nueva masa ósea.
- **Vitaminas:** En las mujeres vegetarianas estrictas es necesario agregar complejo vitamínico B y ácido fólico.

Estas recomendaciones se resumen en lo que se ha llamado ración modelo para la mujer embarazada y la nodriza. También la sabiduría popular ha recomendado desde la antigüedad alimentos especiales durante el embarazo y la lactancia. En muchas culturas se regalan ciertos alimentos rituales a la mujer nodriza, que generalmente son ricos en proteínas, nutrientes y calorías.

En Chile, los requerimientos adicionales están generalmente proporcionados por la leche del programa nacional de alimentación complementaria y por la alimentación habitual de la mujer. Un aspecto práctico es que algunos alimentos son más nutritivos juntos que separados, como la combinación de leguminosas, cereales y vitamina C (porotos con tallarines y una fruta cítrica) o la combinación de leche más cereales y frutas. Finalmente, cabe recordar que la nodriza debe evitar los alimentos meteorizantes cuando inducen cólicos en el lactante.

### ***Balance nutricional***

En el balance entre el gasto de energía y nutrientes, la ingesta y el estado nutricional de la nodriza, influyen varios factores. Uno de estos es la reserva grasa acumulada durante el embarazo, que le permite disponer de calorías adicionales. Otro, es la ingesta de alimentos ricos en energía, proteínas, calcio y fierro que le asegura una protección contra el daño que puede experimentar por la mayor demanda.

Existen además algunos mecanismos adaptativos. En ciertas circunstancias biológicas aumenta la eficiencia del organismo, es decir, para iguales funciones disminuye la energía requerida por el

individuo. Esto ocurre en el embarazo y la lactancia. Otro mecanismo es la amenorrea que acompaña a la lactancia exclusiva y que constituye un ahorro de energía, nutrientes y hierro.

Un estudio realizado por ICIMER, con madres en lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses postparto, mostró que experimentaron pocas variaciones en su estado nutricional en esta etapa. Lo más significativo, fue la reducción del peso corporal en alrededor de 3 Kg y una reducción importante de los pliegues cutáneos. Se estimó una pérdida del 9% de la masa grasa y de sólo el 3% de la magra. Las mujeres que iniciaron la lactancia con un índice peso/talla más alto o que tenían sobrepeso al término del embarazo, experimentaron una pérdida mayor que las demás. Cabe notar que se trataba de mujeres con buen estado nutricional basal y que mantuvieron una ingesta de alrededor de 2750 Kcal por día, de acuerdo a la recomendación para mujeres eutróficas.

### ***La nodriza desnutrida***

Las mujeres mal nutridas pueden tener una lactancia prolongada, con niños creciendo en mejores condiciones que los destetados precozmente. Ellas producen leche que es similar en muchos aspectos a la de mujeres normales. Esto beneficia sin duda a los niños, evitando las enfermedades nutricionales severas que se presentan después del destete (un caso extremo es lo que se ha llamado Kwashiorkor en Africa).

El aumento del gasto nutricional durante la lactancia en las mujeres con cobertura nutricional insuficiente se hace a costa de sus propios nutrientes. Esto puede producir depleción tisular, deterioro que se intensifica a medida que avanza la lactancia. Sin embargo, este impacto no es siempre evidente, lo que sugiere que podría haber también otros mecanismos adaptativos, además de los mencionados.

La adaptación al déficit nutricional actuaría más bien, disminuyendo el volumen de leche que alterando la calidad. Al producir un volumen de leche menor, llega un momento en que esta no es suficiente para los requerimientos nutricionales del lactante, los que van en aumento. Por eso otro mecanismo compensatorio sería en algunos casos, una lactancia más corta en lo que influirían los niveles más bajos de prolactina que se han descrito en la nodrizas desnutridas.

Es importante considerar, cuando es realmente eficiente una intervención nutricional destinada a

proteger a la nodriza, al niño/a y a la lactancia. Un estudio realizado en Gambia demostró que la suplementación durante la lactancia no alteró de modo significativo la duración de la lactancia. Sí se consiguió una prolongación cuando la intervención nutricional se hizo durante el embarazo, ésta fue aún mayor cuando se acompañó de educación a la madre. Por lo tanto la mujer desnutrida no solo requiere nutrientes adicionales en el embarazo y durante la lactancia, más allá del aporte recomendado para las mujeres eutróficas; sino que esta intervención debe ir acompañada de educación nutricional.

### ***La nodriza con sobrepeso u obesa***

Pese a que existe un alto número de mujeres con sobrepeso al término del embarazo (alrededor de 52% al año 2003), las mujeres obesas no han sido suficientemente estudiadas durante el período de lactancia. Sí se sabe que una lactancia materna prolongada contribuye eficazmente a la recuperación del peso pregestacional. Siendo la obesidad una patología muy compleja, requiere muchas veces de un manejo multidisciplinario, capaz de abordar tanto los aspectos nutricionales como los psicológicos y de actividad física. En Chile a nivel de la red pública de salud existen el programa EGO (estrategia global contra la obesidad) y el PASAF (programa de alimentación saludable y actividad física) en los cuales se aborda esta patología con una mirada integral. El programa incluye consejería individual, talleres grupales, atención nutricional y algunos exámenes. La nodriza cuenta además con 2 controles nutricionales, programados al tercer y sexto mes postparto, con el objetivo de cautelar la recuperación del peso materno a los niveles pregestacionales.

## **CONCLUSIÓN**

- La nutrición adecuada durante la niñez y adolescencia, el espaciamiento de los embarazos y la educación nutricional durante todo el ciclo vital, son factores protectores del riesgo nutricional de las mujeres embarazadas o nodrizas y de patologías posteriores al proceso reproductivo.
- En el postparto la nodriza tiene requerimientos especiales de nutrientes, los que deben aportarse en la dieta. La nutrición adecuada disminuye el riesgo nutricional por déficit o

exceso y previene patologías tales como desnutrición, anemia, osteoporosis y obesidad con sus correspondientes complicaciones.

- La lactancia materna debe ser promovida por los beneficios nutricionales para los niños/ y sus madres.
- Las/os proveedores de salud pueden jugar un papel importante en el cuidado de salud: en la prevención de la desnutrición, anemia, riesgo de osteoporosis y sobrepeso. Desde sus distintas disciplinas y a lo largo de las diferentes etapas, especialmente durante la niñez y la adolescencia, pueden realizar educación nutricional a la mujer acerca de los requerimientos y las razones de las recomendaciones alimentarias. También pueden dar apoyo terapéutico tanto a las madres desnutridas como a las obesas, ayudándolas a identificar alimentos accesibles y que contengan los nutrientes necesarios para sus respectivos requerimientos.

## Referencias

Arteaga A, Díaz S, Villalón M, Valenzuela M, Cubillos AM: *Cambios en el estado nutricional de la nodriza durante lactancia exclusiva*. Arch Latinoamer Nutr 31:766-781, 1981.

Atalah E, Bustos P, Ruz M, Hurtado C, Masson L, Urteaga C, Castaños M, Godoy R, Oliver H, Araya J: *Correlación entre estado nutricional materno, calidad de la lactancia y crecimiento del niño*. Rev Chil Pediatr 51:229-235, 1980.

Brewer MM, Bates MR, Vannoy LP: *Postpartum changes in maternal weight and body fat depots in lactating vs nonlactating women*. Am J Clin Nutr 49:259-265, 1989.

Casado ME: *Lactancia exitosa: descripción del manejo del binomio madre-hijo*. Rev Chil Pediatr, Supl 2, 60:9-13, 1989.

Casado ME: *Nutrición materna* En: *Salud Reproductiva en el periodo postparto manual para el entrenamiento del personal de los servicios de salud*. Casado ME, Miranda P, Díaz S (ed) Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Santiago de Chile, 1997

FAO/OMS/ONU: *Necesidades de energía y de proteínas*. Serie de informes técnicos 724. Organización Mundial de la Salud. Ginebra, 1985.

Food and Nutrition Board, National Academy of Sciences, National Research Council: *Recommended dietary allowances revised*, USA, 1989.

López JM, González G, Reyes V, Campino C, Díaz S: *Bone turnover and density in healthy women during breastfeeding and after weaning*. Osteoporosis Int 6:153-159, 1996.



Mardones F, Rosso P, Stekel A, Ahumada E, Llaguno S, Pizarro F, Salinas J, Vial I, Walter T: *Effect of a milk-based food supplement on maternal nutritional status and fetal growth*. Am J Clin Nutr 47:413-419, 1988.

Martorell R, Merchant K: *Reproductive stress and women's nutrition*. En: ACC/SCN Symposium Series. Geneva, May 1992. The Lavenham Press Ltd., Lavenham, Suffolk. pp. 23-32.

Merchant K, Martorell R, Haas JD: *Consequences for maternal nutrition of reproductive stress across consecutive pregnancies*. Am J Clin Nutr 52:616-620, 1990.

MINSAL: Guías alimentarias de la mujer, 2001

National Academy of Sciences: *Nutrition during lactation*. National Academy Press, Washington D.C., 1991.

Prentice AM, Doppitt SD, Goldberg GR, Prentice A: *Adaptive strategies regulating energy balance in human pregnancy*. Hum Reprod 1:149-161, 1995.

Newton N, Newton M: *Psychologic aspects of lactation*. New Eng J Med 277:1179-1188, 1967.