



ICMER

INSTITUTO
CHILENO
DE
MEDICINA
REPRODUCTIVA





**SALUD MENTAL
PERINATAL**

PERINATALIDAD

- **Transición de estados biológicos, psicológicos y sociales.**
- **Nacimiento: cambio de estado**

TEMAS DE LA MADRE

- **Bebé imaginario**
- **Ella como madre, mujer...**
- **Relación con su propia madre**

TEMAS DEL BEBÉ

- Regulación fisiológica
- Regulación de los estados de conciencia
- Regulación emocional

TEMA COMPARTIDO

- Necesidad de apego: Urgencia biológica
- Calidad del apego: Urgencia existencial
- **SALUD MENTAL**
- **CO-ONTOGÉNESIS YO-OTRO**
- Disponibilidad física y psíquica de una “madre suficientemente buena “

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION ACCION

- Maternidad hospital público Barros Luco-Trudeau
- Población usuaria:
 - 5.600 díadas madre recién nacido
 - carencias afectivas, educativas
- Prematurez extrema 2%
- Mortalidad perinatal 0.4‰
- Primigesta precoz 25%

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

- **Kimelman M., Hernández G., Núñez C., Montino O., Fuentes R., González L., Bravo A.**
Depto. de Psiquiatría, Facultad de Medicina
Universidad de Chile
- **Páez J., Bustos S., Namur L., Castillo N., Moraga X., Moreno R. y cols.**
Hospital Barros Luco Trudeau
Reblasam, U.C.L., DTI M3616-9312; Solidarité
Chili-Genève; CONACE 98-13-D-0022; Proyecto
Enlace N° 99/010; Fondecyt

CARACTERISTICAS INICIALES DE LA ATENCIÓN PERINATAL

- **Concepción biomédico**
-
- **Sobre valorización urgencia médica**
- **Violencia institucional**

PROPOSITO

- **Modular procesos de vinculación que orienten a la formación de apegos seguros y se perpetúen en un trabajo de redes con el fin de disminuir maltrato al niño y prevenir psicopatología.**

OBJETIVOS DEL EQUIPO BASE

- **Transferir principios básicos de prevención al equipo perinatal y díadas.**
- **Evaluar la eficacia de la transferencia**
- **Efectuar intervenciones psiquiátricas y psicosociales específicas.**

PRINCIPIOS BASICOS DE PREVENCION

- **Personalización del bebé en oposición a objeto transicional**
- **Personalización de la madre en oposición a objeto reproductor**
- **Fomento de vínculos seguros**
- **Detección de díadas de alto riesgo relacional**

ACTITUDES

- **Valorizar las competencias recíprocas**
- **Reconocer la especificidad individual de cada día**
- **Permitir la expresión de sentimientos ambivalentes**
- **Reconocer el derecho de no asumir la maternidad.**

**Actividades integradas a la
práctica asistencial.**

EVOLUCION PONDERAL DE PREMATUROS CON Y SIN METODO CANGURO MEDIDO EN DIAS-CAMA

PROMEDIO PESO			PROMEDIO DIAS-CAMA	
		DS		DS
Gc	1.387,7	344,3	45,6	1,6
Gk	1.449,3	256,6	31	13,7
p 0.6			p 0.01	

Gc = Grupo control

Gk = Grupo canguro

TEMAS

- **Personalización**
- **Los 5 sentidos**
- **Interacción**
- **Organización**

COMPARACION DE PROMEDIOS DE RESPUESTAS ENTRE PADRES DE RECIEN NACIDO CON Y SIN TALLER VIDEO “CONOCIENDO SU BEBE”

	ANTES		DESPUES		F	PROB.
	X	DS	X	DS		
Grupo experimental	13.7	5.3	27.8	0.485	24.26.48	0.0000
Grupo control	13.8	5.5	14.2	5.9	1.05	0.3

Procedimiento Estadístico: Prueba ANOVA

EVALUACION RELACIONAL

HIPOTESIS DE TRABAJO

- **El instrumento permite discriminar díadas de alto y bajo riesgo relacional**
- **El diagnóstico relacional puede ser transferido a matronas, enfermeras**
- **El alto riesgo relacional tiene un valor de maltrato y trastorno de la vinculación**

METODO

- **Observando las conductas interactivas a través de las cuales la madre brinda cuidados físicos y entrega afectos al bebé**

INDICADORES RELACIONALES EN MATERNIDAD

- **Grado de aceptación del recién nacido**
- **Ocurrencia y calidad de las interacciones**
- **Armonía de las interacciones**
- **Grado de facilidad para ocuparse del recién nacido**
- **Reacción frente al llanto**
- **Tonalidad afectiva**

RESULTADOS

- **Correlación items evaluación global de riesgo satisfactoria en 20 items (coeficiente de spearman entre 0.3 y 0.738)**
- **Confiabilidad Alfa de Crombach 0,880**
- **Concordancia en el diagnóstico de riesgo relacional 94.3%**

COMPARACION DE PORCENTAJES DE ABANDONO, NEGLIGENCIA Y MATRATO EN DIADAS DE ALTO Y BAJO RIESGO RELACIONAL

	Alto Riesgo	Bajo Riesgo
Si	76 (21)	21 (3)
No	24 (4)	79 (11)
Total	100 (25)	100 (14)

chi cuadrado = 8.763

p = 0.000

CONCLUSION

- **El diagnóstico relacional debería integrarse programáticamente en la atención perinatal.**
- **Las díadas de alto riesgo relacional deberían beneficiarse de intervenciones oportunas**

EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL

- Modelo biomédico Modelo de interfase
- Urgencia médica Urgencia relacional
- Violencia institucional Red de apoyo institucional



FIN