

**TECNOLOGIA ANTICONCEPTIVA Y CRITERIOS  
MEDICOS DE ELEGIBILIDAD PARA SU USO  
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD**

**TABLAS RESUMEN**

**Traducido por: Dra. Soledad Díaz F.  
INSTITUTO CHILENO DE MEDICINA REPRODUCTIVA  
Santiago de Chile, 2006**

## TECNOLOGIA ANTICONCEPTIVA

### DEFINICION

Se trata de métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. En lo posible, los métodos anticonceptivos deben cumplir con algunos requisitos y características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductivas en forma efectiva y segura para su salud y de acuerdo a su situación de vida.

- **Eficacia:** Se puede evaluar la eficacia durante el uso ideal o perfecto que considera los embarazos producidos durante el uso correcto y consistente del método y que se deben a falla intrínseca del anticonceptivo. También se puede evaluar la eficacia durante el uso típico o habitual, que incluye todos los embarazos que se producen durante el uso del método, incluyendo el uso incorrecto, el uso no sistemático y las fallas técnicas del método. En general, la eficacia se expresa como el número de embarazos que se producen en 100 mujeres durante un año de uso del método anticonceptivo.

En la Tabla 1 se presenta la eficacia de los métodos anticonceptivos de uso regular, según la tasa de embarazos por 100 mujeres en los primeros doce meses de uso. Los métodos se consideran muy efectivos si esta tasa es de 0-1, efectivos si está entre 2 y 9 y menos efectivos si está entre 10 y 30. Esta tabla no incluye la anticoncepción de emergencia ya que la eficacia de este método se evalúa en forma diferente ya que es de uso ocasional (ver capítulo sobre anticoncepción hormonal de emergencia).

- **Seguridad:** La inocuidad o seguridad para la salud de las usuarias y usuarios de los métodos anticonceptivos es un elemento esencial. El uso de un método no debe provocar efectos adversos, que impliquen riesgos para la salud de la o el usuario/a. Para este fin, la Organización Mundial de la Salud ha definido los criterios de elegibilidad para el uso de los distintos métodos anticonceptivos, como se describe más adelante. Además, hay que considerar que algunos anticonceptivos tienen efectos benéficos para la salud de quienes los usan. Entre estos cabe destacar la prevención de infecciones transmisibles por vía sexual, incluyendo la infección por VIH, que ofrece el uso correcto y consistente del condón masculino de látex y la prevención de ciertos cánceres genitales con el uso de anticoncepción hormonal combinada.
- **Aceptabilidad:** Diferentes personas perciben de manera distinta las características de cada método anticonceptivo. Lo que para algunas puede ser ventaja, para otras puede ser una desventaja. Por esto, las y los potenciales usuaria/os deben ser informada/os sobre todas las características de los métodos anticonceptivos, incluyendo eficacia, duración, efectos colaterales, criterios de

elegibilidad para su uso, modo de uso y costo. Así podrán elegir el que más adecuado a sus necesidades.

- **Fácil uso:** Cuando el uso del método es fácil, es más probable que pueda ser utilizado por todo tipo de usuaria/os. La información sobre la forma de uso debe ser entregada en forma clara y el asesoramiento debe incluir indicaciones precisas (ver capítulo sobre calidad de atención). Algunos métodos pueden ser más difíciles de usar, como es el caso del diafragma, lo que requiere capacitar a las usuarias en la técnica de inserción y comprobar que se han comprendido las instrucciones.
- **Disponibilidad:** Los métodos anticonceptivos deben estar al alcance de las y los potenciales usuaria/os. Se recomienda ofrecer a la persona o a la pareja el mayor número de alternativas anticonceptivas, de modo que el abanico de posibilidades sea tan amplio, que incluya cualquier situación de vida o condición de salud.
- **Reversibilidad:** La recuperación de la fertilidad después de la suspensión del método es un elemento esencial para quienes desean postergar el primer embarazo y para quienes desean prolongar el intervalo intergenésico, mientras que otras personas o parejas pueden desear métodos permanentes.
- **Bajo Costo:** La adquisición de los anticonceptivos debe ser posible para todo tipo de usuaria/os en forma personal, y para los Programas Nacionales de Regulación de Fertilidad. Frente a opciones anticonceptivas similares en cuanto a sus características, debe considerarse siempre la opción más conveniente desde el punto de vista económico.

**Tabla1. Eficacia de los métodos anticonceptivos**

**Tasa de embarazos por 100 mujeres en los primeros 12 meses de uso**

Método anticonceptivo	Uso correcto y consistente	Uso típico
Sin método	85	85
Norplant®	0.1	0.1
Vasectomía	0.10	0.15
Inyectables combinados	0.05	3
Depoprodasone <sup>R</sup> (AMPD) inyectable	0.3	3
Esterilización femenina	0.5	0.5
Dispositivo intrauterino TCu 380A	0.6	0.8
Anticonceptivos orales de progestágenos solos (en lactancia)	0.5	1
Método de la amenorrea de lactancia (MELA)*	0.5	2
Anticonceptivos orales combinados	0.1	6-8
Anticonceptivos orales de progestágenos solos (sin lactancia)	0.5	‡
Condón masculino	2	15
Coito interrumpido	4	27
Diafragma con espermicida	6	16
Abstinencia periódica	1-9	25
Condón femenino	5	21
Espermicidas	18	29

0-1	Muy efectivo	2-9	Efectiva	10-30	Menos efectivas
-----	--------------	-----	----------	-------	-----------------

\* Tasa de falla en los primeros 6 meses post-parto.

‡ Las pastillas de progestágenos solos son algo menos efectivas que las pastillas combinadas cuando se toman sin estar lactando

Adaptado de Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Reproductive Health and Research Family and Community Health. World Health Organization, Geneva, 2002 y 2004.

## CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Los Criterios Médicos de Elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para el uso de los métodos anticonceptivos representan el consenso de las agencias que trabajan en salud reproductiva y se establecieron en reuniones de expertos sostenidas en Ginebra en 1994, 1995, 2000 y 2003.

Entre los méritos de estos criterios se destacan:

- La inclusión de todas las condiciones de salud relevantes.
- La inclusión de las etapas de la vida que pueden afectar la elección del anticonceptivo.
- La evaluación de las condiciones basada en la evidencia científica actual, tanto clínica como epidemiológica.
- La inclusión de los aspectos relacionados con los servicios necesarios.

Las condiciones consideradas se clasificaron en cuatro categorías de acuerdo a la elegibilidad de cada método anticonceptivo para personas que presenten la condición:

- *Categoría 1:* Una condición para la cual no existen restricciones para el uso del método anticonceptivo.
- *Categoría 2:* Una condición en la que las ventajas de usar el método superan los riesgos teóricos o probados.
- *Categoría 3:* Una condición en la cual los riesgos teóricos o probados superan las ventajas de usar el método.
- *Categoría 4:* Una condición que representa un riesgo inaceptable de salud si se usa el método.

Cuando una condición se ha clasificado en categoría 4 para un método anticonceptivo, no debe ser usado nunca por personas que presenten esa condición.

Una mujer con una condición clasificada en categoría 3 y que requiere el uso de un anticonceptivo particular necesita una evaluación clínica cuidadosa, considerando la severidad de la condición y la disponibilidad y aceptabilidad de un método alternativo. El método clasificado en categoría 3 no debe ser usado, salvo que otros anticonceptivos más adecuados no estén disponibles o no sean aceptables. Es el método de última elección y, si es imprescindible usarlo, la mujer requiere seguimiento especial.

La clasificación de un método en categoría 2 no implica una restricción de su uso pero debe considerarse en el proceso de asesoramiento y en la selección del

método, ya que otras opciones pueden ser mejores para esa condición o la persona puede requerir seguimiento especial.

Las condiciones clasificadas en categoría 1 no representan un riesgo para el uso del anticonceptivo y puede usarse siempre, sin restricciones.

En forma simplificada, y cuando no hay profesionales especializados, las categorías 1 y 2 implican que sí puede usarse el método en personas que presentan la condición, mientras que las categorías 3 y 4 determinan que no debe usarse en esas personas (Tabla 2).

**Tabla 2. Clasificación Simplificada de las Condiciones**

<b>Clasificación</b>	<b>Con Criterio Clínico</b>	<b>Criterio Clínico Limitado</b>
<b>1</b>	<b>Use el método en cualquier circunstancia</b>	<b>SI</b>
<b>2</b>	<b>Generalmente use el método</b>	<b>SI</b>
<b>3</b>	<b>No se recomienda habitualmente el uso del método salvo que otros métodos apropiados no estén disponibles o no sean aceptables</b>	<b>NO</b>
<b>4</b>	<b>No se debe usar el método</b>	<b>NO</b>

En la tabla 3 se resumen de los Criterios Médicos de Elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para métodos hormonales y dispositivos intrauterinos y se usan las siguientes abreviaturas:

**ACO:** Anticonceptivos hormonales combinados orales.  
(también llamados AOC: Anticonceptivos orales combinados)

**ACI:** Anticonceptivos hormonales combinados inyectables.  
(también llamados AIC: Anticonceptivo inyectable combinado)

**PPS:** Píldoras de progestágeno solo / progestina sola.  
(también llamadas AOPS: Anticonceptivo oral de progestágeno solo)

**AMPD:** Acetato de medroxiprogesterona de depósito (Depoprodasone)

**EN/NET:** Enantato de Noretisterona

**IMPL LNG/ETG:** Implantes sub-dérmicos de levonorgestrel (Norplant y Jadelle) o de etonogestrel (Implanon).

**DIU- CU:** Dispositivo intrauterino con cobre.

**DIU-LNG:** Dispositivo intrauterino con levonorgestrel.

**I:** Inicio del método.

**C:** Continuación del método.

**NA:** No se aplica.

**Tabla 3. CRITERIOS MEDICOS PARA LA ELECCION DE UN METODO ANTICONCEPTIVO**

TABLAS RESUMEN							
CONDICION	ACO	ACI	PPS	AMPD EN/NET	IMPL LNG/ETG	DIU-Cu	DIU-LNG
I = Inicio - C = Continuación							
<b>CARACTERISTICAS PERSONALES E HISTORIA REPRODUCTIVA</b>							
<b>EMBARAZO</b>	NA	NA	NA	NA	NA	4	4
<b>EDAD</b>	De menarquia a <40 =1  ≥ 40 =2	De menarquia a <40 =1  ≥ 40 =2	De menarquia a <18 =1 18-45 =1 > 45 =1	De menarquia a <18 =1 18-45 =1 > 45 =2	De menarquia a <18 =1 18-45 =1 > 45 =1	< 0 =2  ≥20 =1	<20 =2  ≥20 =1
<b>PARIDAD</b>							
a) Nulípara	1	1	1	1	1	2	2
b) Mujeres que han tenido uno o más partos	1	1	1	1	1	1	1
<b>LACTANCIA</b>							
a) <6 semanas post-parto	4	4	3	3	3		
b) 6 semanas a <6 meses (principalmente lactando)	3	3	1	1	1		
c) >6 meses post-parto	2	2	1	1	1		
<b>POST-PARTO (no amamantando)</b>							
a) <21 días	3	3	1	1	1		
b) ≥21 días	1	1	1	1	1		
<b>POST-PARTO (amamantando o no, incluyendo post-cesárea)</b>							
a) <48 horas						2	3
b) ≥48 horas a <4 semanas						3	3
c) ≥ 4 semanas						1	1
d) Sepsis puerperal						4	4

TABLAS RESUMEN							
CONDICION	ACO	ACI	PPS	AMPD/EN/ NET	IMPL LNG/ETG	DIU-Cu	DIU-LNG
I=Inicio, C=Continuación							
<b>POST-ABORTO</b>							
a) Primer trimestre	1	1	1	1	1	1	1
b) Segundo trimestre	1	1	1	1	1	2	2
c) Inmediatamente post-aborto séptico	1	1	1	1	1	4	4
<b>HISTORIA DE EMBARAZO ECTÓPICO</b>	1	1	2	1	1	1	1
<b>HISTORIA DE CIRUGIA PELVICA</b> (ver también post-parto, incluyendo cesárea)	1	1	1	1	1	1	1
<b>TABAQUISMO</b>							
a) Edad < 35 años	2	2	1	1	1	1	1
b) Edad ≥ 35 años							
i) <15 cigarrillos/día	3	2	1	1	1	1	1
ii) ≥15 cigarrillos/día	4	3	1	1	1	1	1
<b>OBESIDAD</b> Indice de masa corporal (IMC) ≥30 Kg/m <sup>2</sup>	2	2	1	1	1	1	1
<b>MEDICIÓN DE PRESION ARTERIAL NO DISPONIBLE</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

TABLAS RESUMEN							
CONDICION	ACO	ACI	PPS	AMPD EN/NET	IMPL LNG/ETG	DIU-Cu	DIU-LNG
I=Inicio, C=Continuación							
<b>ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES</b>							
<b>MÚLTIPLES FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ARTERIAL</b> (tales como edad mayor, fumar, diabetes e hipertensión)	3/4*	3/4*	2	3	2	1	2
<b>HIPERTENSION</b>							
<b>a)</b> Historia de hipertensión, incluyendo hipertensión durante el embarazo, cuando NO se puede evaluar la presión arterial;	3	3	2	2	2	1	2
<b>b)</b> Hipertensión controlada adecuadamente, cuando PUEDE evaluarse la presión	3	3	1	2	1	1	1
<b>c)</b> presión arterial elevada (bien tomada)							
i) Sistólica 140-159 ó diastólica 90-99	3	3	1	2	1	1	1
ii) Sistólica ≥160 ó diastólica ≥100	4	4	2	3	2	1	2
<b>d)</b> Enfermedad vascular	4	4	2	3	2	1	2
<b>HISTORIA DE PRESION ARTERIAL ALTA DURANTE EL EMBARAZO</b> (donde se puede medir la presión arterial actual y es normal)	2	2	1	1	1	1	1

\* Dependiendo de la severidad de la condición

TABLAS RESUMEN										
CONDICION	ACO	ACI	PPS	AMPD/EN/ NET	IMPL LNG/ETG	DIU-Cu	DIU-LNG			
I = Inicio - C = Continuación										
<b>TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) - EMBOLIA PULMONAR (EP)</b>										
a) Historia de TVP/EP	4	4	2	2	2	1	2			
b) TVP/EP actual	4	4	3	3	3	1	3			
c) Historia familiar (parientes en primer grado)	2	2	1	1	1	1	1			
d) Cirugía mayor										
i) con inmovilización prolongada	4	4	2	2	2	1	2			
ii) sin inmovilización prolongada	2	2	1	1	1	1	1			
e) Cirugía menor sin inmovilización	1	1	1	1	1	1	1			
<b>MUTACIONES TROMBOGENICAS CONOCIDAS</b> (como Factor V Leiden, mutación de protrombina, Proteína S, Proteína C, deficiencias de antitrombina)	4	4	2	2	2	1	2			
<b>TROMBOSIS VENOSA SUPERFICIAL</b>										
a) Venas varicosas	1	1	1	1	1	1	1			
b) Tromboflebitis superficial	2	2	1	1	1	1	1			
<b>CARDIOPATÍA ISQUEMICA (ENFERMEDAD ACTUAL O HISTORIA)</b>			I	C		I	C		I	C
	4	4	2	3	3	2	3	1	2	3
<b>ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ENFERMEDAD ACTUAL O HISTORIA)</b>			I	C		I	C			
	4	4	2	3	3	2	3	1		2
<b>HIPERLIPEMIAS CONOCIDAS</b> (NO es necesario el examen de lípidos de rutina para el uso seguro de anticonceptivos)	2/3*	2/3*	2		2	2	1			2
<b>VALVULOPATIA CARDIACA</b>										
a) sin complicaciones	2	2	1	1	1	1	1			1
b) complicada (hipertensión pulmonar, fibrilación auricular, historia de endocarditis, bacteriana subaguda)	4	4	1	1	1	2	2			2

\* Dependiendo de la severidad de la condición

TABLAS RESUMEN														
CONDICION	ACO		ACI		PPS		AMPD/EN/ NET		IMPL LNG/ETG		DIU-Cu	DIU-LNG		
I = Inicio - C = Continuación														
<b>TRASTORNOS NEUROLOGICOS</b>														
<b>CEFALEAS</b>														
	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C		I	C	
a) No migrañosa (leve o severa)	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
b) Migraña														
i) Sin aura														
Edad <35	2	3	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2	
Edad ≥35	3	4	3	4	1	2	2	2	2	2	1	2	2	
ii) Con aura (a cualquier edad)	4	4	4	4	2	3	2	3	2	3	1	2	3	
<b>EPILEPSIA</b>	1		1		1		1		1		1	1		
<b>TRASTORNOS DEPRESIVOS</b>														
<b>TRASTORNOS DEPRESIVOS</b>	1		1		1		1		1		1	1		
<b>INFECCIONES Y TRASTORNOS DEL TRACTO REPRODUCTIVO</b>														
<b>PATRONES DE SANGRADO VAGINAL</b>														
												I	C	
a) Patrón irregular sin sangrado abundante	1		1		2		2		2		1	1	1	
b) Sangrado abundante o prolongado (incluye patrones regulares e irregulares)	1		1		2		2		2		2	1	2	
<b>SANGRADO VAGINAL DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA</b> (sospecha de una condición grave)														
Antes de la evaluación	2		2		2		3		3		I	C	I	C
											4	2	4	2
<b>ENDOMETROSIS</b>	1		1		1		1		1		2	1		
<b>TUMORES BENIGNOS DEL OVARIO (INCLUYENDO QUISTES)</b>	1		1		1		1		1		1	1		
<b>DISMENORREA SEVERA</b>	1		1		1		1		1		2	1		

TABLAS RESUMEN									
CONDICION	ACO	ACI	PPS	AMPD/ EN/NET	IMPL LNG/ETG	DIU-Cu		DIU-LNG	
I = Inicio - C = Continuación									
<b>ENFERMEDAD TROFOBLASTICA</b>									
a) Enfermedad trofoblástica gestacional benigna	1	1	1	1	1	3		3	
b) Enfermedad trofoblástica gestacional maligna	1	1	1	1	1	4		4	
<b>ECTROPIÓN CERVICAL</b>	1	1	1	1	1	1		1	
<b>NEOPLASIA CERVICAL INTRAEPITELIAL (NIC)</b>	2	2	1	2	2	1		2	
<b>CANCER CERVICAL</b> (en espera de tratamiento)	2	2	1	2	2	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>C</b>
						4	2	4	2
<b>ENFERMEDADES DE LA MAMA</b>									
a) Nódulo sin diagnóstico	2	2	2	2	2	1		2	
b) Enfermedad benigna de la mama	1	1	1	1	1	1		1	
c) Historia familiar de cáncer	1	1	1	1	1	1		1	
d) Cáncer									
i) actual	4	4	4	4	4	1		4	
ii) pasado y sin evidencia de enfermedad durante 5 años.	3	3	3	3	3	1		3	
<b>CANCER DE ENDOMETRIO</b>	1	1	1	1	1	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>C</b>
						4	2	4	2
<b>CANCER DE OVARIO</b>	1	1	1	1	1	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>C</b>
						3	2	3	2

TABLAS RESUMEN									
CONDICION	ACO	ACI	PPS	AMPD/ EN/NET	IMPL LNG/ETG	DIU-Cu		DIU-LNG	
I = Inicio - C = Continuación									
<b>MIOMAS UTERINOS</b>									
a) Sin distorsión de la cavidad uterina	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b) Con distorsión de la cavidad uterina	1	1	1	1	1	4	4	4	4
<b>ANORMALIDADES ANATOMICAS</b>									
a) Con distorsión de la cavidad uterina						4	4	4	4
b) Sin distorsión de la cavidad uterina						2	2	2	2
<b>ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA (EPI)</b>						<b>I</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>C</b>
a) <b>Historia de EPI</b> (asumiendo que actualmente no hay factores de riesgo de ITS)									
i) Con embarazo posterior	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ii) Sin embarazo posterior	1	1	1	1	1	2	2	2	2
b) EPI actual	1	1	1	1	1	4	2	4	2
<b>ITS*</b>						<b>I</b>	<b>C</b>	<b>I</b>	<b>C</b>
a) Cervicitis purulenta o infección actual por clamidia o gonorrea	1	1	1	1	1	4	2	4	2
b) Otras ITS (excluyendo VIH y hepatitis)	1	1	1	1	1	2	2	2	2
c) Vaginitis (incluyendo tricomonas y vaginosis bacteriana)	1	1	1	1	1	2	2	2	2
d) Alto riesgo de ITS	1	1	1	1	1	2/3*	2	2/3*	2

\* Dependiendo de la severidad de la condición

\*\* Siempre debe recomendarse el uso de condones para la prevención de ITS / EPI / VIH

TABLAS RESUMEN									
CONDICION	ACO	ACI	PPS	AMPD EN/NET	IMPL LNG/ETG	DIU-Cu	DIU-LNG		
I = Inicio - C = Continuación									
<b>VIH / SIDA**</b>									
<b>ALTO RIESGO DE VIH</b>	1	1	1	1	1	I 2	C 2	I 2	C 2
<b>INFECCION POR VIH</b>	1	1	1	1	1	2	2	2	2
<b>SIDA</b>	1	1	1	1	1	3	2	3	2
clínicamente bien con terapia antirretroviral						2	2	2	2
<b>OTRAS INFECCIONES</b>									
<b>ESQUITOSOMIASIS</b>									
a) No complicada	1	1	1	1	1	1		1	
b) Fibrosis del hígado (si es grave consulte cirrosis)	1	1	1	1	1	1		1	
<b>TUBERCULOSIS</b>						I	C	I	C
a) No pélvica	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b) Pélvica diagnosticada	1	1	1	1	1	4	3	4	3
<b>PALUDISMO</b>	1	1	1	1	1	1		1	
<b>TRASTORNOS ENDOCRINOS</b>									
<b>DIABETES</b>									
a) Historia de diabetes gestacional	1	1	1	1	1	1		1	
b) Enfermedad no-vascular									
i) no insulino-dependiente	2	2	2	2	2	2	1	2	
ii) insulino-dependiente	2	2	2	2	2	2	1	2	
c) Nefropatía / retinopatía / neuropatía	3/4*	3/4*	2	3	2	1		2	
d) Otra enfermedad vascular o diabetes de duración >20 años	3/4*	3/4*	2	3	2	1		2	

\* Dependiendo de la severidad de la condición

\*\* Siempre debe recomendarse el uso de condones para la prevención de ITS / EPI / VIH

TABLAS RESUMEN							
CONDICION	ACO	ACI	PPS	AMPD EN/NET	IMPL LNG/ETG	DIU-Cu	DIU-LNG
I = Inicio - C = Continuación							
<b>TRASTORNOS TIROIDEOS</b>	1	1	1	1	1	1	1
a) Bocio simple	1	1	1	1	1	1	1
b) Hipertiroidismo	1	1	1	1	1	1	1
c) Hipotiroidismo							
<b>TRASTORNOS GASTROINTESTINALES</b>							
<b>ENFERMEDAD DE LA VESICULA BILIAR</b>							
a) Sintomática							
i) Tratada con colicistectomía	2	2	2	2	2	1	2
ii) Tratada médicamente	3	2	2	2	2	1	2
iii) Actual	3	2	2	2	2	1	2
b) Asintomática	2	2	2	2	2	1	2
<b>HISTORIA DE COLESTASIS</b>							
a) Relacionada con embarazo	2	2	1	1	1	1	1
b) Relacionada con uso previo de ACO	3	2	2	2	2	1	2
<b>HEPATITIS VIRAL</b>							
a) Activa	4	3/4*	3	3	3	1	3
b) Portadora	1	1	1	1	1	1	1
<b>CIRROSIS</b>							
a) Leve (compensada)	3	2	2	2	2	1	2
b) Severa (descompensada)	4	3	3	3	3	1	3

\* Dependiendo de la severidad de la condición

<b>TABLAS RESUMEN</b>							
<b>CONDICION</b>	<b>ACO</b>	<b>ACI</b>	<b>PPS</b>	<b>AMPD EN/NET</b>	<b>IMPL LNG/ETG</b>	<b>DIU-Cu</b>	<b>DIU-LNG</b>
I = Inicio - C = Continuación							
<b>TUMORES DEL HIGADO</b>							
a) Benigno (adenoma)	4	3	3	3	3	1	3
b) Maligno (hepatoma)	4	3/4*	3	3	3	1	3
<b>ANEMIAS</b>							
Talasemia	1	1	1	1	1	2	1
Drepanocítica	2	2	1	1	1	2	1
Ferropriva	1	1	1	1	1	2	1
<b>INTERACCIONES FARMACOLOGICAS</b>							
<b>DROGAS QUE AFECTAN LAS ENZIMAS HEPATICAS</b>							
a) Rifampicina	3	2	3	2	3	1	1
b) Ciertos anticonvulsionantes (fenitoina, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbazepina)	3	2	3	2	3	1	1
<b>ANTIBIOTICOS (excluyendo rifampicina)</b>							
a) Griseofulvina	2	1	2	1	2	1	1
b) Otros antibióticos	1	1	1	1	1	1	1
<b>TERAPIA ANTIRRETROVIRAL</b>							
	2	2	2	2	2	2/3*	2/3*

\* Dependiendo de la severidad de la condición