


Evaluación Crítica de los Distintos Métodos de Anticoncepción de Emergencia

G Noé, S Díaz

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva

2016



ICMER

¿Que es la Anticoncepción de Emergencia (AE)?

Es el **único método anticonceptivo que la mujeres pueden usar para prevenir un embarazo no deseado, después de una relación sexual sin protección.**

- **En el caso de una relación sin uso de método anticonceptivo.**
- **En el caso de una relación sexual usando un anticonceptivo pero ocurrió un accidente con éste (como rotura del condón, olvido de las pastillas, expulsión del DIU).**
- **Para prevenir embarazo en casos de violación.**

Métodos anticonceptivos de emergencia

I. Hormonales:

Combinado de estrógeno y progestina

Progestina sola

Antiprogestina

II. Dispositivo Intrauterino: T Cu 380 A

III. Anti-inflamatorio (en estudio)

Métodos Hormonales

Los únicos métodos aprobados en Latinoamérica son:

Hormonal combinado (YUZPE):

2 dosis de etinilestradiol 100 μg + levonorgestrel 500 μg

Progestina sola:

levonorgestrel (LNG): 1 dosis de 1,5 mg o

2 dosis de 750 μg c/u.

Las píldoras de levonorgestrel están disponibles en la mayoría de los países latinoamericanos, con diferentes marcas y presentaciones.

Antiprogestinas

Mifepristona, RU 486, desarrollado por Roussel Uclaf. Está registrada como AE solo en Rusia y China. Se usa en dosis bajas (10 mg) o medias (25 mg a 50 mg).

Ulipristal, CDB 2914, desarrollado por el NIH y actualmente por PHA –Pharma. Su uso como AE está aprobado en Europa desde el 2009 y en USA, bajo prescripción, desde el 2010. Se usa en dosis de 30 mg.

Diu: T Cobre 380A

- Un DIU liberador de cobre (TCu) se puede utilizar, como anticonceptivo de emergencia, dentro los 5 días siguientes a una relación sexual sin protección.
- Sin embargo, cuando se conoce el momento de la ovulación, se puede insertar hasta 5 días después de la ovulación. La recomendación práctica es insertar la T Cu hasta el día 12 del ciclo, sin restricciones y en cualquier otro momento del ciclo si se está razonablemente seguro de que no está embarazada.

Evaluación de los métodos anticonceptivos de emergencia

Criterios usados para evaluar los métodos anticonceptivos:

- **Eficacia**
- **Seguridad**
- **Aceptabilidad**
- **Fácil uso**
- **Reversibilidad**
- **Disponibilidad**
- **Bajo costo**

EFICACIA DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

Eficacia anticonceptiva: Yuzpe y LNG

Tiempo entre coito y tratamiento	Yuzpe n = 997 (obs/esp)	LNG n= 1001 (obs/esp)
24	77%	95%
25-48	36%	85%
49-72	31%	58%
Total	57% (31/72)	85% (11/75)

WHO, *The Lancet*, 1998; 352:428

Eficacia estimada del LNG administrado como anticonceptivo de emergencia según el intervalo entre coito y uso en cuatro estudios de la OMS

Intervalo coito-LNG (h)	Mujeres (n)	RR (IC 95%)
0-24	3054	1 (Ref)
25-48	2065	0.68 (0.36-1.28)
49-72	1059	1.74 (0.94-3.19)
73-96	386	0.87 (0.26-2.89)
97-120	230	5.81 (2.87-11.76)

Piaggio G, Kapp N, von Hertzen H. Contraception 84: 35–39, 2011

Eficacia anticonceptiva: Mifepristona

En dosis de 10 mg, tiene una efectividad semejante a LNG, previene el 84% de los embarazos (7/45 obs/esp). La tasa de embarazo varía entre 1.2% - 1.5%.

En dosis de 25 mg y 50 mg tiene una efectividad algo mayor que LNG, siendo la tasa de embarazo 1,1% y 1.2, respectivamente.

WHO Lancet 360:1803-10,2002

Gemzell-Danielsson K, Hum Reprod, 2004;10:341

Eficacia anticonceptiva: Ulipristal

Mantiene una alta eficacia para prevenir el embarazo hasta las 120 horas post tratamiento.

Los estudios de efectividad comparativa reportan que UPA es más efectivo que LNG cuando se administra 72 a 120 horas después de la relación sexual pero son difíciles de interpretar porque usan distintas dosis y diseños.

Creinin M y col Obstet&Gynecol 2006;108:1089

Fine P y col. Obstet&Gynecol 2010;115:257


Comparación de eficacia de LNG y UPA

	LNG 0.75mg/2	UPA 50mg	UPA 30mg
Total	69% (13/42)	85% (7/47)	62% (26/69)*
24	71%	100%	
24-48	81%	57%	
48-72	50%	93%	62%
72-96			58%
96-120			75%


*14/26 embarazos ocurrieron con coito fuera del presunto período fértil

Creinin M y col Obstet&Gynecol 2006;108:1089
Fine P y col. Obstet&Gynecol 2010;115:257

Estudio desarrollado en 18 clínicas de planificación familiar de China, en mujeres 18-44 años con ciclos regulares, sin riesgo de ITS a las que se les insertó una T-Cu 380^a dentro de 120 horas post coito desprotegido



SEGURIDAD DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN LOS CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD (CME) DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD



**Quién puede usar
un método anticonceptivo**

CATEGORÍAS USADAS EN C M E

Si una condición se clasifica en:

- ***Categoría 1:*** No hay limitaciones para el uso del método.
- ***Categoría 2:*** Las ventajas de usar el método superan los posibles riesgos.
- ***Categoría 3:*** Los posibles riesgos superan las ventajas de usar el método.
- ***Categoría 4:*** El uso del método representa un riesgo inaceptable.

Seguridad de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia: Yuzpe, LNG y Ulipristal

Condición	Yuzpe	LNG	Ulipristal
Embarazo (no aplica)	-	-	-
Lactancia	1	1	2
Embarazo ectópico	1	1	1
Obesidad	1	1	1
Historia de enfermedad cardiovascular severa (enfermedad cardíaca isquémica, accidente cerebrovascular u otras condiciones tromboembólicas)	2	2	2
Migraña	2	2	2
Enfermedad hepática grave (incluyendo ictericia)	2	2	2
Uso de rifampicina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, efavirenz, fosfenitoína, nevirapina, oxcarbamazepina, primidona, rifabutina, hierba de San Juan (Hypericum perforatum)	1	1	1
Uso de PAE repetida	1	1	1
Violación	1	1	1

Mifepristona, RU 486, no se ha incluido en los Criterios de Elegibilidad de la OMS.

Seguridad de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia: LNG y Yuzpe

- **No se conocen efectos médicos adversos severos.**
- **No se conocen efectos teratogénicos sobre el feto en caso de uso inadvertido durante la fase temprana del embarazo.**
- **No tiene contraindicaciones.**

Efectos secundarios: LNG vs. Yuzpe

	Yuzpe (%)	LNG (%)	valor de p
Nauseas	50.5	23.1	<0.01
Vómitos	18.8	5.6	<0.01
Mareos	16.7	11.2	<0.01
Fatiga	28.5	16.9	<0.01
Cefalea	20.2	16.8	0.06

WHO The Lancet 1998; 352:428

Efectos secundarios: Antiprogestinas

Ulipristal y Mifepristona:

Su uso como AE, en dosis bajas y única, no tiene efectos adversos severos.

Entre el 3% y el 17% de las mujeres han reportado efectos adversos menores como cefalea, náusea, dolor abdominal, dismenorrea, mareos o fatiga.

Seguridad de la T-Cu como Anticoncepción de Emergencia

El uso de T-Cu como AE está clasificado en

Categoría 1: Cuando **no hay** riesgo de ITS por clamidia o gonococo.

Categoría 3/4: Cuando **hay** riesgo de ITS por clamidia o gonococo.

Enfermedad inflamatoria pélvica activa

En caso de embarazo y otras condiciones clasificadas en estas categorías para la inserción en intervalos.

Aceptabilidad de la AE

Entre los factores que pueden influir la aceptabilidad de la AE, tanto a nivel personal como social, está el mecanismo de acción del método.

En Chile, el debate sobre este tema ha durado años y solo la ley sobre regulación de la fertilidad zanjó esta discusión.

Mecanismo de acción del LNG como AE

Los estudios muestran que:

- **Las PAE LNG inhiben la ovulación.**
- **Las PAE LNG no alteran el endometrio ni inhiben la implantación.**
- **Las PAE LNG son muy efectivas para evitar el embarazo cuando se administran antes de la ovulación.**
- **En cambio, cuando se administran después de la ovulación, se observa el mismo número de embarazos que se hubiesen producido si no se administran.**

Las PAE LNG interfieren con la ovulación

➤ Si las PAE LNG se toman cuando el folículo es pequeño (12-14 mm), la ovulación se interfiere en el **94%** de los casos

➤ Si las PAE LNG se toman cuando el folículo es mediano (15-17 mm), la ovulación se interfiere en el **73%** de los casos

Efectos de LNG y YUZPE sobre el endometrio durante la ventana de implantación

Morfológicos

Desarrollo cronológico
Glándulas
Estroma
Mitosis
Vacuolas en epitelio glandular
Endometrio grosor
Pinópodos

Funcionales

Marcadores de receptividad endometrial

Receptor de progesterona
Receptor de estrógenos
Leukaemia inhibitory factor (LIF),
Interleukinas (ILs),
Prostaglandinas, cyclooxygenase-2 (COX-2),
Transforming growth factor beta,
Glicodelina,
Factor Necrosis Tumoral alpha (TNF-a)
Integrinas, Mucina-1 (MUC-1)

*LNG no inhibe la adhesión de blastocitos in vitro en cultivo tridimensional de células de endometrio

Swahn M-L y col. A Obstet Gynecol Scan 1996;75:738

Raymond E. y col. Hum Rep, 2000;11:2251

Marions L. y col. Obstet Gynecol 2002, 100:65

Meng C.-X. y col. Hum Rep, 2010;25 : 874

Palomino, WA y col. Fertil Steril 2010;94:1589

**Lalitkumar y col Hum Reprod. 2007;22:3031*

**Meng C.-X. y col. Fertil Steril. 2009; 91:256*

¿Qué pasa cuando las PAE LNG se administran antes o después de la ovulación?

Administración de PAE LNG	Autor	No. mujeres en riesgo de embarazo	Embarazos esperados / observados
Antes de la ovulación	Novikova	34	4.2 / 0
	Noé	103	16.2 / 0
Después de la ovulación	Novikova	17	3.5 / 3 *
	Noé	45	8.7 / 8 *

**:no significativo*

*Novikova N y cols. Contraception 75:112-8, 2007: 99 casos analizados/51 con riesgo.
Noé y cols, Contraception 81:414-20, 2010; Contraception 84:486-497, 2011:
393 casos analizados/148 con riesgo.*

Mecanismo de acción de Ulipristal

Ulipristal (UPA) 30mg, administrado en la fase folicular previene la ovulación en el **86% de los ciclos en los 5 días siguientes a la administración. Aunque no hay comparación directa con LNG se reporta que este efecto es mayor y más prolongado.¹**

UPA en dosis de 10, 50 o 100mg administrado antes o después de la ovulación produce alteraciones del endometrio, durante la ventana de implantación, que pueden contribuir a su eficacia para prevenir el embarazo. ^{2,3}

¹ *Brache y col. Hum Reprod 2010;25:2256*

² *Stratton P y col. Hum Reprod 2000;15:1992*

³ *Stratton P y col. Fertil Steril 2010;93:2035*

Mecanismo de acción de Mifepristona

Mifepristona

En dosis de 10 mg no produce alteraciones en el endometrio. ¹

En dosis de 25mg y 50 mg, no es concluyente su acción sobre el endometrio.

Mifepristona inhibe la adhesión de blastocistos humanos en un cultivo tridimensional de células de endometrio. ²

¹ Gemzell-Danielsson K, Hum Reprod, 2004;10:341

² Lalitkumar y col Hum Reprod. 2007;22:3031

Mecanismo de acción de la T-Cu como AE

- **DIU T Cu 380 A actúa provocando una inflamación que impide la migración de los espermatozoides hacia la trompa.**
- **Este mecanismo podría resultar tardío si ya hubiese un óvulo fecundado, pero todavía podría prevenir un embarazo y un potencial aborto, porque la inflamación produce un ambiente hostil para el blastocito y/o para la implantación.**

Métodos hormonales: uso y acceso

Uso:

Solo requieren la ingestión de una pastilla en el momento adecuado.

Su uso podría ser controlado por la mujer si no fuera necesaria una receta.

Acceso en Chile:

El uso de LNG está limitado por el difícil acceso en ciertos consultorios de los servicios públicos de salud.

No están disponibles las antiprogestinas.

T-Cu: limitaciones para el uso y acceso

Se requiere:

- **Un/a profesional de salud capacitado/a para su inserción y extracción**
- **Examen ginecológico previo**
- **Evaluación del riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS)**

Su uso no es controlado por la mujer quien depende de un/a proveedor/a para su inserción y extracción.

CONCLUSIONES

- **La anticoncepción de emergencia es efectiva, segura y necesaria.**
- **La eficacia anticonceptiva es mayor para la T-Cu, seguida por las antiprogestinas, las PAE-LNG siendo el Yuzpe el de menos eficacia.**
- **La seguridad es mayor para el uso de hormonales por el riesgo de insertar una T-Cu en caso de ITS.**
- **El uso es más fácil en caso de los métodos hormonales en comparación con la T-Cu.**

Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl