

# MÉTODOS DE BARRERA

**Verónica Schiappacasse**  
**Instituto Chileno de Medicina Reproductiva**  
**2011**

**ICMER**



**ICMER**

# **MÉTODOS DE BARRERA**

- **CONDÓN MASCULINO**
- **CONDÓN FEMENINO**
- **DIAFRAGMA**
- **CAPUCHÓN CERVICAL**
- **ESPONJA**
- **ESPERMICIDAS**

# CONDÓN MASCULINO

- **Funda delgada de látex, con o sin lubricantes o espermicidas, que se coloca en el pene erecto antes de la penetración vaginal, anal y/u oral.**
- **El uso correcto y consistente previene el embarazo y las ITS incluyendo el VIH/SIDA.**

# CONDÓN MASCULINO



Apretar la punta del condón para que no quede aire adentro y sujetar la punta mientras se desenrolla en condón sobre la base del pene



Condón de látex enrollado

# **CONDÓN MASCULINO MECANISMOS DE ACCIÓN**

- **Impide que los espermatozoides entren a la vagina.**
- **Impide el contacto entre los organismos infecciosos que están en el pene o la vagina y los órganos de la o el compañera/o sexual.**


## **CONDÓN MASCULINO: Protección contra infección por VIH**

<b>Uso de Condón</b>	<b>Parejas (N)</b>	<b>Seroconversión Tasa por 100 años/persona</b>
<b>Consistente</b>	<b>124</b>	<b>0.0</b>
<b>No consistente</b>	<b>121</b>	<b>4.8 (2.5-8.4)</b>


*Adaptado de De Vicenzi I. N Engl J Med 331:341, 1994*

# CONDÓN MASCULINO ¿CÓMO SE USA?


1




2




3



4



5



# CONDÓN FEMENINO


- **Es una funda de poliuretano, delgada y transparente.**
- **Viene lubricada con dimeticona.**
- **Mide 17 cm de longitud y 7.8 cm de diámetro.**
- **Tiene 2 anillos flexibles en cada extremo**  
**El anillo externo es fijo y el interno es móvil.**
- **Se coloca en la vagina antes de la relación sexual y se retira después del coito.**



# CONDÓN FEMENINO



# CONDÓN FEMENINO



# CONDÓN FEMENINO

**El condón femenino previene el embarazo si se usa correcta y consistentemente**

**No se conoce el grado de protección contra las ITS y el VIH**

## **Mecanismo de Acción:**

- **Impide el paso de los espermatozoides al útero**
- **Impide el paso de organismos infecciosos *in vitro***


# DIAFRAGMA

- Es una cúpula de látex que cubre el cuello del útero.
- Se inserta antes de la relación sexual.
- No debe permanecer colocado por más de 24 horas, ni ser retirado antes de 6 horas después del coito.
- Se puede usar con o sin espermicida.
- Hay 4 modelos diferentes y en 12 tamaños de 50 a 105 mm.

# DIAFRAGMA



**DIAFRAGMA:  
Anillos para medir**



# DIAFRAGMA



## **DIAGRAMA MECANISMO DE ACCIÓN**

- **Impide el paso de los espermatozoides al útero, actuando como barrera mecánica.**
- **Cuando se usa con espermicida, éste actúa destruyendo o inactivando los espermatozoides.**
- **Puede proteger de algunas infecciones bacterianas (gonorrea y clamidiasis).**
- **No se ha demostrado que prevenga infecciones virales.**



# **CAPUCHÓN CERVICAL**

- **Es un capuchón de látex similar al diafragma, pero más pequeño.**
- **Se coloca en el cuello uterino antes de la relación sexual.**
- **Se usa con espermicidas.**
- **Puede permanecer colocado hasta 48 horas, y no debe retirarse antes de 6 horas después del coito.**
- **Existen en dos tamaños.**
- **Actúa como el diafragma.**

# CAPUCHÓN CERVICAL



# CAPUCHÓN CERVICAL



Método de barrera:  
El capuchón cervical  
se ajusta cómodamente  
sobre el cuello uterino  
e impide que los  
espermatozoides  
penetren en el útero

# ESPONJA


- **Se coloca en la vagina antes de la relación sexual**
- **Puede permanecer colocada hasta 24 horas, independiente del número de relaciones sexuales, y no debe retirarse antes de 6 horas después del coito**
- **Actúa como barrera a los espermatozoides, absorbiendo el semen, y como espermicida**
- **Se fabrican\* en un solo tamaño, lo que facilita su inserción**

*\* Disponibilidad en Canadá y Europa: Protectaid y Pharmatex*

# ESPONJA




# ESPONJA



**La esponja absorbe el semen evitando - que pase al interior del útero.**

**El espermicida en la esponja mata a los espermatozoides.**



**Semen**

**Modificado de adam.com**

# **ESPERMICIDA**

- **Se coloca en la vagina antes de la relación sexual.**
- **Su eficacia anticonceptiva es baja y sólo se recomiendan asociados a otras barreras.**
- **La protección anticonceptiva es inmediata (o a los 10-15 minutos) y tienen una efectividad de una hora.**
- **Actúan inactivando o destruyendo a los espermatozoides.**
- **Su uso prolongado puede aumentar el riesgo de ITS.**
- **No protege contra gonorrea y clamidiasis.**

# ESPERMICIDAS

- **Presentación: supositorios, tabletas espumantes, espumas, películas, jaleas y cremas (Impidol, Supoviol y VCF en Chile).**



- **Contienen: Nonoxinol-9, Octoxinol-9, Cloruro de Benzalkonio y/o Menfegol.**



# MÉTODOS DE BARRERA

## EFICACIA ANTICONCEPTIVA

Método	Tasa de Embarazo*	
	Uso Típico	Uso Perfecto
Condón Masculino	15	2
Condón Femenino	21	5
Diafragma con espermicida	16	6
Capuchón**	32	26
Esponja**	32	20
Espermicidas	29	18

\* % de mujeres que se embarazan el primer año de uso.

\*\* Mujeres que han tenido 1 o más partos

*Adaptado de Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud, 2005.*

# **MÉTODOS DE BARRERA**

## **Efectos Colaterales (I)**

**Condón masculino: Alergia al látex y/o al espermicida**

**Condón femenino: No se han descrito**

**Diafragma:**

- Alergia al látex y/o espermicida**
- Dolor en la vejiga y/o recto**
- Infección urinaria**
- Secreción vaginal inusual**
- Irritación cervical y/o vaginal**

# **MÉTODOS DE BARRERA**

## **Efectos Colaterales (II)**



**Capuchón:**                    **Alergia al látex y/o al espermicida**  
**Irritación cervical**

**Esponja:**                    **Alergia al espermicida**  
**Irritación cervical y/o vaginal**  
**Candidiasis vaginal**

**Espermicidas:**            **Alergia**  
**Irritación cervical y/o vaginal**  
**Infección urinaria**

# RECOMENDACIONES PARA EL USO DE PARA EL USO DE MÉTODOS DE BARRERA

- Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud [www.minsal.cl](http://www.minsal.cl)
- Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Practicas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS [www.who.int.reproductive-health](http://www.who.int.reproductive-health)



## **CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS PARA EL USO DE MÉTODOS DE BARRERA (I)**

- **Categoría 4: el uso de espermicidas en personas con alto riesgo de contraer VIH, portadoras de VIH o con SIDA.**
- **Categoría 3: el uso de diafragma y capuchón cervical en personas con alto riesgo de contraer VIH, portadoras de VIH o con SIDA, y con historia de síndrome de shock tóxico.**
- **Categoría 3: el uso de condón, diafragma y capuchón cervical en personas con alergia al látex.**

**Categoría 4: El uso del método representa un riesgo inaceptable.**

**Categoría 3: Los posibles riesgos superan las ventajas de usar el método.**

## **CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS PARA EL USO DE MÉTODOS DE BARRERA (I)**

- **Cuando un embarazo puede exponer la salud de la mujer a un riesgo inaceptable, no se recomiendan estos métodos por las elevadas tasas de fracaso durante el uso típico.**

# **CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS PARA EL USO DE MÉTODOS DE BARRERA (II)**

**No se recomiendan el diafragma y el capuchón:**

- **Antes de la involución uterina completa después de un parto.**
- **Antes de las 6 semanas posteriores a un aborto de II trimestre.**
- **En anomalías anatómicas cervicales y en algunos casos de prolapso.**
- **El capuchón cervical en mujeres con neoplasia intraepitelial cervical y en espera de tratamiento por un cáncer cervical.**

# **CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS PARA EL USO DE MÉTODOS DE BARRERA (III)**

**No se recomiendan los espermicidas:**

- **Para uso como único método anticonceptivo.**
- **Cáncer cervical y neoplasia cervical intraepitelial.**
- **Infección de las vías urinarias.**



# **ESPERMICIDAS**

## **Conclusiones de la OMS y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos basadas en la evidencia científica (2002)**

### **Los espermicidas con Nonoxinol-9:**

- **Aumentan el riesgo de infección por VIH cuando lo usan frecuentemente mujeres con elevado riesgo de infección.**
- **No protege contra ITS como gonorrea y clamidiasis.**
- **No promover el uso de condones lubricados con N-9, sin embargo es mejor el uso de estos a no usar condones.**
- **No usar N-9 por vía rectal.**