


# MÉTODO DE LA AMENORREA DE LACTANCIA

**Dra. Soledad Díaz**  
**Instituto Chileno de Medicina Reproductiva**  
**2017**




# **BASES FISIOLÓGICAS DE LA INFERTILIDAD ASOCIADA A LA LACTANCIA**


# ENDOCRINOLOGÍA EN LAS MUJERES QUE NO AMAMANTAN



# ENDOCRINOLOGÍA EN LAS MUJERES QUE AMAMANTAN



# MECANISMO DE LA INFERTILIDAD ASOCIADA A LA LACTANCIA




**No hay ovulación.  
No hay menstruación.  
(Amenorrea de lactancia)**

# **FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DURACIÓN DE LA AMENORREA**


- **Duración de la lactancia**
- **Lactancia exclusiva o suplementada**
- **Frecuencia y duración de la succión**
- **Intervalos entre mamadas**
- **Amamantamiento nocturno**
- **Intensidad de la succión**
- **Cantidad de suplemento**
- **Características de la población**

# INFLUENCIA DE LA DURACIÓN DE LA LACTANCIA EN LA DURACIÓN DE LA AMENORREA



Adaptado de JK Van Ginneken, 1977

# INFLUENCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN EN LA FUNCIÓN DEL OVARIO



*Adaptado de Howie y col, 1981*




# FRECUENCIA DE SUCCIÓN Y AMENORREA

	<b>ESCOCIA*</b>	<b>CHILE**</b>
<b>Frecuencia de succión</b>	<b>6</b>	<b>&gt;8</b>
<b>% en amenorrea</b>	<b>100</b>	<b>50</b>

*\* Howie y col., 1981; \*\* Díaz y col, 1988*


# RESPUESTA DE PRL A LA SUCCIÓN A LO LARGO DEL PRIMER AÑO POSTPARTO



# INFERTILIDAD ASOCIADA A LA LACTANCIA PRIMERA OVULACIÓN POSTPARTO

- **La primera ovulación puede ocurrir antes de la menstruación, cuando la mujer está en amenorrea.**
- **La fase lútea que sigue es frecuentemente deficiente.**

# NIVELES DE PROGESTERONA EN LOS PRIMEROS CICLOS POSTPARTO



*Díaz y col. Fertil Steril 498, 1992*

# **MÉTODO DE LA AMENORREA DE LACTANCIA (MELA)**

***No basta la lactancia para  
proteger del embarazo ...***



# PROBABILIDAD ACUMULADA DE EMBARAZO SEGUN TIPO DE LACTANCIA

MES POSTPARTO	EXCLUSIVA <sup>a *</sup>	PARCIAL <sup>b</sup>
4	3,8	14,8
6	10,1	17,5
12	23,7	41,0

**a ≠ b p = 0.001, pero la diferencia no es significativa si se incluye condición menstrual en el análisis.**

**\* Incluye suplementos no lácteos desde el 7º mes.**

*Díaz y col. Contraception 38:53, 1988*

***Lo que protege es  
la amenorrea de lactancia ...***





# PROBABILIDAD ACUMULADA DE EMBARAZO SEGUN LA CONDICION MENSTRUAL

MES POSTPARTO	AMENORREA <sup>a</sup>	CICLANDO <sup>b</sup>
4	0.0	26.9
6	0.9	35.6
12	17.2	54.7

Número de mujeres = 236

$a \neq b$   $p < 0.00001$

*Díaz y col. Contraception 38:53, 1988*



## EL CONSENSO DE BELLAGIO

Cuando una mujer está en amenorrea y amamanta en forma exclusiva o casi exclusiva en el post-parto, tiene por lo menos un 98 por ciento de protección contra el embarazo durante seis meses.

---



*Contraception 39: 477-496, 1989*

# EFICACIA ANTICONCEPTIVA DE LA AMENORREA DE LACTANCIA EN LOS PRIMEROS SEIS MESES POSTPARTO

<b>AUTOR/PAIS</b>	<b>TASA DE EMBARAZOS (%)</b>
<hr/> <i>Riesgo Observado</i>	
<b>Díaz/Chile</b>	<b>0.9</b>
<b>Zacharías/Chile</b>	<b>0.0</b>
<b>Sabina/Filipinas</b>	<b>0.2</b>
<b>Kennedy/Multicéntrico</b>	<b>0.7</b>
<b>Pérez/Chile</b>	<b>0.5</b>
<b>Weis/Bangladesh</b>	<b>0.0</b>

*Adaptado del Consenso de Bellagio, Contraception 39: 477-496, 1989*

# EFICACIA ANTICONCEPTIVA DE LA AMENORREA DE LACTANCIA EN LOS PRIMEROS SEIS MESES POSTPARTO

AUTOR/PAIS	TASA DE EMBARAZOS (%)
<b><i>Riesgo Estimado *</i></b>	
Brown/Australia	0.9
Parenteau-Carreau/Canadá	1.0
Lewis/Australia	0.9
Glassier/Escocia	0.5
Israngkura/Tailandia	2.9
Rivera/México	0.9
Shaaban/Egipto	0.0
Gross/Australia	0.7
Short/Australia	0.7

- Según el % de ovulaciones que ocurre antes del primer sangrado postparto

*Adaptado del Consenso de Bellagio, Contraception 39: 477-496, 1989*

# RECUPERACIÓN DE LA FERTILIDAD DURANTE LA LACTANCIA

## *Factores de Riesgo:*


**Primer sangrado post-parto**

**Introducción de suplemento**

**Tiempo post-parto > 6 meses**




# INFLUENCIA DE LA LACTANCIA EN LA FERTILIDAD DESPUÉS DEL PRIMER SANGRADO POSTPARTO



*Díaz y col. Contraception 43:335, 1991*

# INFLUENCIA DE LA SUPLEMENTACIÓN EN LA FUNCIÓN DEL OVARIO



*Adaptado de Howie y col, 1981*

# INFERTILIDAD ASOCIADA A LA LACTANCIA DESPUÉS DE LOS SEIS MESES POSTPARTO

- Las probabilidades de lactancia materna exclusiva son menores
  - Las probabilidades de menstruación y ovulación aumentan
  - La probabilidad de que la ovulación preceda a la menstruación es mayor
  - La probabilidad de una fase lútea adecuada es mayor
- 

*Adaptado de FHI, 1996*



# LA AMENORREA DE LA LACTANCIA COMO ANTICONCEPTIVO

¿Ha tenido su primer  
sangrado post-parto?  
¿Está dando suplementos?  
¿Tiene su hijo/a más  
de seis meses?

**SI**




- \* Tiene más riesgo de embarazo
- \* Use otro método anticonceptivo
- \* Siga lactando por la salud de su hijo o hija

**NO**

No necesita otro método  
pero puede iniciarlo  
si lo desea

# RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MELA


- Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud 2016 [www.minsal.cl](http://www.minsal.cl)
- Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS [www.who.int.reproductive-health](http://www.who.int.reproductive-health)



# CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS

**No hay restricciones para el uso de la amenorrea de lactancia como anticonceptivo, si se cumplen las condiciones establecidas por el *Consenso de Bellagio*.**

**Las limitaciones son las condiciones en que no puede establecerse una lactancia adecuada.**



# CONDICIONES QUE AFECTAN LA LACTANCIA

- **Infección por VIH**
- **Medicamentos:**  
**antimetabolitos, bromocriptina, anti-coagulantes, dosis altas de cortico-esteroides, ciclosporina, ergotamina, litio, drogas radioactivas, reserpina, y drogas que modifiquen el ánimo**
- **Condiciones del niño**



# LA AMENORREA DE LACTANCIA (MELA) PROPORCIONA:

- **Anticoncepción efectiva durante los primeros seis meses posparto.**
- **Tiempo para educación y orientación.**
- **La posibilidad de postergar el uso de anticoncepción hormonal.**
- **La posibilidad de insertar un DIU o iniciar otros métodos anticonceptivos sin esperar el primer sangrado ni inducir regla si cumple con los criterios de MELA y con los criterios de elegibilidad de la OMS**



# LA AMENORREA DE LACTANCIA TAMBIÉN PROPORCIONA

- **Tiempo para educación y consejería:**
  - en cuidado del/la lactante
  - en métodos de regulación de la fertilidad
- **La posibilidad de postergar el uso de anticoncepción hormonal**
- **La posibilidad de insertar un DIU sin esperar el primer sangrado posparto**



**Muchas gracias por su atención**

[www.icmer.org](http://www.icmer.org)

[www.anticoncepciondeemergencia.cl](http://www.anticoncepciondeemergencia.cl)

[www.infojoven.cl](http://www.infojoven.cl)