

# **Atenciones de Salud No Solicitadas por Adolescentes en EEUU: Asociaciones entre Características de Riesgo y Preocupación por la Confidencialidad**

**Jocelyn Lehrer, ScD, Robert Pantell, MD,  
Kathleen Tebb, PhD y Mary-Ann Shafer, MD**

**Departamento de Pediatría  
Universidad de California - San Francisco**

**Presentación basada en “Forgone Health Care Among U.S.  
Adolescents: Associations Between Risk Characteristics and  
Confidentiality Concern” *J of Adolescent Health* 40 (2007) 218-26.**

# Oportunidades Perdidas para la Atención de Salud y Preocupación por la Confidencialidad

---

- **Es frecuente que las y los adolescentes en los EEUU no soliciten atención de salud**

**En estudios nacionales con estudiantes de educación media (middle & high school):**

- **27% reportaron no haber solicitado atención que necesitaban (Klein et al. 1999)**
- **19% reportaron no haber solicitado atención que necesitaban en el último año (Ford et al. 1999)**

# Oportunidades Perdidas para la Atención de Salud y Preocupación por la Confidencialidad

---

- La preocupación por la confidencialidad es una de las razones mas importantes para no solicitar atención de salud entre los y las adolescentes en EEUU:
  - Todas las organizaciones importantes de salud adolescente apoyan la confidencialidad
  - La confidencialidad en la atención de adolescentes está protegida por la ley, en distintos grados, en EEUU

# Oportunidades Perdidas para la Atención de Salud y Preocupación por la Confidencialidad

---

- Estudio nacional: la confidencialidad fue la razón más importante (35%) para no atenderse (Klein et al. 1997)
- Colegios suburbanos de educación media: 17% no solicitaron atención por temor a que sus padres lo supieran (Ford et al. 1997)
- Clínicas de planificación familiar: 59% dejarían de usar los servicios si se requiriera notificación a los padres para prescribir anticonceptivos (Reddy et al. 2002)

# Oportunidades Perdidas para la Atención de Salud y Preocupación por la Confidencialidad

---

- Los estudios previos no han investigado las características de riesgo de las y los jóvenes que no han solicitado atención de salud debido a preocupación por la confidencialidad
  - Conductas de riesgo para la salud
  - Problemas de salud
  - Relaciones con los padres

# Propósito del Estudio

---

- **Examinar características de riesgo de adolescentes de EEUU que citan la preocupación por la confidencialidad como razón para no haber solicitado atención de salud cuando lo necesitaban en el último año**

# Estudio Nacional Longitudinal de Salud de Adolescentes

---

- Estudio nacional de salud y conductas de adolescentes: 7 años, 3 entrevistas (1995-2002)
- Muestra estratificada randomizada de 80 escuelas de educación media & 52 escuelas con grados 6-8
- Estratificación: región, urbanización, composición racial/étnica, tipo & tamaño de la escuela
- Entrevista 1, 1995: n=18,924; tasa de respuesta=79%

# Hipótesis

---

**Es más probable que las y los adolescentes citen la confidencialidad como razón para no haber solicitado atención de salud si informan que:**

- **Alguna vez han tenido relaciones sexuales**
- **No usaron anticonceptivos** en la última relación sexual
- **Tienen historia de ITS** (solo las mujeres)
- **Han consumido alcohol**
- **Han fumado cigarrillos**
- **Han tenido síntomas depresivos** severos o moderados
- **Han tenido ideación suicida, intentos de suicidio**
- **Tienen comunicación insatisfactoria con los padres**



# Muestra del Estudio

---

- **1123 adolescentes hombres**
- **1315 adolescentes mujeres**
  - **Participaron en la Entrevista 1 a domicilio**
  - **Informaron no habían solicitado atención de salud que necesitaban en el ultimo año**
  - **Edad 13-17 años**
  - **Padre / madre participó en la Entrevista 1 a domicilio**

# Variables de Control

---

- **Edad**
- **Raza/etnia**
  - Blanca no-hispánica, negra no-hispánica, hispánica, otra
- **Seguro de salud**
  - Privado, HMO, privado/HMO, Medicaid, ninguno, otro
- **Nivel más alto de educación de los padres**
  - Media o menor; Mayor que media

# Variable Dependiente

---

- **Citaron la preocupación por la confidencialidad como razón para no atenderse cuando lo necesitaron en el último año.**

**P: “Que evitó que consultaras un profesional de salud cuando realmente lo necesitaste?”**

**R: “No quería que mis padres supieran”**

# Métodos de Análisis

---

- **Regresión logística bivariada & multivariada**
- **Ecuaciones para calcular estimadores mediante modelos generalizados (GEE)**
- **Pesas ajustadas**
- **SAS Versión 8**

# Estadísticas Descriptivas de la Muestra

---

- **Edad promedio: 15.3 (DE 1.3)**
- **Raza/etnia: 66% blanco no-hispánico, 17% negro no-hispánico, 12% hispánico, 5% otro**
- **Educación de los padres: Media o menor: 40%**
- **Seguro de salud: 48% privado, 21% HMO, 10% Medicaid, 15% ninguno**
- **Preocupación por la confidencialidad: 10.5% hombres  
14.3% mujeres**

## Hombres: Sujetos que reportaron características de riesgo según preocupación por la confidencialidad (%)

	Mencionaron confidencialidad	
	NO	SI
Mala comunicación con los padres	7	14 <sup>*</sup>
No usaron anticonceptivos en la última relación sexual	14	18
Síntomas depresivos severos	12	29 <sup>**</sup>
Ideación suicida	15	25 <sup>*</sup>
Intento de suicidio	3	13 <sup>***</sup>

\*p<.05 \*\*p<.01 \*\*\*p<.001

## Mujeres: Sujetos que reportaron características de riesgo según preocupación por la confidencialidad (%)

	Mencionaron confidencialidad	
	NO	SI
Mala comunicación con los padres	13	21**
Han tenido relaciones sexuales	41	60**
No usaron anticonceptivos en la última relación sexual	17	28**
Historia de ITS	2	5*
Consumo de alcohol	57	73**
Síntomas depresivos severos	21	39***
Ideación suicida	27	50***
Intento de suicidio	11	24***

\*p<.05 \*\*p<.01 \*\*\*p<.001

# Hombres: Asociaciones entre las Características de Riesgo y la Preocupación por la Confidencialidad

<b>Variable Independiente</b>	<b>Razón de riesgo ajustada OR (95% CI)</b>
Sint. depresivos severos	<b>3.73 (1.79-7.75)<sup>***</sup></b>
Ideación suicida	<b>1.90 (1.05-3.43)<sup>*</sup></b>
Intento de suicidio	<b>5.87 (2.27-15.17)<sup>***</sup></b>

\*p<.05 \*\*\*p<.001



# Mujeres: Asociaciones entre las Características de Riesgo y la Preocupación por la Confidencialidad

Variable independiente	Razón de riesgo ajustada OR (95% CI)
Mala comunicación con los padres	1.81 (1.16-2.81)**
Han tenido relaciones sexuales	2.24 (1.30-3.85)**
No usaron anticonceptivos en la última relación sexual	1.89 (1.18-3.03)**
Historia de ITSI	2.93 (1.17-7.32)*
Consumo de alcohol	2.03 (1.29-3.20)**

\*p<.05   \*\*p<.01   \*\*\*p<.001

# Mujeres: Asociaciones entre las Características de Riesgo y la Preocupación por la Confidencialidad

Variable independiente	Razón de riesgo ajustada OR (95% CI)
Sint. depresivos severos	3.83 (2.25-6.52) <sup>***</sup>
Sint. depresivos moderados	2.10 (1.28-3.45) <sup>**</sup>
Ideación suicida	2.82 (1.83-4.35) <sup>***</sup>
Intento de suicidio	2.79 (1.53-5.07) <sup>***</sup>

\*p<.05    \*\*p<.01    \*\*\*p<.001

# Conclusiones

---

- **Los y las adolescentes de EEUU que no solicitan atención de salud debido a su preocupación por la confidencialidad representan una población de alto riesgo que necesita de los servicios de salud.**
- **Varias e importantes características de riesgo, relacionadas con salud mental, salud sexual y reproductiva y consumo de sustancias, se asocian a una mayor probabilidad de reportar la confidencialidad como razón para no haber solicitado atención de salud.**

# Limitaciones

---

- **No se pudo examinar los problemas específicos de salud por los cuales no se solicitó atención**
- **Análisis transversal**
- **Datos de auto-reporte**
- **Los resultados son generalizables solo para jóvenes que van a la escuela**

# Implicancias para la Práctica Clínica

---

- **Los proveedores de servicios de salud pueden ayudar a reducir la preocupación por la confidencialidad como barrera para el uso de los servicios por parte de las y los adolescentes**
- **Proveedores de salud deben educar rutinariamente a los padres e hijos, empezando antes de la adolescencia, sobre los parametros de atención confidencial para adolescentes**

# Implicancias para la Práctica Clínica

---

- **Los resultados destacan la importancia de entregar consistentemente una oportunidad para una conversación privada**
  - Muchos jóvenes desean hablar con un profesional de salud sobre temas delicados que conciernen a su salud
  - Puede mejorar la utilización de los servicios de salud
- **Importancia de “screening,” consejería y sistemas de referencia para las preocupaciones delicadas de salud de los y las adolescentes, y explicaciones específicas sobre la confidencialidad**

# Implicancias para las Políticas Públicas

---

- **Contexto actual de la política en EEUU: hay esfuerzos a nivel federal y estatal para restringir el acceso a la atención confidencial de los menores**
- **Si se aumentan las restricciones a la confidencialidad, es probable que disminuya la utilización de los servicios de salud por parte de jóvenes que tienen un riesgo particularmente alto de resultados negativos en cuanto a su salud**
- **Los resultados del estudio entregan evidencia para mantener y posiblemente fortalecer las protecciones para la confidencialidad**

# Financiamiento / Agradecimientos

---

- Centers for Disease Control & Prevention, Division of STD Prevention
- Bureau of Maternal & Child Health – LEAH Grant 5T7MC00003
- Bureau of Health Professions
- Agency for Healthcare Research & Quality