


ANTICONCEPCIÓN EN PERSONAS EN RIESGO DE ADQUIRIR, CURSANDO O VIVIENDO CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) INCLUYENDO VIH/SIDA

**Dra. Roxana Caviedes, Dra. Soledad Díaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
2017**



ICMER

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)

- **Definición:**
- **Conjunto de cuadros infecto-contagiosos.**
- **Agentes patógenos: bacterias, virus, parásitos y hongos.**
- **Tienen en común la vía de transmisión: relaciones sexuales (vaginales, anales u orales).**
- **Algunas ITS también se contagian por transfusiones con sangre contaminada, material corto-punzante contaminado (ej. compartir agujas en uso de drogas endovenosas), desde una madre a su hijo/a durante el embarazo, el parto o la lactancia, o a través de la piel.**
- **Actualmente se conocen alrededor de 30 tipos de ITS diferentes.**



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Las ITS han estado presentes desde el inicio de la historia y han causado verdaderas epidemias, que han afectado a grandes masas de la población.

Son una de las causas más frecuentes de enfermedad aguda, infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

En la historia de la humanidad podemos encontrarlas:

- En **Papiros egipcios** (1350 AC), que describen signos y síntomas.
- En el **Viejo Testamento** (Levíticos, Cap. 15), llamadas “enfermedades impuras”.
- En Roma, llamadas “**morbis incidens**”, donde se usaban preservativos hechos de tripa de carnero (“camisa de Venus”).
- En el **Código de Hammurabi** (2250- 2200 AC) se hablaba de la sífilis.
- En los **Tratados médicos** de la China, de hace 4.500 años, aparecía el concepto de “higiene sexual”.
- En el Siglo XIII llamadas “**Enfermedades sociales**”.
- En el siglo XVI comenzó a utilizarse en medicina el término **venéreo**, del latín venerius (‘relativo a Venus’ la diosa romana del amor).



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN CHILE

- La edad de mayor frecuencia de ocurrencia de las diferentes ITS es entre los 20 y 49 años de edad. La tasa es más alta en hombres que en mujeres.
- Las infecciones más frecuentes son las producidas por sífilis, virus de la inmunodeficiencia humana, virus del papiloma humano (VPH) y gonorrea.
- La incidencia de la ITS ha disminuido desde la década de los 80 con el uso del preservativo después de la aparición de los primeros casos de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- Presentan una relativa estabilización entre 2014 y 2016 excepto por gonorrea entre los 15 y 24 años.

Situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en Chile 2016. DEIS, MINSAL.

VIH/SIDA EN CHILE

- **Los primeros casos de VIH/SIDA se diagnosticaron en 1984.**
- **Se estima que en Chile se infectan aproximadamente 5.000 personas por año y que hay aproximadamente 65.000 personas infectadas. El principal grupo poblacional afectado es el de adultos entre 20 y 39 años.**
- **Hasta el 2014, 9.327 personas fallecieron por SIDA. La tasa de mortalidad ha disminuido en los últimos años por impacto de las terapias antirretrovirales.**
- **En el 2016, la razón hombre : mujer fue 6 y la principal vía de transmisión fue la vía sexual.**

Situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en Chile 2016. DEIS, MINSAL.

ANTICONCEPCIÓN E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

La salud sexual y reproductiva implica el derecho de evitar al mismo tiempo :

- Embarazos no deseados mediante el uso de métodos anticonceptivos eficaces**
- Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)**

Debe considerarse siempre la necesidad de una “doble protección” o un “doble método”

DOBLE PROTECCIÓN



La doble protección (protección anticonceptiva y protección contra ITS/VIH) se consigue con el uso consistente y correcto del condón masculino.



DOBLE MÉTODO

Como la eficacia anticonceptiva del condón puede ser baja en el uso habitual (15 por 100):

Se recomienda el uso simultáneo de otro método anticonceptivo de mayor eficacia, lo que se ha llamado doble método.



DOBLE MÉTODO

Cuando una mujer tiene una o más patologías severas en las que un nuevo embarazo pueda exponer su salud a un riesgo inaceptable, o cuando un embarazo es inaceptable para la mujer, por cualquier razón:

- **No se recomienda el uso aislado de métodos de barrera como anticonceptivo.**
- **Debe considerarse el uso de “doble método.”**

EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN E ITS

- **Es especialmente importante en las/os adolescentes por su mayor vulnerabilidad.**
- **La participación de los hombres es crucial.**
- **Se debe promover el uso del doble método.**
- **Se deben identificar**
 - **los factores de riesgo para ITS**
 - **el grado de protección deseado contra el embarazo**
 - **las condiciones de salud de la mujer que requieren especial cautela.**








EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN E ITS

Sobre el uso del condón:

- **Entregar instrucciones claras**
- **Uso de modelos anatómicos**
- **Formar habilidades para la negociación en el uso**



COLOCACIÓN CORRECTA DEL CONDÓN MASCULINO



- Usar un condón nuevo cada vez
- Abrir con cuidado de no romper
- Coloque el condón en el pene erecto antes de cualquier contacto con la vagina, la boca o el ano
- Sin desenrollar apretar la punta para sacar el aire
- Retirlo de la vagina o el ano antes de perder la erección
- Desecharlo en la basura, quemarlo o enterrarlo
- Usar lubricantes manufacturados a partir de agua, glicerina y otros productos hechos especialmente para ser usados con condones. No usar lubricantes elaborados con derivados del petróleo
- Transportarlo lejos del calor, la humedad
- Verificar la fecha de vencimiento

FACTORES DE RIESGO PARA ITS:

- **Antecedentes demográficos: Menor de 20 años y ser soltero/a o sin pareja estable**
- **Comportamiento: Nueva pareja o más de una pareja en menos de 3 meses, la pareja tiene otra/s parejas**
- **Antecedentes clínicos: Historia de ITS o PIP**
- **Pareja con síntomas de ITS**
- **Sintomatología de ITS**

MÉTODOS DE BARRERA Y PROTECCIÓN ITS:

- **Condón masculino de látex:**
 - **Prevención eficaz de sífilis, gonorrea, clamidia, tricomonas y VIH.**
 - **Cierta protección contra la transmisión genital del virus del papiloma humano (VPH) y del virus de herpes simple (VHS), pero no de la transmisión de piel a piel de estas infecciones.**



MÉTODOS DE BARRERA Y PROTECCIÓN ITS:

- **Condón femenino:**
 - En el laboratorio, el condón femenino ha demostrado ser impermeable al paso de espermatozoides y de organismos infecciosos, incluyendo el VIH.
 - Es probable que proteja de las ITS si se usa en forma correcta y sistemática, pero
 - Hay pocos datos de estudios clínicos acerca de su eficacia para prevenir el VIH.
 - Es una alternativa cuando la mujer no puede negociar el uso del condón masculino o su uso está contraindicado (alergia al látex) o en los casos en que la mujer desea usar y controlar ella el método anticonceptivo.




MÉTODOS DE BARRERA Y PROTECCIÓN ITS:

- **Diafragma/capuchón cervical: no ofrecen protección contra el VIH.**
- **Espermicidas: El uso frecuente de espermicidas con Nonoxinol-9 se asocia a un mayor riesgo de adquirir VIH porque produce lesiones en la mucosa vaginal. No protegen contra la transmisión de ITS bacterianas (gonorrea y clamidia).**



MÉTODOS HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS:

- Tendrían un posible efecto protector contra enfermedades inflamatorias pelvianas sintomáticas.
- No protegen contra las ITS/VIH por lo que las usuarias de métodos hormonales deben ser orientadas a usar el condón (doble método) si están en riesgo de adquirir una ITS/VIH



MÉTODOS HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS:

- El uso de anticonceptivos combinados orales (ACO) por más de 5 años se asocia a un incremento en el riesgo relativo de cáncer cervical (2.8, IC 1.5-5.4) **sólo en mujeres infectadas con tipos oncogénicos del virus del papiloma humano**. El riesgo disminuye al suspender el uso y desaparece a los 10 años. *



* WHO. Cervical cancer, oral contraceptives and parity. WHO WER77:167-8, 2002. Lancet 2007; 370:1609.

MÉTODOS NO HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS

- **Dispositivos intrauterinos (DIU):**
Su uso está asociado a mayor riesgo de PIP en mujeres con clamidia y gonorrea. El riesgo se detecta especialmente en el primer mes después de la inserción.

| TIEMPO POS-INSERCIÓN | TASA DE PIP * |
|----------------------|---------------|
| Todo | 1.6 |
| Primeros 20 días | 9.7 |
| Mas de 20 días | 1.4 |

* Tasa cruda por 1000 años-mujer
Farley y col. Lancet 339:785, 1992



MÉTODOS NO HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS

➤ Dispositivos intrauterinos (DIU):


Los procedimientos para evaluar la presencia o no de ITS son esenciales antes de realizar la inserción. La inserción requiere técnica aséptica.

No tienen efecto protector contra las ITS virales incluyendo VIH.



MÉTODOS NO HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS

- **La esterilización quirúrgica, los métodos de abstinencia periódica, la amenorrea de lactancia y el coito interrumpido no ofrecen protección contra ITS.**



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E ITS/VIH EN CURSO

- **Las personas con ITS en curso (actuales), inclusive el VIH, pueden utilizar la mayoría de los métodos anticonceptivos.**
- **Sólo hay restricciones en el caso de los DIU.**

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E ITS/VIH EN CURSO

- **Dispositivos intrauterinos (DIU) y Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS, inicio del método :**

Categoría 4: Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) o ITS en curso con cervicitis purulenta, clamidia o gonorrea.

Categoría 3: SIDA

Categoría 2/3: Alto riesgo de ITS,
SIDA en terapia antirretroviral



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E ITS/VIH EN CURSO

- **Dispositivos intrauterinos (DIU) y Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS, continuación del método :**

Categoría 2: Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) o ITS en curso con cervicitis purulenta, clamidia o gonorrea. Tratar con DIU *in situ* Retirar solo en caso de que no responda

SIDA




Alto riesgo de ITS



EN RESUMEN

Para el uso seguro de los métodos anticonceptivos en mujeres con ITS, incluyendo VIH, o en riesgo de adquirir estas infecciones se deben seguir las recomendaciones de:

- Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile 2017 www.minsal.cl
- Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS www.who.int.reproductive-health



Muchas gracias por su atención



ICMER
INSTITUTO CHILENO DE MEDICINA REPRODUCTIVA

EL USO CORRECTO DEL CONDÓN PREVIENE EMBARAZOS NO PLANIFICADOS Y PROTEGE DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL INCLUIDO EL VIH/SIDA

PARA MAYOR INFORMACIÓN, VISITA NUESTROS SITIOS WEB:


www.infojoven.cl
www.icmer.org
www.anticoncepciondeemergencia.cl

Este material fue elaborado por ICMER con el apoyo de la Fundación FORD Santiago, Chile, 2006.




protégete
usa
CONDONES

ICMER




¿Qué es?

El condón es una funda delgada de látex que se pone en el pene erecto, antes del contacto con los genitales y durante toda la relación sexual.




¿Cómo hay que usarlo?




- + Utilice condones en todas las relaciones sexuales y uno nuevo para cada relación.
- + Coloque el condón en el pene erecto antes de la penetración vaginal, anal u oral.
- + Abra el paquete cuidadosamente por uno de los bordes para no dañar el condón.
- + Tome el condón y sin desenrollarlo colóquelo en la punta del pene erecto.
- + Apriete la punta del condón para dejarlo sin aire y desenrolle el condón desde la punta hasta la base del pene (esto evita roturas)
- + Después de la eyaculación y antes de perder la erección, retire el pene de la vagina, sujetando el condón desde la base (para evitar que quede dentro de la vagina).

¿Para qué sirve?

El condón es útil para evitar el embarazo y es efectivo para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual o ITS, incluyendo el VIH/SIDA, porque es una barrera contra los espermatozoides y los gérmenes.




Importante:



- + NO DEBE REUTILIZARLO.
- + Deseche el condón en la basura. No lo deje al alcance de los niños.
- + No use doble condón, aumenta el riesgo de rotura.
- + Puede usar lubricantes como glicerina, agua o saliva.
- + No use lubricantes como: vaselina, aceite de cocina, aceite para bebé, cremas/lociones para la piel o mantequilla, porque dañan el condón y se puede romper.
- + Evite exponerlos al calor, la luz y la humedad, ya que pueden dañarse.
- + Transpórtelos en un lugar protegido, no en la billetera.
- + Revise la fecha de vencimiento. No use condones vencidos.
- + Es aconsejable practicar su uso antes de usarlo por primera vez, por ej.: durante la masturbación.

¿Quiénes no pueden usarlo?




- + Las personas que tengan alergia al látex.
- + Si el condón viene lubricado con el espermicida nonoxinol-9, no lo deben usar las personas en riesgo de contraer VIH, o portadoras de VIH/SIDA.

¿Qué molestias puede causar?

Algunas personas pueden presentar alergia al látex o al espermicida.

¿Qué hacer si se rompe?



Si se rompe el condón y quiere prevenir un embarazo, puede usar las **pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE)**.