



Instituto de  
Salud Pública  
Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

BOLETÍN DE LABORATORIO Y VIGILANCIA AL DÍA

# Vigilancia de *Neisseria gonorrhoeae*. Chile, 2010 - 2016.

BOLETÍN VOL. 6, NO. 12, DICIEMBRE 2016.






## Vigilancia de *Neisseria gonorrhoeae*. Chile, 2010 - 2016.

### 1. ANTECEDENTES

La gonorrea, causada por *Neisseria gonorrhoeae*, es la segunda infección de transmisión sexual (ITS) bacteriana más frecuente, provocando una morbilidad importante y un alto costo en atención en salud (2).

Figura 1.



Fuente: Sociedad Americana de Microbiología (ASM)

*Neisseria gonorrhoeae* pertenece al género *Neisseria* dentro de la Familia *Neisseriaceae*. Es una bacteria Gram-negativa, intra y extracelular, no formadora de esporas, inmóvil, posee cápsula, con apariencia de granos de café bajo el microscopio (Figura 1). Requiere ambiente aeróbico con 10% de CO<sub>2</sub> y medio enriquecido como agar chocolate para su desarrollo. Es oxidasa positiva y algunas cepas producen  $\beta$ -lactamasa. Las colonias son pequeñas, húmedas y no pigmentadas después de 18-24 h de incubación (3).

*N. gonorrhoeae*, causa millones de casos de gonorrea al año en todo el mundo, provocando infecciones sintomáticas o asintomáticas, es capaz de infectar diferentes tipos de mucosas dependiendo de las prácti-

cas sexuales. Se ubica de preferencia en la uretra del hombre y en el cuello uterino de la mujer. Su principal forma de transmisión es a través de las relaciones sexuales no protegidas y, ocasionalmente, a través del canal del parto en los recién nacidos (4).

El Ministerio de Salud de Chile, reportó para el año 2015, una tasa de 10 casos de gonorrea por cien mil habitantes lo que representa un aumento del 20% respecto del año anterior (3).

Las muestras deben tomarse ante la sospecha de infección gonocócica y enviarlas al laboratorio tan pronto sea posible. Se realiza tinción de Gram, cultivo, identificación y estudio de susceptibilidad antimicrobiana, idealmente antes de iniciar tratamiento con antimicrobianos (4).

Actualmente las metodologías diagnósticas de carácter molecular han desplazado la utilización del cultivo, especialmente en los países desarrollados, sin embargo la realización del cultivo es fundamental para los estudios de susceptibilidad y vigilancia de la resistencia antimicrobiana (5).

Tras la emergencia y diseminación de la resistencia a las fluoroquinolonas y azitromicina, los antimicrobianos como las cefalosporinas se han transformado en la base del tratamiento (6). El reporte internacional de cepas resistentes a este antimicrobiano y la capacidad de *N. gonorrhoeae* para evolucionar y desarrollar resistencia a los antimicrobianos constituye una preocupación de Salud Pública a nivel mundial (5,7).

En Chile, el Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria establece que las ITS (gonorrea, sífilis e infección por VIH/SIDA), son enfermedades de notificación universal y obligatoria, por los establecimientos asistenciales, tanto públicos como privados. Además, este Reglamento establece que *N. gonorrhoeae* está sujeta a vigilancia para la resistencia de los antimicrobianos (8), siendo el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) el Laboratorio Nacional y de Referencia. El ISP es parte de la Red Internacional GASP-LAC (Gonococcal Antimicrobial Susceptibility Surveillance Program in Latin America and Caribbean), cuyo objetivo es reforzar las redes de Salud Pública que investigan la emergencia de resistencia antimicrobiana de aislamientos de *N. gonorrhoeae* en América Latina y el Caribe, a través de la estandarización y control de calidad externo.

## 2. MATERIALES Y MÉTODOS

---

Se analizó la base de datos correspondiente a todas las cepas confirmadas como *N. gonorrhoeae* en el ISP, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2016.

El Laboratorio de Agentes de Infecciones de Transmisión Sexual, realiza la confirmación microbiológica de cepas de *N. gonorrhoeae* a través de técnicas convencionales como: batería de pruebas bioquímicas en que se investiga la producción de ácido por oxidación a partir de carbohidratos, y test rápidos como Oxidasa, Superoxol y Tinción de Gram.

El estudio de susceptibilidad antimicrobiana es realizado por el método de Difusión en Agar (Kirby-Bauer) y mediante el método epsilométrico (E-test), según información actualizada y estándares del Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) y EUCAST vigentes. Los antimicrobianos testeados en ambas técnicas son: penicilina, tetraciclina, ciprofloxacino, ceftriaxona, azitromicina y cefixime.

Los datos se capturaron y procesaron en el paquete Excel 2010 y el software estadístico Stata 13. Las bases se depuraron asegurando que cada registro corresponda a un caso único y se procesaron de acuerdo a su procedencia y fecha de recepción de muestra en el Laboratorio de referencia. Los resultados se representaron en tablas y gráficos.


### Resultados vigilancia de *N. gonorrhoeae*, 2010 – 2016.

En el período de estudio, comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 30 de junio 2016, el Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual del ISP ha confirmado 6.801 cepas de *N. gonorrhoeae*.

### Cepas confirmadas de *N. gonorrhoeae* por año.

Se observa un aumento en el número de cepas confirmadas de *N. gonorrhoeae*, entre los años 2010 y 2015. El año 2015 se confirmó el mayor número de casos (1.640), con un aumento de un 208,3% en relación al año 2010. Desde enero hasta junio del año 2016, se observa un aumento de un 5,8% en el número de cepas confirmadas en comparación con el mismo periodo del año 2015 (Figura 1).

**Figura 1: Cepas confirmadas de *Neisseria gonorrhoeae* por año. Chile, 2010 - 2016\*.**




\*Datos hasta 30 de junio de 2016.

Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

### Cepas confirmadas de *N. gonorrhoeae* por sexo.

En la Figura 2 se observa que en el período 2010 – junio 2016 el mayor número de cepas confirmadas pertenecen a hombres, lo que corresponde al 90,2% (6.134/6.801) del total de confirmadas. En cada año del período predominó el porcentaje de cepas correspondiente a hombres, con porcentajes entre un 84,9% y 92,9%. Desde el año 2013 se dispone de información referente al sexo de las personas del cual provienen las cepas confirmadas.

**Figura 2: Cepas confirmadas de *Neisseria gonorrhoeae* por año y sexo. Chile, 2010 - 2016\*.**



\*Datos hasta 30 de junio de 2016.

Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

### Cepas confirmadas de *N. gonorrhoeae* por región.

Con relación a la distribución geográfica de la presencia de las cepas de *N. gonorrhoeae* confirmadas en el período 2010 – junio 2016, el mayor número de cepas corresponde a la Región Metropolitana (63,3%), seguido por la Región del Biobío (7,4%), que ha mostrado un aumento importante en el número de cepas confirmadas desde el año 2010, y en tercer lugar la Región de Coquimbo (6,7%).

La Tabla 1 muestra el número de cepas confirmadas por Servicio de Salud y año. El 5,9% (399/6.801) de las cepas fueron derivadas del Servicio de Salud de Coquimbo, 4% (270/6.801) de Metropolitano Sur, 3,6% de Concepción (248/6.801) y 3,3% (227/6.801) de Arica. Destaca también que el 52,8% (3.591/6.801) de las cepas confirmadas, proviene de establecimientos privados de la Región Metropolitana.

**Tabla 1: Cepas confirmadas de *N. gonorrhoeae* por Servicio de Salud y año. Chile, 2010 - 2016\*.**

Región	Servicio de Salud	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Arica y Parinacota	Arica	5	25	60	47	31	42	17	227
	Privado	0	0	0	0	0	1	1	2
Tarapacá	Iquique	3	1	21	33	50	40	5	153
	Privado	1	1	0	7	7	13	5	34
Antofagasta	Antofagasta	1	11	14	9	24	44	45	148
	Privado	1	0	0	5	12	29	20	67
	Otros	0	0	1	15	13	15	13	57
Atacama	Atacama	0	0	0	2	0	5	3	10
	Privado	0	0	0	3	1	4	1	9
Coquimbo	Coquimbo	29	36	36	33	86	122	57	399
	Privado	3	2	5	12	7	22	6	57
	Sin Información	0	0	0	1	0	0	0	1
Valparaíso	Aconcagua	2	2	2	0	3	1	0	10
	Valparaíso San Antonio	19	21	17	13	15	18	13	116
	Viña del Mar Quillota	1	8	4	8	8	3	5	37
	Privado	0	0	2	3	32	34	16	87
	Otros	0	0	0	0	8	8	4	20
Metropolitana	M. Central	5	19	5	16	24	25	11	105
	M. Norte	4	1	0	6	6	4	3	24
	M. Occidente	3	1	1	5	0	3	0	13
	M. Oriente	1	2	4	2	3	5	1	18
	M. Sur	36	36	40	45	56	42	15	270
	M. Sur Oriente	8	12	8	25	45	70	32	200
	Privado	339	392	446	544	637	829	404	3591
Otros	12	21	11	9	9	6	13	81	
O'Higgins	Libertador B. O'Higgins	0	1	4	1	0	4	2	12
	Privado	1	3	2	6	12	14	4	42
Maule	Maule	10	7	4	4	10	20	13	68
	Privado	0	0	0	0	3	3	0	6
Bíobío	Bíobío	0	0	0	1	0	1	0	2
	Concepción	9	23	52	38	49	56	21	248
	Ñuble	0	4	1	11	8	19	18	61
	Talcahuano	5	22	27	18	26	15	15	128
	Privado	2	2	3	10	9	24	10	60
	Otros	0	0	1	0	0	0	0	1
Araucanía	Araucanía Sur	1	3	2	1	1	3	14	25
	Privado	0	0	0	1	1	13	12	27
Los Ríos	Valdivia	7	13	12	9	3	0	3	47
	Privado	0	4	0	1	3	3	3	14
Los Lagos	Chiloé	2	4	3	0	4	22	8	43
	Osorno	0	4	10	7	7	3	6	37
	Reloncaví	8	23	14	12	23	53	42	175
	Privado	0	1	1	0	2	2	1	7
Aisén	Aisén	8	9	1	11	9	0	3	41
Magallanes	Magallanes	0	0	0	1	0	0	4	5
	Privado	0	0	1	0	0	0	0	1
Sin Información		6	9	0	0	0	0	0	15
Total		532	723	815	975	1247	1640	869	6801

\*Datos hasta 30 de junio de 2016.

Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

### Susceptibilidad antimicrobiana de cepas de *N. gonorrhoeae*.

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de susceptibilidad antimicrobiana del total de cepas de *N. gonorrhoeae* analizadas en el período 2010 – junio 2016.

De los aislamientos analizados por año, ninguno presentó resistencia a ceftriaxona durante el período estudiado. Se observó una disminución en la sensibilidad a la ciprofloxacino de un 67% en 2010 a un 37% en 2015. Por otro lado, la sensibilidad más alta a la penicilina se observó en el 2010 con un 15%, mientras que entre el 2011 y el 2015 este porcentaje oscila entre 4% y 8%. El estudio de cefixime se realiza a partir del año 2016 donde se observó que el 100% fueron sensibles.

**Tabla 2: Resultados análisis de susceptibilidad de cepas de *N. gonorrhoeae*. Chile, 2010 - 2016\*.**

Año	Categorías de susceptibilidad		Antibióticos					
			CRO	CIP	AZM <sup>a</sup>	PEN	TET	IX
2010	Sensible	n	499	354	182	78	257	0
		%	100%	67%	97%	15%	68%	0%
	Intermedio	n	0	13	4	275	79	0
		%	0%	2%	2%	52%	21%	0%
	Resistente	n	0	162	1	176	40	0
%		0%	31%	1%	33%	11%	0%	
Total de aislamientos evaluados			499	529	187	529	376	0
2011	Sensible	n	706	483	612	31	541	0
		%	100%	68%	87%	4%	77%	0%
	Intermedio	n	0	4	81	430	107	0
		%	0%	1%	11%	61%	15%	0%
	Resistente	n	0	219	13	245	57	0
%		0%	31%	2%	35%	8%	0%	
Total de aislamientos evaluados			706	706	706	706	705	0
2012	Sensible	n	742	503	593	27	514	0
		%	100%	68%	80%	4%	69%	0%
	Intermedio	n	0	8	136	474	177	0
		%	0%	1%	18%	64%	24%	0%
	Resistente	n	0	231	13	241	51	0
%		0%	31%	2%	32%	7%	0%	
Total de aislamientos evaluados			742	742	742	742	742	0
2013	Sensible	n	884	516	554	70	664	0
		%	100%	58%	79%	8%	75%	0%
	Intermedio	n	0	13	129	582	184	0
		%	0%	1%	18%	66%	21%	0%
	Resistente	n	0	359	16	236	40	0
%		0%	40%	2%	27%	5%	0%	
Total de aislamientos evaluados			884	888	699	888	888	0
2014	Sensible	n	1148	501	861	82	786	0
		%	100%	44%	84%	7%	68%	0%
	Intermedio	n	0	33	111	633	292	0
		%	0%	3%	11%	55%	25%	0%
	Resistente	n	0	615	50	434	71	0
%		0%	54%	5%	38%	6%	0%	
Total de aislamientos evaluados			1148	1149	1022	1149	1149	0
2015	Sensible	n	1478	548	864	81	970	0
		%	100%	37%	79%	5%	66%	0%
	Intermedio	n	0	39	199	748	414	0
		%	0%	3%	18%	51%	28%	0%
	Resistente	n	0	891	37	649	94	0
%		0%	60%	3%	44%	6%	0%	
Total de aislamientos evaluados			1478	1478	1100	1478	1478	0
2016*	Sensible	n	790	278	587	45	524	790
		%	100%	35%	77%	6%	66%	100%
	Intermedio	n	0	18	138	354	229	0
		%	0%	2%	18%	45%	29%	0%
	Resistente	n	0	494	39	391	37	0
%		0%	63%	5%	49%	5%	0%	
Total de aislamientos evaluados			790	790	764	790	790	

\*Datos hasta 30 de junio de 2016.

a. Según EUCAST, 2013.


CRO: Ceftriaxona, CIP: Ciprofloxacino, AZM: Azitromicina, TET: Tetraciclina, PEN: Penicilina, IX: Cefixime.

Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

La Figura 3 muestra la evolución del porcentaje de sensibilidad a ceftriaxona, ciprofloxacino, azitromicina y penicilina de las cepas confirmadas de *N. gonorrhoeae*, entre los años 2010 y 2016.

En esta se observa un 100% de cepas sensibles a ceftriaxona, mientras que para azitromicina como ciprofloxacino se observó una disminución en el porcentaje de sensibilidad.

**Figura 3: Porcentaje de cepas de *N. gonorrhoeae* sensibles a antimicrobianos, por año. Chile, 2010 - 2016\*.**




\*Datos hasta 30 de junio de 2016.  
Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

Las Figuras 4, 5, 6 y 7 muestra la distribución de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) a penicilina, ciprofloxacino, azitromicina y ceftriaxona, de las cepas confirmadas de *N. gonorrhoeae*, para los años 2010 al 2015.


Con relación a la distribución de cepas respecto de la CIM observada para penicilina y ciprofloxacino, se observó un comportamiento estable entre los seis años del período, mientras que en la distribución para azitromicina se observó una mayor variación entre el año 2010 y el resto del período de estudio, con un traslado de la curva hacia rangos mayores de CIM. Con relación a la distribución de cepas respecto de la CIM observada para ceftriaxona, se observó una disminución de cepas con CIM de 0,002 µg/ml para los años 2012-2015 en comparación con los años 2010-2011, mientras que el orden se invierte para valores superiores a 0,004 µg/ml, donde aumenta el porcentaje de cepas para los años 2012-2015 en comparación con los años 2010-2011.

**Figura 4: Susceptibilidad in vitro de cepas de *N. gonorrhoeae* a penicilina, por año. Chile, 2010 - 2015.**




Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

**Figura 5: Susceptibilidad in vitro de cepas de *N. gonorrhoeae* a ciprofloxacino, por año. Chile, 2010 - 2015.**




Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

**Figura 6: Susceptibilidad in vitro de cepas de *N. gonorrhoeae* a azitromicina, por año. Chile, 2010 - 2015.**



Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

**Figura 7: Susceptibilidad in vitro de cepas de *N. gonorrhoeae* a ceftriaxona, por año. Chile, 2010 - 2015.**



\*Se agrupó la categoría <0,016 con los CIM de 0,016 para el año 2015.  
Fuente: Laboratorio de Agentes de Infección de Transmisión Sexual. ISP.

## CONCLUSIÓN

En el período 2010 – junio 2016, se confirmaron 6.801 cepas de *N. gonorrhoeae*, alcanzando el mayor número el año 2015 (1.640 cepas), con un aumento de un 208,3% respecto a las cepas confirmadas el año 2010 (532 cepas).

En cada año del período de estudio predominaron las cepas provenientes de hombres alcanzando un 90,2% del total de cepas confirmadas en el período 2010 - junio 2016.

Respecto a la procedencia de las cepas, las regiones más frecuentes corresponden a la Metropolitana (63,3%), del Biobío (7,4%) y de Coquimbo (6,7%).

En cuanto a la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas confirmadas de *N. gonorrhoeae*, no se observó resistencia a ceftriaxona en todo el período, y se observó una disminución en la sensibilidad a ciprofloxacino de un 67% en 2010 a un 37% en 2015. Para azitromicina se observó un fenómeno similar pero de manera más discreta disminuyendo la sensibilidad de un 97% en 2010 a un 77% en 2016. Por otro lado, la sensibilidad a penicilina osciló entre 15% y 4%. El estudio de cefixime se realiza a partir del año 2016 donde se observó que el 100% de las cepas fueron sensibles.

Dados los recientes reportes internacionales de cepas resistentes a cefalosporinas de tercera generación, lo que genera un grave problema terapéutico, es de vital importancia realizar el cultivo del agente y vigilar la resistencia de *N. gonorrhoeae* a estos antimicrobianos.

### 3. REFERENCIAS

---

1. Organización Mundial de Salud (OMS). GUIDELINES FOR THE Treatment of *Neisseria gonorrhoeae* [Internet]. WHO; 2016 [citado 2016 Dic 14]. Disponible <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246114/1/9789241549691-eng.pdf?ua=1>
2. Government of Canada PHA of *C. Neisseria gonorrhoeae* - Pathogen Safety Data Sheets [Internet]. 2011 [citado 12 Dic 2016]. Disponible <http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/neisseria-gon-eng.php>
3. Ministerio de Salud de Chile. Departamento de Epidemiología. Situación epidemiológica de gonorrea (CIE 10: A54). Chile, 2015. [citado 12 Dic 2016]. Disponible [http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/09/INFORME\\_ANUAL\\_GONORREA\\_2015.pdf](http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/09/INFORME_ANUAL_GONORREA_2015.pdf)
4. Public Health Agency of Canada. Summary: Diagnosis and Management of Gonococcal Infections [Internet]. 2014 [citado 19 Dic 2016]. Disponible <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/gono-inf-eng.php>
5. Public Health Agency of Canada. Canada Communicable Diseases Report CCDR. Volumen 41-02, Febrero 5, 2015.[Internet]. [citado 16 feb 2016]. Disponible <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/gono-inf-eng.php>
6. Ministerio de Salud de Chile. Departamento Programa Nacional de prevención y Control del VIH/SIDA e ITS. Norma de profilaxis, Diagnóstico y Tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 2016.
7. CDC National Center for Immunization and Respiratory Diseases. Antibiotic Resistant Gonorrhea [Internet]. 2016 [citado 19 dic 2016]. Disponible <https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/arg/default.htm>
8. Ministerio de Salud de Chile. Decreto Supremo N°158/05. Reglamento sobre Notificación de Enfermedades transmisibles de Declaración Obligatoria.