



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

## DIRECTRICES



# DIRECTRICES UNIFICADAS SOBRE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH PARA GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

JULIO DEL 2016

GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE



**DIRECTRICES UNIFICADAS SOBRE  
PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO,  
TRATAMIENTO Y ATENCIÓN  
DE LA INFECCIÓN POR  
EL VIH PARA GRUPOS DE  
POBLACIÓN CLAVE**

**JULIO DEL 2016**

Versión oficial en español de la obra original en inglés  
Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations - 2016 update  
© World Health Organization 2016  
ISBN: 978-92-4-151112-4

Directrices unificadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por el VIH para grupos de población clave. Julio del 2016.  
ISBN: 978-92-75-32007-5

© Organización Panamericana de la Salud 2018

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo>).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OPS. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si se hace una adaptación de la obra, incluso traducciones, debe añadirse la siguiente nota de descargo junto con la forma de cita propuesta: "La presente adaptación no es obra de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la adaptación. La edición original en inglés será el texto auténtico y vinculante".

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

**Forma de cita propuesta.** *Directrices unificadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por el VIH para grupos de población clave.* Julio del 2016. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2018. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

**Catalogación (CIP):** Puede consultarse en <http://iris.paho.org>.

**Ventas, derechos y licencias.** Para comprar publicaciones de la OPS, véase [www.publications.paho.org](http://www.publications.paho.org). Para presentar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, véase [www.paho.org/permissions](http://www.paho.org/permissions).

**Materiales de terceros.** Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo cuadros, figuras o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. Recae exclusivamente sobre el usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros.

**Notas de descargo generales.** Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la OPS los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

La OPS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

# ÍNDICE

<b>AGRADECIMIENTOS</b>	<b>vii</b>
<b>ABREVIATURAS Y SIGLAS</b>	<b>x</b>
<b>DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES</b>	<b>xi</b>
<b>RESUMEN</b>	<b>xiii</b>
<b>1 INTRODUCCIÓN</b>	<b>2</b>
1.1 Grupos de población clave y grupos vulnerables	2
1.2 El VIH en los grupos de población clave	4
1.2.1 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	4
1.2.2 Personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados	4
1.2.3 Personas que consumen drogas inyectables	5
1.2.4 Trabajadores sexuales	5
1.2.5 Personas transgénero	6
1.2.6 Superposición de vulnerabilidades y riesgos diferentes	6
1.2.7 Adolescentes y jóvenes de poblaciones clave	6
1.3 Servicios específicos para las poblaciones clave: una inversión racional	7
1.3.1 Aspectos fundamentales para la dinámica de la epidemia	7
1.3.2 La ampliación de la cobertura puede lograr un cambio	7
1.4 Alcance de estas directrices sobre las poblaciones clave	8
1.5 Uso de estas directrices	8
1.6 Meta y objetivos	10
1.7 Público destinatario	10
1.8 Principios de las directrices	10
<b>2 METODOLOGÍA Y PROCESO DE FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES</b>	<b>14</b>
2.1 Perspectiva general	14
2.2 Grupos participantes en la formulación de las directrices	14
2.3 Definición del alcance de las directrices	15
2.4 Examen de los datos	16
2.4.1 Información sobre las prisiones y otros entornos cerrados	16
2.5 Formulación de las recomendaciones sobre la profilaxis anterior a la exposición	16
2.6 Evaluación de la evidencia	16

2.6.1	Interpretación de la calidad de evidencia .....	16
2.6.2	Determinación del rigor de las recomendaciones .....	17
2.7	Examen sobre la prestación de servicios, los métodos de ejecución y los estudios de casos .....	18
2.8	Redacción de las directrices .....	18
2.9	Plan de difusión .....	18
2.10	Actualización .....	18
<b>3</b>	<b>CONJUNTO INTEGRAL DE INTERVENCIONES .....</b>	<b>20</b>
3.1	Servicios para todas las poblaciones clave .....	20
3.2	Consideraciones específicas .....	21
3.2.1	Prisiones y otros entornos cerrados .....	21
3.2.2	Personas que utilizan drogas inyectables .....	21
3.2.3	Adolescentes en poblaciones clave .....	22
<b>4</b>	<b>INTERVENCIONES DEL SECTOR DE LA SALUD .....</b>	<b>24</b>
4.1	Prevención .....	24
4.1.1	Programas integrales de distribución de preservativos y lubricantes .....	24
4.1.2	Reducción de los daños para las personas que utilizan drogas inyectables .....	26
4.1.3	Intervenciones sobre el comportamiento .....	36
4.1.4	Prevención de la transmisión en los servicios de atención de la salud .....	38
4.1.5	Prevención mediante antirretrovirales .....	39
4.1.6	Circuncisión masculina médica voluntaria como método de prevención de la infección por el VIH .....	43
4.2	Pruebas de detección del VIH y orientación subsiguiente .....	45
4.3	Vinculación e incorporación en la atención .....	48
4.4	Tratamiento y atención de la infección por el VIH .....	49
4.4.1	Tratamiento antirretroviral .....	49
4.4.2	Prevención de la transmisión maternoinfantil .....	52
4.4.3	Interacciones medicamentosas del tratamiento antirretroviral .....	54
4.5	Prevención y tratamiento de las coinfecciones y las comorbilidades .....	56
4.5.1	Tuberculosis .....	56
4.5.2	Hepatitis virales .....	60
4.5.3	Salud mental .....	63
4.6	Atención general .....	64
4.6.1	Nutrición .....	64
4.6.2	Intervenciones relativas a la salud sexual y reproductiva .....	65
<b>5</b>	<b>ELEMENTOS FACILITADORES FUNDAMENTALES .....</b>	<b>74</b>
5.1	Derecho y políticas .....	75
5.1.1	Obstáculos jurídicos .....	75
5.1.2	Elementos facilitadores fundamentales .....	76
5.2	Estigma y discriminación .....	82
5.2.1	Obstáculos .....	82
5.2.2	Elementos facilitadores .....	82

5.3	Poder de decisión de la comunidad .....	85
5.3.1	Obstáculos .....	85
5.3.2	Elementos facilitadores fundamentales .....	85
5.4	Violencia .....	90
5.4.1	Obstáculos .....	90
5.4.2	Elementos facilitadores fundamentales .....	91
<b>6</b>	<b>PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS .....</b>	<b>96</b>
6.1	Panorama general .....	96
6.2	Estrategias fundamentales de prestación de los servicios .....	98
6.2.1	Integración de los servicios .....	98
6.2.2	Descentralización de los servicios .....	100
6.2.3	Delegación de funciones en la prestación de los servicios .....	101
6.2.4	Enfoques basados en la comunidad .....	102
6.3	Factores importantes que considerar cuando se prestan servicios a todas las poblaciones clave .....	105
<b>7</b>	<b>ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA: EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA .....</b>	<b>114</b>
7.1	Introducción .....	114
7.1.1	Principios rectores .....	114
7.2	Conocer la situación .....	116
7.3	Planificación y ejecución de la respuesta .....	117
7.4	Seguimiento y evaluación de la respuesta .....	118
7.5	Proceso continuo de planificación y elaboración de la respuesta .....	119
	<b>REFERENCIAS .....</b>	<b>124</b>

## APÉNDICES

Todos los apéndices (en inglés) pueden encontrarse en la página web de la OMS en [http:// www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/](http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/).

- Apéndice 1 Profilaxis previa a la exposición para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: revisión sistemática
- Apéndice 2 Profilaxis previa a la exposición para las personas que consumen drogas inyectables: revisión sistemática
- Apéndice 3 Valores y preferencias: informe unificado
- Apéndice 3.1 Valores y preferencias de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: el tratamiento antirretroviral como método de prevención
- Apéndice 3.2 Valores y preferencias de las personas que consumen drogas inyectables y opiniones de expertos, activistas y prestadores de servicios: prevención de la infección por el VIH, reducción de daños y aspectos relacionados
- Apéndice 3.3 Valores y preferencias de las personas transgénero: estudio cualitativo
- Apéndice 4 Intervenciones de salud en las prisiones: revisión bibliográfica
- Apéndice 5 Ejemplos de buenas prácticas de los programas que cubren las necesidades de los grupos de población clave
- Apéndice 6.1 El VIH y los jóvenes transgénero
- Apéndice 6.2 El VIH y los jóvenes que hacen trabajo sexual
- Apéndice 6.3 El VIH y los jóvenes que consumen drogas inyectables
- Apéndice 6.4 El VIH y los hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con hombres
- Apéndice 7 Recomendación relativa a la prevención relacionada con los antirretrovirales: texto procedente de la versión del 2014 de las directrices consolidadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados frente al VIH para grupos de población clave

# AGRADECIMIENTOS

## Grupo de formulación de directrices y grupo consultivo

**Copresidentes:** **Chris Beyrer** (Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos) y **Adeeba Kamarulzaman** (Universidad de Malaya, Malasia).

**Elie Aaraj**<sup>#</sup> (Middle East & North Africa Harm Reduction Association [MENAHRRA], Líbano), **Eliot Albers**<sup>\*</sup> (Red Internacional de Personas que Consumen Drogas [INPUD], Reino Unido), **George Ayala**<sup>\*</sup> (Foro Mundial sobre HSH y VIH [MSMGF], Estados Unidos), **Carlos F. Cáceres** (Sexualidad y Desarrollo Humano, Universidad Cayetano Heredia, Perú), **Kate Montecarlo Cordova**<sup>#</sup> (Asociación de Personas Transgénero en las Filipinas [ATP], Filipinas), **Tetyana Deshko**<sup>#</sup> (Alianza Internacional contra el VIH/SIDA en Ucrania), **Daouda Diouf**<sup>#</sup> (Enda Santé, Senegal), **Zoë Dodd**<sup>#</sup> (Red Internacional de Personas que Consumen Drogas [INPUD], Canadá), **Frits van Griensven** (Thai Sociedad de la Cruz Roja en Tailandia, Universidad Chulalongkorn, Tailandia), **Mengjie Han**<sup>#</sup> (Centro Nacional para el Control y la Prevención del SIDA/ETS, CDC en China, República Popular de China), **Ralf Jürgens** (Open Society Foundations, Estados Unidos), **Mehdi Karkouri**<sup>#</sup> (Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd, Marruecos), **JoAnne Keatley** (Centro de Excelencia para la Salud Transgénero, Estados Unidos), **Anita Krug**<sup>#</sup> (Youth RISE, Australia), **Joep Lange**<sup>\*</sup> (Universidad de Ámsterdam, Países Bajos), **Keletso Makofane**<sup>#</sup> (Foro Mundial sobre HSH y VIH, Sudáfrica), **Jessie Mbwambo**<sup>#</sup> (Universidad Muhimbili de Salud y Ciencias Afines, Tanzania), **Fabio Mesquita** (Ministerio de Salud, Brasil), **Noah Metheny**<sup>\*</sup> (Foro Mundial sobre HSH y VIH [MSMGF], Estados Unidos), **Ruth Morgan Thomas** (Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual [NSWP], Reino Unido), **Debbie Muirhead** (Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio [DFAT], Indonesia), **Patrick Mutua Mburugu** (Ministerio de Salud Pública y Sanidad, Kenya), **Ed Ngoksin** (Red Mundial de Personas que Viven con el VIH [GNP+], Sudáfrica), **Sam Nugraha**<sup>#</sup> (Tratamiento basado en la Comunidad [Rumah Singgah PEKA], Indonesia), **Tonia Poteat** (Oficina del Coordinador de la Ayuda Mundial para el Sida de los Estados Unidos [OGAC], Estados Unidos), **Ganesh Ramakrishnan** (Fundación Bill y Melinda Gates, India) y **Sushena Reza-Paul**<sup>#</sup> (Universidad de Manitoba, Canadá; Ashodaya Samithi, India).

<sup>#</sup> Solo integra el grupo de formulación de directrices.

<sup>\*</sup> Solo integra el grupo consultivo.

## Colaboradores en las revisiones sistemáticas con el sistema GRADE

**Caitlin Kennedy** y **Virginia Fonner** (Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos) y **Nandi Siegfried** (epidemióloga clínica independiente, Sudáfrica).

## Colaboradores con la evidencia de apoyo

**Sonya Arreola**, **George Ayala**, **Jack Beck**, **Keletso Makofane** (Foro Mundial sobre HSH y VIH [MSMGF], Estados Unidos), **Margaret Harris** (consultor de la OMS), **Mary Henderson** (consultor de la OMS), **Mira Schneiders** (consultor de la OMS), **Amee Schwitters** (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Estados Unidos) y **Kate Welch** (consultor de la OMS).

## Revisores expertos externos

**Peter Aggleton** (Centre for Social Research in Health, Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia), **Eliot Albers** (Red Internacional de Personas que Usan Drogas [INPUD], Reino Unido), **George Ayala** (Foro Mundial sobre HSH y VIH [MSMGF], Estados Unidos), **Sylvia Ayon** (Consorcio de ONG sobre Sida de Kenya, Kenya), **Stef Baral** (Centro para la Salud Pública y los Derechos Humanos, Escuela de Salud Pública Bloomberg de la

Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos), **Taib Basheeb** (Reachout Center Trust, Kenya), Nicholas Bates (The Albion Centre, Australia), **Parinita Bhattacharjee** (Universidad de Manitoba, Kenya, y Unidad de Apoyo Técnico del Programa Nacional de Control del Sida y las ITS [NAS COP TSU], Kenya), **Sha'ari bin Ngadiman** (Ministerio de Salud, Malasia), **Jamie Bridge** (Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Reino Unido), **Jude Byrne** (Red Internacional de Personas que Usan Drogas [INPUD], Australia), **Gabriela Calazans** (Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, Brasil), **Mohamed Chakroun** (Facultad de Medicina, Universidad de Monastir, Túnez), **Xiang-Sheng Chen** (Centro Nacional de Control de las Enfermedades de Transmisión Sexual, República Popular de China), **Mauro Cabral** (GATE, Acción Global para la Igualdad Trans\*, Argentina), **Mean Chhi Yun** (Centro Nacional para el Control y la Prevención del VIH e ITS, Camboya), **Joy Cunningham** (FHI360, Estados Unidos), **Louisa Degenhardt** (Centro Nacional de Investigación sobre Drogas y Alcohol [NDARC], Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia), **Justus Eisfeld** (GATE, Acción Global para la Igualdad Trans\*, Estados Unidos), **Benham Farhoudi** (Universidad Islámica Azad, Filial Médica de Teherán, Irán), **Naomi Fontanos** (Defensores del Género y el Desarrollo [GANDA], Filipinas), **Le Minh Giang** (Centro de Investigación y Formación en VIH/sida, Viet Nam), **George Githuka** (Ministerio de Salud, Kenya), Kimberly Green (FHI360, Ghana), **Bikash Gurung** (Youth RISE, Nepal), **Wisal Hassan** (Health Alliance International, Sudán), **Lee Hertel** (Red Internacional de Personas que Usan Drogas [INPUD], Estados Unidos), **Chad Hughes** (Centro para la Salud Internacional, Burnet Institute, Australia), **Smarajit Jana** (Instituto Sonagachi de Investigación y Formación, India), **Manhong Jia** (Centro Yunnan de Sida/ITS, República Popular de China), **Jeremiah Johnson** (Treatment Action Group, Estados Unidos), **Kianoush Kamali** (Programa Nacional de Control de Sida, Irán), **John Kashiha** (Fundación Sisi Kwa Sisi de Tanzania, Tanzania), **Deanna Kerrigan** (Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos), **Nduku Kilonzo** (Liverpool VCT, Atención y Tratamiento [LVCT], Kenya), **Natalia Kitsenko** (ONG "El camino a casa", Ucrania), **Kelika A. Konda** (Universidad de California, Los Angeles, Estados Unidos, y Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú), **Bram Langen** (COC Nederland, Países Bajos), **Biangtung Langkham** (Proyecto ORCHID, Asociación del Hospital Emmanuel, India), **Joseph Tak Fai Lau** (Universidad China de Hong Kong, República Popular de China), **Anthony Lisle** (Equipo de Apoyo Regional del ONUSIDA para Asia y el Pacífico, Tailandia), **Lisa Maher** (Institute Kirby de Infección e Inmunidad en la Sociedad, Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia), **Samuel Matsikure** (Gays y Lesbianas de Zimbabwe [GALZ], Zimbabwe), **Marden Marques Soares Filho** (Ministerio de Salud, Brasil), **Susie McLean** (Alianza Internacional contra el VIH/sida, Reino Unido), **Ellen Mitchell** (Fundación KNCV de lucha contra la Tuberculosis, Países Bajos), **Jason Mitchell** (Sociedad de Oceanía para la Salud Sexual y la Medicina del VIH, Fiji), **Joseph Nguu Mombo** (Programa de Extensión para Trabajadores sexuales [SWOP], Kenya), **Jules Mugabo** (OMS, Rwanda), **Lillian Mwooko** (Comunidad Internacional de Mujeres que viven con el VIH [ICW África Oriental], Uganda), **Isidore Obot** (Universidad de Uyo, Nigeria), **Dédé Oetomo** (Coalición de Salud Sexual Masculina de Asia y el Pacífico [APCOM], Indonesia), **Nittaya Phanuphak** (Centro de Investigación sobre Sida de la Cruz Roja en Tailandia, Tailandia), **Midnight Poonkasetwattana** (Coalición de Salud Sexual Masculina de Asia y el Pacífico [APCOM], Tailandia), **Made Yogi Oktavian Prasetia** (Bali Medika Clinic, Indonesia), **Asa Radix** (Centro Comunitario de Salud Callen Lorde, Estados Unidos), **Kevin Rebe** (Instituto de Salud ANOVA, Sudáfrica), **Helen Rees** (Instituto Wits de Reproducción e Investigación sobre VIH, Sudáfrica), **Gary Reid** (consultor independiente, India), **Kirill Sabir** (FtM Phoenix Group, Rusia), **Bettina Schunter** (consultora independiente, Pakistán), **Sopheap Seng** (Centro Nacional de lucha contra el VIH/sida, Camboya), **Maninder Singh Setia** (dermatólogo y epidemiólogo independiente, India), **Sally Shackleton** (Grupo Especial de Defensa y Educación de trabajadoras y trabajadores del sexo [SWEAT], Sudáfrica), **Kate Shannon** (Centro para la Excelencia sobre el VIH/sida de la Columbia Británica, Canadá), **Oscar Ozmund Simooya** (Universidad Copperbelt, Zambia), Tim Sladden (Fondo de Población de las Naciones Unidas, Turquía), **Mat Southwell** (Coact, Reino Unido), **Rosario Jessica Tactacan-Abrenica** (Hospital San Lázaro, Filipinas), **Siti Nadia Tarmizi** (Ministerio de Salud, Indonesia), **Pham Thi Minh** (Red de Personas que Usan Drogas de Viet Nam [VNPUD], Viet Nam), **Marguerite Thiam-Niangoin** (Ministère de la santé et de la lutte contre le SIDA, Côte d'Ivoire), **Tengiz Tsertsvadze** (Centro de Investigación sobre Sida e Inmunología Clínica, Georgia), **Bea Vuylsteke** (Instituto de Medicina Tropical, Bélgica), **Darshana Vyas** (Pathfinder International, India), **Daniel Wolfe** (Open Society Foundations, Estados Unidos), **William Chi Wai Wong** (Universidad de Hong Kong, China) y **Tariq Zafar** (Nai Zindagi, Pakistán).

## Representantes de organismos de las Naciones Unidas y otros asociados

Jenny Butler (Fondo de Población de las Naciones Unidas, Estados Unidos), **Monica Ciupagea** (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Austria), **Clifton Cortez** (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Centro Regional de Asia y el Pacífico, Tailandia), **Karl Dehne** (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Suiza), **Mauro Guarinieri** (Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis

y la Malaria, Suiza), **Fabienne Hariga** (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Austria), **Michel Kazatchkine** (enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el VIH y el sida en Europa oriental y Asia central, Suiza) y **Mariângela Simão** (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Suiza).

## Personal y consultores de la OMS

Los siguientes funcionarios de la OMS participaron en la formulación de las directrices: **Avni Amin** (Departamento de Salud Reproductiva e Investigación), **Annabel Baddeley** (Programa Mundial contra la Tuberculosis), **Nathalie Broutet** (Departamento de Salud Reproductiva e Investigación), **Nicolas Clark** (Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias), **Meg Doherty** (Departamento de VIH), **Martín Donoghoe** (Oficina Regional para Europa), **Philippa Easterbrook** (Programa Mundial contra la Hepatitis), **Jane Ferguson** (Departamento de Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente), **Nathan Ford** (Departamento de VIH), **Mary Lyn Gaffield** (Departamento de Salud Reproductiva e Investigación), **Raúl Gonzalez-Montero** (Departamento de VIH), **Joumana Hermez** (Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental), **Knut Lonroth** (Programa Mundial contra la Tuberculosis), **Rafael Mazin** (Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional de la OMS para las Américas), **Eyerusalem Negussie** (Departamento de VIH), **Lisa Nelson** (Departamento de VIH), **Susan Norris** (Secretaría del Comité de Examen de Directrices), **Martina Penazzato** (Departamento de VIH), **Nathan Shaffer** (Departamento de VIH), Marco Vitoria (Departamento de VIH), **Teodora Wi** (Departamento de Salud Reproductiva e Investigación), **Stefan Wiktor** (Programa Mundial contra la Hepatitis), **Kouadio Yeboue** (AFRO, Equipo de Apoyo entre países para África Occidental) y **Pengfei Zhao** (Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental).

Agradecemos especialmente a los siguientes consultores de la OMS que colaboraron con la redacción, la coordinación y la investigación para definir las directrices: Cadi Irvine, **Alice Armstrong**, **Bradley Mathers**, **Michelle Rodolph**, **Ameé Schwitters** (CDC) y Graham Shaw. Los siguientes consultores de la OMS también participaron en la formulación de estas directrices: **Katie Curran**, **Cheryl Johnson** y **Kevin O'Reilly**. Los pasantes que apoyaron el proceso: **Carmen Figueroa**, **Pramudie Gunaratne** y **George Mugambi**.

**Nadia Hilal McDonald** prestó apoyo administrativo en la OMS; *Glenn Thomas* y **Oyuntungalag Namjilsuren** prestaron apoyo de comunicación. **Sala Rinehart** y **Sarah Johnson** (Jura Editorial Services) editaron este documento.

## Coordinación general

**Rachel Baggaley** coordinó el proceso general de formulación de estas directrices con **Annette Verster** y **Cadi Irvine**, bajo la supervisión de **Andrew Ball** y **Gottfried Hirschall** (Departamento de VIH).

## Financiamiento

El Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) financiaron este trabajo, desde las revisiones sistemáticas de la evidencia, la compilación de los datos y la convocatoria a la reunión de expertos hasta la redacción, la revisión y la impresión de las directrices. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria proporcionó financiamiento para solventar el trabajo preparatorio sobre las personas transgénero.

Estas directrices están dedicadas a **Glenn Thomas** del Departamento de Comunicaciones de la OMS, quien murió trágicamente en el vuelo MH17 mientras viajaba hacia la Conferencia Internacional sobre el Sida celebrada en Australia para ayudar a difundir este documento.

## ABREVIATURAS Y SIGLAS

<b>3TC</b>	lamivudina
<b>AR</b>	antiretrovirales (medicamentos)
<b>AZT</b>	zidovudina
<b>CD4</b>	linfocitos CD4
<b>EFV</b>	efavirenz
<b>FTC</b>	emtricitabina
<b>GRADE</b>	método de clasificación de la valoración, la elaboración y la evaluación de recomendaciones
<b>INNTI</b>	inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa
<b>IP</b>	inhibidor de la proteasa
<b>ITS</b>	infección de transmisión sexual
<b>OMS</b>	Organización Mundial de la Salud
<b>LPV/R</b>	lopinavir más ritonavir
<b>ONUSIDA</b>	Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
<b>OPS</b>	Organización Panamericana de la Salud
<b>PEP</b>	profilaxis posterior a la exposición
<b>PEPFAR</b>	Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del Presidente de los Estados Unidos
<b>PNUD</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
<b>PrEP</b>	profilaxis previa a la exposición
<b>PTMI</b>	prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH
<b>RTV</b>	ritonavir
<b>TAR</b>	tratamiento antirretroviral
<b>TDF</b>	(fumarato de disoproxilo de) tenofovir
<b>UNFPA</b>	Fondo de Población de las Naciones Unidas
<b>UNICEF</b>	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
<b>UNODC</b>	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
<b>VHB</b>	virus de la hepatitis B
<b>VHC</b>	virus de la hepatitis C
<b>VIH</b>	virus de la inmunodeficiencia humana
<b>VPH</b>	virus del papiloma humano

# DEFINICIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS IMPORTANTES

Las definiciones que se emplean en estas directrices están armonizadas con las actuales definiciones consensuadas utilizadas por la *Estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011 2015 (1)* y por las Naciones Unidas, como se describe en la Nota de orientación sobre el VIH y el trabajo sexual del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) (2) y otros documentos pertinentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las Naciones Unidas.

Los **grupos de población clave** son grupos definidos que, por sus comportamientos específicos de gran riesgo, presentan una especial susceptibilidad a contraer el VIH *independientemente del tipo de epidemia y del contexto local*. Además, suelen enfrentarse a problemas jurídicos y sociales a causa de estos comportamientos que aumentan su vulnerabilidad al VIH. Estas directrices se centran en cinco grupos de población clave: 1) los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 2) las personas que consumen drogas inyectables, 3) las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados, 4) los trabajadores sexuales de ambos sexos, y 5) las personas transgénero. Las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados también están incluidas en estas directrices debido a la gran frecuencia con que los demás grupos se encuentran encarcelados y los comportamientos de alto riesgo y la falta de servicios relacionados con el VIH que se observan en estos entornos. Los grupos de población clave son importantes para la dinámica de la transmisión del VIH y constituyen asociados esenciales para lograr una respuesta eficaz a la epidemia (1).

Los **grupos en situación de vulnerabilidad** son grupos de personas que en algunas situaciones o contextos, presentan una vulnerabilidad especial a la infección por el VIH, como los adolescentes (en particular, los adolescentes del África subsahariana), los huérfanos, los niños de la calle, las personas con discapacidades y los trabajadores migratorios y móviles. Estos grupos no se ven afectados por el VIH de forma uniforme en todos los países ni en los distintos tipos de epidemias. En las presentes directrices no se abordan específicamente a los grupos en situación de vulnerabilidad, pero gran parte de las recomendaciones también es aplicable a estos grupos.

Los **hombres que tienen relaciones sexuales con hombres** son todos los hombres que mantienen relaciones sexuales o sentimentales con otros hombres. Las distintas culturas y sociedades, así como las distintas personas, interpretan las palabras "hombres" y "relaciones sexuales" de modos diferentes. Por consiguiente, este término abarca una gran variedad de entornos y contextos en los cuales tienen lugar relaciones sexuales entre hombres, independientemente de los múltiples motivos que induzcan a participar en estas relaciones, la autodefinición respecto de la identidad sexual y de género, y las diversas identificaciones posibles con alguna comunidad o algún grupo social particular.

Las **personas que consumen drogas inyectables** son aquellas que se inyectan sustancias psicotrópicas (o psicoactivas) con finalidades no terapéuticas. Estas drogas pueden ser opioides, estimulantes anfetamínicos, cocaína, somníferos, sedantes y alucinógenos. La inyección puede administrarse por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea u otras. No se incluye en esta definición a las personas que se inyectan medicamentos con fines médicos, es decir, que se administran "inyecciones terapéuticas", ni a las personas que se inyectan sustancias no psicotrópicas, como esteroides u otras hormonas, para modelar el cuerpo o mejorar el desempeño atlético. Si bien estas directrices se concentran en las personas que consumen drogas inyectables debido a que están expuestas a un riesgo específico de transmisión del VIH debido al intercambio de los materiales de inyección contaminados con sangre, gran parte de la orientación también es pertinente para las personas que se inyectan otras sustancias.

Las **personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados**: Son muchos los términos que se emplean para nombrar los centros de detención, donde se encuentran las personas que esperan ser juzgadas, que han sido condenadas o que están sujetas a otras condiciones de seguridad. De manera análoga, también se utilizan diferentes términos para denominar a las personas que están detenidas. En este documento de orientación, el término "prisión y otros entornos cerrados" hace referencia a todos los centros de detención en un país y los términos "prisioneros" y "detenidos" se refieren a todas las personas detenidas en prisiones y establecimientos del sistema penal, lo que incluye a los hombres y las mujeres, tanto adultos como jóvenes, durante la investigación

de un crimen o delito, mientras esperan el juicio, después de haber sido condenados, antes de recibir la sentencia y después de haber sido sentenciados. Este término no incluye formalmente a las personas detenidas por motivos vinculados a su situación migratoria o su estado de refugiado, aquellas detenidas sin cargos y aquellas sentenciadas a un tratamiento obligatorio y a centros de rehabilitación. No obstante, la mayoría de las consideraciones de estas directrices también se aplican a estas personas (3).

Las **personas que consumen drogas** comprenden a quienes utilizan sustancias psicotrópicas por cualquier vía: inyectable, oral, inhalada, transmucosa (sublingual, rectal, intranasal) o transdérmica. Es frecuente que en esta definición no entre el consumo de sustancias de uso extendido como las bebidas y los alimentos que contienen alcohol y cafeína.

Los **trabajadores sexuales** son mujeres, hombres y personas transgénero adultas (de 18 años en adelante) que reciben dinero o productos a cambio de servicios sexuales, ya sea de manera regular u ocasional. El trabajo sexual (o prostitución) implica relaciones sexuales consensuadas entre adultos, puede adoptar muchas formas y presenta características variables dentro de cada país y comunidad y entre los distintos países. Asimismo, también varía el grado al cual esta actividad es más o menos “formal” u organizada (4).

Tal como se define en la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños y adolescentes menores de 18 años que intercambian relaciones sexuales por dinero, productos o favores son objeto de “explotación sexual”, de manera que no entran en la definición de “trabajadores sexuales” (5).

Es posible que **muchas personas** pertenezcan a más de un grupo de población clave. Por ejemplo, algunos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y algunas personas transgénero también pueden ser trabajadores sexuales o inyectarse drogas.

El término **transgénero** abarca a todas las personas cuya identidad y expresión de género no se corresponde con las normas y expectativas tradicionalmente asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer e incluye a las personas transexuales y transgénero, así como a aquellas que presentan disconformidad con la identidad de género (6, 7). Las personas transgénero pueden considerarse transgénero, mujeres, hombres, transmujeres o transhombres, transexuales o, en algunas culturas específicas,

*hijra* (India), *kathoey* (Tailandia), *waria* (Indonesia) o alguna de las muchas otras identidades transgénero. Pueden expresar su género de diversas maneras masculinas, femeninas o andróginas. La gran vulnerabilidad y las necesidades de salud específicas de las personas transgénero torna necesario definir un estado diferenciado e independiente en la respuesta mundial a la infección por el VIH.

El riesgo de transmisión por vía sexual no es uniforme entre los distintos subgrupos de la comunidad transgénero. Por ejemplo, el riesgo sexual puede ser mayor para las mujeres transgénero (hombre a mujer) y los hombres transgénero (mujer a hombre) que tienen relaciones anales receptivas con hombres que para los hombres transgénero o las mujeres transgénero que tienen relaciones sexuales solo con mujeres. En muchos países, la prevalencia del VIH en las mujeres transgénero es igual o mayor que la de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Debido a esta disparidad respecto del perfil de riesgo, estas directrices unificadas se centran en las mujeres y los hombres transgénero que tienen relaciones sexuales con otros hombres más que en las mujeres transgénero y los hombres transgénero que tienen relaciones sexuales solo con mujeres (8).

**Niños:** Según el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (5).

**Adolescentes:** Generalmente se consideran adolescentes las personas que tienen entre 10 y 19 años. Los adolescentes no conforman un grupo homogéneo, dado que, si bien la maduración física y emocional viene con la edad, su progreso no es uniforme en todas las personas de la misma edad. Además, hay diferentes factores sociales y culturales que pueden influir en la salud, la capacidad de tomar decisiones personales importantes y la capacidad para obtener acceso a los servicios (9).

En este documento, se usa principalmente el término “adolescentes” pero hay otros términos que abarcan grupos etarios superpuestos:

**Jóvenes:** Este término abarca a las personas que tienen entre 15 y 24 años (10).

**Población joven:** Este término abarca a las personas que tienen entre 10 y 24 años (10).

# RESUMEN

## Finalidad

En estas nuevas directrices unificadas sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por el VIH para grupos de población clave, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reúne toda la orientación existente que es pertinente para cinco grupos clave de la población —los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas que consumen drogas inyectables, las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados, los trabajadores sexuales y las personas transgénero— y actualiza algunas directrices y recomendaciones. El propósito de este documento es, por tanto, proporcionar un conjunto integral de recomendaciones sobre el VIH basadas en la evidencia que son específicas para estos grupos; aumentar el conocimiento sobre las necesidades de los grupos de población clave y las cuestiones que les son importantes; mejorar el acceso, la cobertura y la utilización de servicios eficaces y aceptables; y favorecer un mayor compromiso nacional y mundial para que haya financiamiento y servicios suficientes.

Los comportamientos de riesgo y las vulnerabilidades de las personas de los grupos de población clave se traducen en que estos colectivos se ven afectados desproporcionadamente por el VIH en todos los países y entornos. Estos riesgos desproporcionados reflejan tanto el comportamiento habitual de las personas de dichos grupos como cuestiones jurídicas y sociales específicas que aumentan su vulnerabilidad. Sin embargo, las personas de los grupos de población clave tienen un acceso en gran parte insuficiente a los servicios de atención de la infección por el VIH. En muchos entornos, la incidencia de la infección por el VIH continúa aumentando en estos grupos, pese a que se está estabilizando o ha descendido en la población general.

Hasta la fecha, la OMS ha elaborado directrices normativas por separado para cada uno de los grupos de población clave pero, en general, en ellas no se abordan adecuadamente todas las cuestiones generales sobre estos grupos. De manera similar, las directrices mundiales de la OMS sobre el VIH, incluidas las directrices unificadas del 2013 sobre el uso de los antirretrovirales (TAR), no tienen en consideración cuestiones específicas de los grupos de población clave. En las presentes directrices se procura abordar estas brechas y limitaciones. Los países y otros usuarios han indicado la importancia de consolidar las directrices de la OMS sobre los grupos de población clave para ayudar a los directores de programas nacionales y los prestadores de servicios, entre los que se cuentan los programas basados en la comunidad y guiados por ella, a planificar y poner en marcha servicios de salud específicos para estos grupos de población. Por lo tanto, estas directrices unificadas abordan las cuestiones y los elementos necesarios para prestar servicios eficaces de atención de la infección por el VIH que son comunes a todos los grupos de población clave, así como aquellos que son específicos para uno o varios grupos. Esta edición incluye actualizaciones sobre las nuevas recomendaciones publicadas por la OMS en el 2016, en particular sobre el tratamiento con antirretrovirales y sobre la profilaxis previa a la exposición (PrEP por su sigla en inglés).

## Formato de las directrices

Las directrices se presentan en este documento distribuidas en siete capítulos:

**Capítulo 1:** Antecedentes, contexto, justificación, principios rectores, objetivos y público destinatario.

**Capítulo 2:** Métodos y proceso de formulación de las directrices.

**Capítulo 3:** Conjunto integral de intervenciones. **Capítulo 4:** Intervenciones del sector de la salud. **Capítulo 5:** Elementos facilitadores fundamentales.

**Capítulo 6:** Cuestiones sobre la prestación de los servicios y estudios de casos.

**Capítulo 7:** Orientación sobre la priorización y la planificación de los servicios, el seguimiento y la evaluación, la fijación de metas, los indicadores y los instrumentos para la asignación de costos.

## Metodología de formulación de las directrices

En octubre del 2013, un grupo consultivo externo examinó todas las directrices vigentes y pertinentes de la OMS y determinó las que era necesario actualizar y los nuevos aspectos que había que abordar. Este grupo estuvo conformado por personas de redes y organizaciones de los propios grupos de población clave, representantes del mundo académico, investigadores, directores y ejecutores de programas y organizaciones asociadas de las Naciones Unidas, y contó con el apoyo de secretaría de la OMS.

El grupo consultivo externo propuso que las directrices unificadas sobre los grupos de población clave proporcionaran recomendaciones sobre un amplio espectro de cuestiones relativas a la atención de la infección por el VIH —la prevención, el diagnóstico, la vinculación con los servicios, el tratamiento y la atención integral— e incluyeran recomendaciones y orientaciones sobre los elementos facilitadores fundamentales que son esenciales para respaldar la prestación de servicios de atención a la infección por el VIH que sean seguros, eficaces y aceptables. Los nuevos aspectos que consideraron que era necesario abordar fueron la nueva revisión de los datos sobre la oferta de métodos de profilaxis previa a la exposición al VIH (PrEP) para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y la evaluación de los datos sobre estos métodos para las personas que consumen drogas inyectables, un grupo que no fue considerado en las directrices anteriores. Este grupo consultivo externo también priorizó la formulación de recomendaciones sobre la entrega de naloxona a la comunidad para tratar la sobredosis de opioides y la actualización de las recomendaciones para las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados.

Después de la reunión del grupo consultivo externo celebrada en octubre del 2013, se formó un grupo de formulación de directrices, integrado por la mayoría de los miembros del grupo consultivo externo y algunos otros expertos. En su reunión de marzo del 2014, el grupo de formulación de directrices aprobó por unanimidad una recomendación reformulada sobre la PrEP para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; el voto mayoritario determinó la solidez de la recomendación. Además, el grupo de formulación de directrices examinó y brindó su apoyo pleno a todos los demás aspectos de las directrices vigentes. También en marzo del 2014, otro grupo de formulación de directrices examinó la propuesta de nueva orientación sobre el suministro de naloxona a la comunidad.

Después de estas reuniones, la versión preliminar de las directrices unificadas para los grupos de población clave fue examinada por revisores externos, revisores de organismos de las Naciones Unidas y funcionarios de la OMS del Departamento de VIH/Sida y del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, así como por otros departamentos de la OMS y equipos regionales.

## Recomendaciones

En el cuadro que sigue se resumen las recomendaciones presentadas en este documento.

Todas las recomendaciones y orientaciones incluidas en este documento se derivan de las directrices vigentes de la OMS, a excepción de las nuevas recomendaciones sobre la profilaxis previa a la exposición y el tratamiento extrahospitalario de la sobredosis de opioides. La nueva recomendación sobre la PrEP representa un cambio en las directrices: la recomendación sobre la evaluación de este tipo de profilaxis en proyectos experimentales se ha convertido en una recomendación de que la PrEP forme parte del conjunto de servicios de prevención para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (véase la metodología en el capítulo 2 y la recomendación actualizada en el capítulo 4). La nueva recomendación sobre el tratamiento de la sobredosis de opioides respalda la entrega de naloxona a las personas de la comunidad que podrían presentar una sobredosis y el adiestramiento de estas personas para que sepan administrarla. Las nuevas revisiones de la evidencia relativa a las recomendaciones sobre la atención del VIH de las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados refuerzan las recomendaciones existentes. Respecto de todas las demás recomendaciones, los documentos originales a los que se hace referencia en este documento describen el proceso de formulación de esas directrices.

## Implicaciones para la programación

Hay consideraciones de salud pública y de equidad que subyacen a la necesidad de priorizar y mejorar los servicios de atención de la infección por el VIH para los grupos de población clave. Las presentes directrices centradas en estos grupos procuran ayudar a los países a prestar servicios integrales más eficaces y aceptables de atención de la infección por el VIH a los grupos de población clave, aumentar la cobertura y abordar las inequidades actuales en cuanto al acceso. Los países tendrán que evaluar su situación específica teniendo en cuenta el tamaño actual de

los grupos de población clave y examinando el nivel de cobertura actual y la calidad de los programas. Asimismo, es importante que evalúen y, si es posible, aborden los obstáculos sociales y jurídicos que impiden el acceso y logren avances conforme los permitan las circunstancias propias del país.

## Nuevas investigaciones

El Departamento de VIH está elaborando, junto con las organizaciones asociadas, un marco científico integral para guiar la prestación de la atención de la infección por el VIH, en el que se destacan las prioridades de investigación, así como aquellas relevantes para los grupos de población clave.

## Resumen de las recomendaciones de la OMS sobre los grupos de población clave

INTERVENCIÓNES DEL SECTOR DE LA SALUD	
PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH	
1	Se recomienda que todas las personas de los grupos de población clave utilicen preservativos <b>con lubricantes aptos</b> en todas las relaciones sexuales que mantengan para prevenir la transmisión sexual del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
2	La <b>profilaxis previa a la exposición (PrEP)</b> por vía oral con fumarato de disoproxilo de tenofovir (TDF) debería ser ofertada como alternativa adicional para la prevención del VIH, en personas con un riesgo elevado de adquirir la infección, dentro del marco de las estrategias de prevención combinadas. <b>NUEVA RECOMENDACIÓN</b>
3	Se recomienda que la <b>profilaxis posterior a la exposición (PPE)</b> esté disponible para todas las personas de los grupos de población clave que cumplan los criterios y la soliciten después de una posible exposición al VIH.
4	Se recomienda la <b>circuncisión masculina médica voluntaria</b> como otra estrategia importante para prevenir la infección por el VIH adquirida mediante relaciones heterosexuales, en particular en entornos hiperendémicos o con epidemias generalizadas donde la prevalencia de la circuncisión masculina es baja.
REDUCCIÓN DE DAÑOS PARA LAS PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS	
5	Todas las personas de los grupos de población clave que se inyecten drogas deben tener acceso a material de inyección estéril a través de los <b>programas de distribución de agujas y jeringas</b> .
6	Se recomienda ofrecer <b>tratamiento de sustitución de opioides</b> a todas las personas dependientes de opioides de los grupos de población clave y facilitarles el acceso a este tratamiento.
7	Se recomienda facilitar el acceso a <b>intervenciones basadas en la evidencia</b> , como las intervenciones psicosociales breves que comprenden la evaluación, la retroalimentación específica y el asesoramiento, a todas las personas de los grupos de población clave que consumen cantidades nocivas de alcohol u otras sustancias psicoactivas.
8	Se recomienda que las personas con probabilidad de presenciar una sobredosis de opioides tengan <b>acceso a la naloxona</b> y reciban instrucciones sobre su uso para el manejo de urgencias por presuntas sobredosis de opioides. <b>NUEVA RECOMENDACIÓN</b>
PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH Y ASESORAMIENTO CORRESPONDIENTE	
9	Es preciso ofrecer sistemáticamente a todas las personas de los grupos de población clave la realización voluntaria de pruebas de detección del VIH y la provisión del asesoramiento correspondiente, tanto en la comunidad como en los entornos clínicos. Se recomiendan <b>las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente basados en la comunidad</b> para los grupos de población clave, vinculados con los servicios de prevención, atención y tratamiento, además de la prueba y el asesoramiento iniciados por el prestador de salud.
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH	
10	Las personas de los grupos de población clave que tienen VIH deben tener el mismo acceso que otros grupos al <b>tratamiento antirretroviral (TAR)</b> y a su manejo.

11	Todas las embarazadas pertenecientes a los grupos de población clave deben tener el mismo acceso a los servicios de <b>prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI)</b> y seguir las mismas recomendaciones que las mujeres de otros grupos.
<b>PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE COINFECCIONES Y COMORBILIDADES</b>	
12	Los grupos de población clave deben tener el mismo acceso a los servicios de prevención, detección y tratamiento de la <b>tuberculosis</b> que las personas de otros grupos en riesgo de contraer la infección por el VIH o ya infectadas.
13	Los grupos de población clave deben tener el mismo acceso a los servicios de prevención, detección y tratamiento de las <b>hepatitis B y C</b> que las personas de otros grupos en riesgo de contraer la infección por el VIH o ya infectadas.
14	Se recomienda ofrecer tamizaje sistemático y tratamiento de los trastornos de <b>salud mental</b> (depresión y estrés psicossocial) a las personas de los grupos de población clave que tienen VIH para optimizar los resultados en materia de salud y mejorar el cumplimiento terapéutico con los antirretrovirales. La atención puede comprender desde el asesoramiento conjunto sobre el VIH y la depresión hasta tratamientos médicos apropiados.
<b>SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>	
15	Se recomienda ofrecer a las personas de los grupos de población clave servicios sistemáticos de <b>tamizaje, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual</b> como parte de la prevención y la atención integral de la infección por el VIH.
16	Las personas de los grupos de población clave, incluidas aquellas que tienen VIH, tienen derecho a llevar adelante una vida sexual plena y placentera, y a tener acceso a diversas <b>opciones reproductivas</b> .
17	Las <b>leyes sobre el aborto</b> y los servicios que lo practican deben proteger la salud y los derechos humanos de todas las mujeres, incluidas aquellas que pertenecen a los grupos de población clave.
18	Es importante ofrecer el <b>tamizaje del cáncer cervicouterino</b> a todas las mujeres de los grupos de población clave.
19	Es importante que todas las mujeres de los grupos de población clave gocen del mismo grado de apoyo y acceso a los <b>servicios relacionados con la concepción y la atención del embarazo</b> que las mujeres de otros grupos.
<b>ELEMENTOS FACILITADORES FUNDAMENTALES</b>	
1	Los encargados de formular políticas y líderes de los gobiernos deben examinar las leyes, las políticas y las prácticas y, de ser necesario, modificarlas, fomentando la participación significativa los interesados directos de los grupos de población clave, con el fin de habilitar y respaldar la ejecución y ampliación de los servicios de atención de salud para los grupos de población clave.
2	Los países deben orientar los esfuerzos para aplicar las leyes antidiscriminatorias y protectoras derivadas de las normas de derechos humanos y velar por su cumplimiento con el fin de eliminar el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas de los grupos de población clave.
3	Los servicios de salud deben estar a disposición de los grupos de población clave y ser accesibles y aceptables, estar basados en los principios de la ética médica, el repudio al estigma, la ausencia de discriminación y el derecho a la salud.
4	Los programas deben orientar los esfuerzos para llevar a la práctica un conjunto de intervenciones que tengan por objetivo mejorar el poder de decisión de los grupos de población clave.
5	Es fundamental prevenir la violencia contra las personas de los grupos de población clave y abordar este problema conjuntamente con las organizaciones dirigidas por personas de estos colectivos. Es esencial vigilar y denunciar toda forma de violencia contra las personas de estos grupos e instaurar mecanismos de reparación para impartir justicia.

# INTRODUCCIÓN

# 1

1.1 Grupos de población clave y grupos vulnerables .....	2
1.2 La infección por el VIH en los grupos de población clave .....	4
1.2.1 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres .....	4
1.2.2 Personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados .....	4
1.2.3 Personas que consumen drogas inyectables .....	5
1.2.4 Trabajadores sexuales .....	5
1.2.5 Personas transgénero .....	6
1.2.6 Superposición de vulnerabilidades y riesgos diferentes .....	6
1.2.7 Adolescentes y jóvenes de los grupos de población clave .....	6
1.3 Servicios específicos para los grupos de población clave: una inversión racional .....	7
1.3.1 Aspectos fundamentales para la dinámica de la epidemia .....	7
1.3.2 La ampliación de la cobertura puede lograr un cambio .....	7
1.4 Alcance de estas directrices sobre los grupos de población clave .....	8
1.5 Uso de estas directrices .....	8
1.6 Meta y objetivos .....	10
1.7 Público destinatario .....	10
1.8 Principios de las directrices .....	10

# 1 INTRODUCCIÓN

## 1.1 Grupos de población clave y grupos vulnerables

**Grupos de población clave.** Los comportamientos de riesgo y las vulnerabilidades de algunos grupos de población específicos y sus redes determinan la dinámica de la epidemia de la infección por el VIH. Estas directrices se centran en cinco grupos de población clave, que se ven desproporcionadamente afectados por el VIH en casi todos los entornos:

- los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres;
- las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados;<sup>1</sup>
- las personas que consumen drogas inyectables;
- los trabajadores sexuales y
- las personas transgénero.

Si no se abordan las necesidades de los grupos de población clave, no se logrará una respuesta sostenible frente al VIH.

Estos riesgos desproporcionados reflejan tanto el comportamiento habitual de las personas de estos grupos como los obstáculos jurídicos y sociales específicos que profundizan su vulnerabilidad. Los grupos de población clave influyen en la dinámica de la epidemia y determinan la naturaleza y la eficacia de la respuesta al VIH. Las personas que tienen VIH son fundamentales para la respuesta al VIH y, por consiguiente, también se las suele considerar un grupo de población clave. Sin embargo, en este documento no se distingue a todas las personas que tienen VIH como si se tratara de un grupo de población diferente.

En la mayoría de los países, la cobertura insuficiente y la calidad deficiente de los servicios que reciben los grupos de población clave siguen socavando la respuesta a la epidemia. Todos los países deben tener en cuenta la importancia de llegar a estos grupos de población, comprender sus necesidades y prestar servicios equitativos, accesibles y aceptables. Para lograr este objetivo, es esencial trabajar junto con los grupos y las redes de población clave como asociados en la creación y prestación de servicios (1).

**Grupos vulnerables.** En algunos contextos, hay otros grupos que también son especialmente vulnerables a la infección por el VIH, por ejemplo, los trabajadores migratorios, los refugiados, los camioneros de larga distancia, el personal militar, los mineros y, en el África meridional, las mujeres jóvenes. Estos grupos no presentan una vulnerabilidad uniforme ni se ven igualmente afectados en todos los países y entornos epidémicos. Los países también deben individualizar a estos otros grupos específicos y centrar la atención en ellos para formular y adaptar los servicios adecuadamente.

**Énfasis en los grupos de población clave.** En términos generales, los países deben priorizar en su respuesta a la infección por el VIH a los grupos que son sumamente vulnerables, experimentan la carga más alta de infección y están subatendidos actualmente, entre los que se cuentan tanto algunos grupos vulnerables específicos como, en todos los entornos, los grupos de población clave. En las presentes directrices se formulan recomendaciones en relación con los cinco grupos de población clave ya indicados (tanto adultos como adolescentes), pero también se reconoce que los países tendrán que adaptar su respuesta al tamaño de estos grupos y atender a las necesidades de los grupos vulnerables (véase el recuadro). En las *Directrices unificadas sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH*, la OMS proporciona orientaciones detalladas sobre el tratamiento y la atención de las personas que tienen VIH (2).

<sup>1</sup> El ONUSIDA actualmente incluye entre los grupos de población clave a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales de ambos sexos, las personas que consumen drogas inyectables y las personas transgénero, pero reconoce que las personas reclusas en prisión también son especialmente vulnerables a la infección por el VIH y suelen carecer de acceso suficiente a los servicios.

Si no se abordan las necesidades de los grupos de población clave, no se logrará una respuesta sostenible frente al VIH. Sin embargo, hasta el momento, en la mayoría de los países con epidemias generalizadas de infección por el VIH la respuesta se ha centrado casi exclusivamente en la población general. Incluso los países que reconocen que la epidemia del VIH está concentrada en los grupos de población clave suelen ser reacios a instaurar intervenciones adecuadas que lleguen a quienes las necesitan más.

Para que la respuesta sea eficaz, es necesario contar con más que servicios y programas de apoyo para los grupos de población clave; es preciso incorporar cambios en el sistema y el entorno que solo se pueden lograr mediante una acción concertada. El riesgo de quienes pertenecen tanto a algún grupo de población clave como a algún grupo vulnerable está determinado por muchos factores que, en gran parte, se encuentran fuera de su control. En el caso de los grupos de población clave en particular, los factores sociales, jurídicos, estructurales y contextuales de otro tipo representan una mayor vulnerabilidad al VIH y un menor acceso a los servicios. Algunos de estos factores son la legislación punitiva y las prácticas de vigilancia policial, el estigma y la discriminación, la pobreza, la violencia y los altos niveles de pobreza extrema de algunos subgrupos. Estos factores determinan el grado al que las personas y los grupos y poblaciones pueden protegerse de la infección por el VIH y hacerle frente, además de limitar su acceso a la información, los servicios de prevención y los productos básicos, y la atención y el tratamiento. Además, también suelen ser escasos o inexistentes otros servicios de salud específicos que tienen en cuenta las necesidades de estos grupos clave: por ejemplo, el tratamiento de afirmación de la identidad de género para las personas transgénero y los servicios de reducción de daños para las personas que consumen drogas inyectables. El entorno geográfico y el contexto social también pueden incidir en la vulnerabilidad de estas personas.

Las personas de todos los grupos de población clave siguen siendo objeto de un grado profundo de estigma y discriminación, encuentran obstáculos y limitaciones jurídicas para acceder a los servicios y, a menudo, el sistema de salud pública no las prioriza, ni siquiera desde los ministerios de salud. En muchos entornos, las organizaciones de la comunidad prestan servicios importantes a estos grupos clave. Resulta crucial mejorar las asociaciones y la vinculación entre las organizaciones de la comunidad y los ministerios de salud. El acceso equitativo a la atención de la infección por el VIH así como la prestación de dichos servicios a los grupos clave es sumamente prioritario y depende de que el financiamiento, tanto interno como externo, sea suficiente.

### **Justificación para consolidar las directrices sobre los grupos de población clave**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado directrices sobre cada uno de los cinco grupos de población clave, pero no ha abordado adecuadamente las cuestiones que todos ellos tienen en común ni las necesidades de cada país de formular un enfoque coherente respaldado por un análisis de la situación. En este documento se procura reunir en una sola publicación todas las directrices formuladas por la OMS y los asociados de las Naciones Unidas sobre los cinco grupos de población clave. Por otra parte, también se hace mención de los instrumentos de la OMS y otros documentos sobre las actividades programáticas pertinentes para la salud de estos colectivos, como la información y el seguimiento estratégicos y la evaluación dirigida a estos grupos, junto con las publicaciones de los asociados de las Naciones Unidas y el nuevo material que viene a llenar las lagunas de información.

En estas directrices se abordan los elementos que comparten todos los grupos de la población clave, pero también se destacan algunos problemas y riesgos específicos que son exclusivos de cada grupo. Este enfoque tiene por objeto ayudar los países a planificar, elaborar y vigilar con mayor eficacia y eficiencia programas aceptables y apropiados para los grupos de población clave que sean pertinentes para su contexto epidemiológico particular. En estas directrices se describen los aspectos relativos a la ejecución que deben abordar los servicios para lograr equidad y potenciar al máximo los efectos de las intervenciones.

## 1.2 La infección por el VIH en los grupos de población clave

Los **grupos de población clave** presentan una carga significativa de VIH, por lo que influyen en la dinámica de la epidemia.

Son claros los motivos epidemiológicos por los que los programas contra la infección por el VIH deben centrarse en los grupos de población clave. En muchos entornos, se ha estabilizado o ha descendido la incidencia de la infección por el VIH de la población general pero, a nivel mundial, los grupos clave siguen presentando una carga significativa de VIH, por lo que influyen en la dinámica de la epidemia.

En general, los datos de salud, como la prevalencia de la infección por el VIH, son menos sólidos respecto de los grupos de población clave que de la población general debido a las complejidades que supone el muestreo (y la falta de datos sobre el tamaño muestral), las cuestiones jurídicas y los problemas de estigma y discriminación. Las leyes que tipifican como delito el comportamiento de los miembros de los grupos de población clave dificultan la recopilación de datos representativos. En estas circunstancias, las personas son renuentes a ser consideradas integrantes de estos grupos.

### 1.2.1 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

En la mayoría de los países, la epidemia del VIH sigue en aumento en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En las grandes zonas urbanas, la prevalencia de la infección por el VIH que se registra en este grupo es, por término medio, 13 veces mayor que la registrada en la población general (3). Uno de los motivos de esta alta prevalencia podría ser que la transmisión del VIH a través de las relaciones anales sin preservativo es más eficaz que a través de las relaciones vaginales sin preservativo; además, las relaciones anales receptivas sin protección, el número alto de compañeros varones y el consumo concomitante de drogas inyectables constituyen riesgos a nivel individual (4, 5, 6).

**En todo el mundo**, la epidemia de la infección por el VIH sigue en aumento en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Las estimaciones por región sobre la prevalencia de la infección por el VIH en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres van del 3,0% en Oriente Medio y África del Norte al 25,4% en el Caribe (4). En Kenya, el único país africano que dispone de datos de incidencia sobre la infección por el VIH, recientemente se informó una incidencia anual superior al 20% en Mombasa (4). Otros países

africanos también informan una prevalencia alta, por ejemplo, Côte d'Ivoire, donde se ha estimado que asciende al 18% (7, 8). En otras regiones donde se notifica o modela la incidencia de la infección por el VIH de este grupo, no hay indicios de disminución. De hecho, por ejemplo, China y Tailandia informan que la incidencia está en aumento.

La legislación discriminatoria, la estigmatización (incluso por parte de los trabajadores de salud) y la violencia homofóbica que se observa en muchos países representan los principales obstáculos que dificultan la prestación de servicios de atención a la infección por el VIH a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y limitan el uso de los servicios existentes por parte de este grupo. Muchos países tipifican como delito las relaciones sexuales con personas del mismo sexo (ya sea solo entre los hombres o tanto entre los hombres como entre las mujeres). Hasta diciembre del 2011, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo estaban tipificadas como delito en 38 de los 53 países de África (9). En las Américas, Asia, África y Oriente Medio, 83 países tienen leyes que consideran ilegales las relaciones sexuales entre hombres (10). Las penas y la medida en que se aplica el derecho penal son muy diversas entre los distintos países (11).

### 1.2.2 Personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados

Hay más de 10 millones de hombres y mujeres que viven en prisión y otros entornos cerrados, y alrededor de 30 millones de personas pasan todos los años de la prisión a la sociedad y viceversa (17). A nivel mundial, se calcula que la prevalencia de la infección por el VIH, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis B y C, y la tuberculosis de los grupos reclusos en prisión es dos a diez veces mayor que la correspondiente a la población general (18). La mayor prevalencia de la infección por el VIH y el mayor riesgo de contraer la infección se observa tanto en las personas reclusas en prisión como en el personal penitenciario y su familia en muchos entornos (19).

Además de los comportamientos de riesgo en cuanto a la transmisión del VIH que se observan en las prisiones (actividades sexuales sin protección, consumo de drogas inyectables y tatuajes), los factores relacionados con la infraestructura penitenciaria, la gestión de las prisiones y el sistema judicial penal también aumentan el riesgo de contraer VIH, hepatitis B y C y tuberculosis (20). Debido a las condiciones del encarcelamiento, caracterizadas por el hacinamiento, la violencia sexual, el consumo de drogas y la falta de acceso a productos básicos de prevención contra el VIH, como los preservativos y los lubricantes, el riesgo de transmisión es muy alto (18).

En algunos entornos, la prevalencia femenina de la infección por el VIH es superior a la masculina y mucho mayor que la de la población femenina general. Por ejemplo, en Moldova en el 2005, la prevalencia de la infección por el VIH correspondiente a las mujeres reclusas en prisión era del 9,6%, la correspondiente a los hombres reclusos era del 1,5-5% y la correspondiente a las mujeres de la población general era de < 0,5% (21). En el 2002, la prevalencia de la infección por el VIH registrada en el Canadá fue del 3,71% en las mujeres reclusas en prisión, en comparación con el 1,96% en los hombres reclusos y el < 0,5% en las mujeres de la población general (22).

Debido a que muchos países consideran la prostitución, el consumo de drogas y las relaciones sexuales con personas del mismo sexo como prácticas ilegales, muchas personas de los distintos grupos de la población clave son llevadas a prisión en algún momento de su vida. Ya que el mero hecho de estar detenido es por sí solo un factor de riesgo para contraer la infección por el VIH, aumenta aún más el riesgo en el caso de las personas de los grupos de población clave. Los entornos en los que hay segregación sexual forzada (como en las prisiones) son contextos importantes en los que la actividad sexual entre hombres no está vinculada a la identidad homosexual.

El acceso a las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente, así como a los programas de prevención, tratamiento y atención de la infección por el VIH, suele ser limitado en las prisiones y otros entornos cerrados. Pocos países aplican programas integrales contra el VIH en las prisiones (18). No solo es necesario ofrecer estos servicios en las prisiones y otros entornos cerrados, sino que también es preciso establecer la vinculación con los servicios de atención de la infección por VIH de la comunidad para mantener la continuidad después de que la persona recobra la libertad.

### 1.2.3 Personas que consumen drogas inyectables

En todo el mundo, 158 países han informado sobre el consumo de drogas inyectables, 123 (78%) de los cuales aportan datos sobre la infección por el VIH de las personas que se inyectan drogas (12, 13). No se dispone de datos sobre la prevalencia del grado del consumo de drogas inyectables respecto de casi la mitad de estos países, en particular de África, Oriente Medio y América Latina. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), conjuntamente con la OMS, el ONUSIDA y el Banco Mundial, ha calculado que, en el 2012, cerca de 12,7 millones (rango: 8,9-22,4 millones) de personas de todo el mundo se habían inyectado drogas recientemente y que, de esa cifra, 1,7 millones de personas (13,1%; rango: 0,9-4,8 millones) estaban infectadas por el VIH.

Las tasas de infección por el VIH son altas en las personas que consumen drogas inyectables. A modo de ejemplo, se calcula que, en Pakistán, la prevalencia del VIH en las personas que consumen drogas inyectables llega al 37,8%, según los datos de vigilancia del 2011, lo cual representa casi el cuádruple de la tasa registrada en el 2005 (15). En Indonesia, la prevalencia del VIH correspondiente a este mismo grupo ronda el 36,4% (a diferencia del 0,4% que se registra en la población de 15 a 49 años); en Ucrania, corresponde al menos al 20% (a diferencia del 0,9% de la población general) y en Myanmar, al 18% (a diferencia del 0,6%) (16). Según los datos provenientes de 49 países, las personas que consumen drogas inyectables están expuestas, en promedio, a un riesgo 22 veces superior de contraer la infección por el VIH que la población general. En once de estos países, el riesgo es al menos 50 veces mayor. En Europa oriental, las personas que consumen drogas inyectables y sus compañeros sexuales registran el 40% de las nuevas infecciones por el VIH (3).

### 1.2.4 Trabajadores sexuales

Se calcula que la prevalencia mundial promedio de la infección por el VIH en los trabajadores sexuales asciende al 12% aproximadamente, si bien se observa una amplia variación regional, tanto en cuanto a la prevalencia como a la razón de posibilidades. En 26 países que tienen una prevalencia media y alta dentro de la población general, el 30,7% de los trabajadores sexuales están infectados por el VIH (3, 23). Por ejemplo, se calcula que la prevalencia en los trabajadores sexuales de Nigeria es del 24,5% (3,7% en la población general de 15 a 49 años), del 22,2% en Letonia (0,7% en la población general) y del 50,8% en Ruanda (2,9% en la población general) (3).

Los trabajadores sexuales corren mayor riesgo debido a que tienen múltiples compañeros sexuales y, a veces,

utilizan los preservativos de manera poco sistemática, a menudo debido a la renuencia o coacción de sus clientes. Algunos obstáculos que dificultan el acceso a la atención de la infección por el VIH a los trabajadores sexuales son las cuestiones jurídicas, el estigma, la discriminación y la violencia.

### 1.2.5 Personas transgénero

En un metanálisis publicado en el 2013 se destaca la vulnerabilidad particular al VIH que presentan las mujeres transgénero, si bien estos datos solo provenían de países con epidemia del VIH predominantemente masculina: Estados Unidos de América, seis países de la región de Asia y el Pacífico, cinco de América Latina y tres de Europa. Según este metanálisis, la prevalencia combinada fue del 19,1%; la prevalencia correspondiente a las 7197 mujeres transgénero de 10 países de ingresos bajos y medianos fue del 17,7% y la correspondiente a las 3869 mujeres transgénero de cinco países de ingresos altos fue del 21,6% (24).

### 1.2.6 Superposición de vulnerabilidades y riesgos diferentes

Muchas personas de los grupos de población clave incurren en más de un comportamiento de alto riesgo (por ejemplo, consumen drogas inyectables y son trabajadores sexuales, o un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres también se inyecta drogas). Por lo tanto, la probabilidad de que presenten una prevalencia mayor de la infección por el VIH es más alta que la asociada a quienes solo están expuestos a un tipo de riesgo.

Algunos subgrupos de población clave pueden estar expuestos a un riesgo especialmente alto de contraer la infección por el VIH (25, 26). Por ejemplo, en un estudio transversal realizado en el año 1999 en Viet Nam sobre trabajadoras sexuales, se observó que la prevalencia es significativamente mayor entre las trabajadoras sexuales que trabajan en la calle que entre aquellas que trabajan en establecimientos de entretenimiento (3,8% frente a 1,8%,  $p = 0,02$ ) (27). Los programas actuales de vigilancia o de intervención no brindan una cobertura plena a los subgrupos expuestos a un mayor riesgo de contraer la infección por el VIH.

### 1.2.7 Adolescentes y jóvenes de los grupos de población clave

Los adolescentes y los jóvenes de los grupos de población clave están expuestos a un riesgo significativo de contraer el VIH, superior al de sus pares fuera de estos grupos. Aunque son pocos los estudios, todos indican que los adolescentes y los jóvenes de estos grupos son incluso más vulnerables que las cohortes de mayor edad a las ITS, el VIH y otros problemas de salud sexual y reproductiva (28). Además, su vulnerabilidad y riesgo son mayores debido al rápido desarrollo físico, emocional y mental, a factores socioeconómicos y psicosociales complejos, al acceso limitado a los servicios y a su uso restringido (29). En particular, en el caso de los menores de 18 años, los obstáculos normativos y jurídicos relacionados con la edad de consentimiento a menudo impiden el acceso a diversos servicios de salud, como las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente, la reducción del daño y otros servicios prestados específicamente a los grupos de población clave (30). Estos obstáculos también limitan la capacidad de los adolescentes para ejercer su derecho a tomar decisiones fundamentadas e independientes.

Los adolescentes de los grupos de población clave pueden ser víctimas de estigma, discriminación y violencia en un grado aun mayor que los adultos de estos grupos. Por temor a la discriminación y las posibles consecuencias legales, muchos adolescentes se rehúsan a concurrir a los servicios de diagnóstico y tratamiento, por lo que quedan ocultos a muchas intervenciones de salud esenciales, lo que perpetúa aún más su exclusión (31).

Las **necesidades específicas** de los jóvenes de los grupos de población clave no se ven reflejadas en los programas concebidos para los jóvenes en general ni en aquellos destinados a los adultos de estos grupos.

Aún son limitados los datos epidemiológicos y conductuales fidedignos y representativos sobre los adolescentes y los jóvenes de los grupos de población clave (32). La población joven sigue siendo en gran parte invisible para la vigilancia ordinaria de la infección por el VIH y la investigación sobre su prevalencia y el riesgo. Esta falta de datos a menudo se traduce en el descuido de sus necesidades específicas tanto en las políticas como en los programas concebidos para los jóvenes en general, así como en los servicios para los adultos de los grupos clave (32).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> La OMS, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y las redes comunitarias clave han elaborado cuatro resúmenes técnicos sobre los jóvenes de los grupos de población clave. Estos documentos normativos se basan en los exámenes de los datos epidemiológicos, la bibliografía sobre la prestación de los servicios, un análisis de las políticas e investigaciones cualitativas sobre los valores y las preferencias de los jóvenes de grupos de población clave. Estas directrices incluyen mensajes esenciales provenientes de este trabajo. Los resúmenes técnicos están disponibles en el apéndice 6 que se encuentra publicado en la página web de la OMS [en inglés].

### 1.3 Servicios específicos para los grupos de población clave: una inversión racional

El reciente cambio hacia un uso más estratégico de los recursos relativos al VIH (33) destaca el valor de abordar la infección por el VIH en los grupos de población clave. Tanto en las epidemias concentradas como en las generalizadas, es probable que aumentar la inversión nacional en los grupos de población clave mejore la costoeficacia de la respuesta al VIH.

Hasta ahora, las inversiones en materia de VIH de la mayoría de los países se han centrado en la población general. Sin embargo, en las epidemias concentradas, la gran mayoría de las infecciones afectan, casi por definición, a las personas de los grupos de población clave y, a veces, a algunos grupos específicamente vulnerables. Aun en situaciones de epidemias generalizadas, los grupos de población clave a menudo representan una proporción grande de la prevalencia de la infección por el VIH, y la incidencia que se observa en algunos a menudo ha seguido subiendo pese a que las tasas en la población general se han estabilizado o incluso han descendido.

En todo el mundo, **entre el 40% y el 50% de todas las nuevas infecciones** por el VIH en adultos **corresponde a personas de los grupos de población clave** y su pareja inmediata

Es probable que, en todo el mundo, entre el 40% y el 50% de todas las nuevas infecciones por el VIH en adultos corresponda a personas de los grupos de población clave y su pareja inmediata.<sup>2</sup> En los países de Asia, Europa oriental y Asia central, las personas de los grupos de población clave representan más de la mitad, de 53% a 62%, de las nuevas infecciones. Incluso en los países del África meridional, que tienen epidemias generalizadas y han llevado a cabo análisis de las vías de transmisión, es sustancial, aunque presente variaciones, la

proporción de nuevas infecciones que corresponde a los grupos de población clave: por ejemplo, alrededor del 10% en Uganda, 30% en Burkina Faso, 34% en Kenia, 37% en Nigeria, 43% en Ghana y 45% en Benín.

#### 1.3.1 Aspectos fundamentales para la dinámica de la epidemia

Otro motivo por el cual la inversión en grupos de población clave es costoeficaz es el papel central que desempeñan las personas de estos grupos en la dinámica de la epidemia. Puesto que las personas de estos grupos también pueden transmitir el VIH a otros subgrupos —por ejemplo, los trabajadores sexuales a sus clientes y las personas que consumen drogas inyectables a sus parejas sexuales—, la infección de las personas perteneciente a grupos de población clave puede tener un efecto multiplicador.

A modo de ejemplo, según un análisis sobre seis países de África Occidental, la proporción de nuevas infecciones de las parejas sexuales de las personas consideradas de “alto riesgo” fue del 20% en Burkina Faso y Nigeria a alrededor del 30% en Benín, Côte d’Ivoire y Ghana, y posiblemente hasta del 49% en Senegal (34). Entretanto, la proporción del gasto destinado a la prevención de la infección por el VIH que se asigna específicamente a los programas para trabajadores sexuales y sus clientes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas que consumen drogas inyectables fue del 1,7% en Burkina Faso, 0,4% en Côte d’Ivoire y 0,24% en Ghana, mientras que el porcentaje de nuevas infecciones previstas para estos grupos de población fue del 30%, 28% y 43%, respectivamente (35).

#### 1.3.2 La ampliación de la cobertura puede lograr un cambio

Las repercusiones asociadas a la mejor cobertura nacional de los servicios destinados a los grupos de población clave podrían comprender desde evitar un considerable número de nuevas infecciones en ese país hasta estabilizar o incluso revertir la incidencia general cada vez mayor.

Algunas proyecciones indican que las repercusiones asociadas a la mejor cobertura de los servicios destinados a los grupos de población clave podrían comprender desde evitar un considerable número de nuevas infecciones en los países que presentan epidemia generalizada a estabilizar o incluso revertir la incidencia cada vez mayor que se registra en los países con epidemia concentrada.

Por ejemplo, en Asia, la transmisión del VIH tiene lugar

<sup>2</sup> Cálculos estimativos preliminares efectuados a partir de los datos de algunos países, para los cuales se emplearon análisis publicados de las vías de transmisión, datos sobre las nuevas infecciones modelados a partir de estadísticas sobre la prevalencia de la infección por el VIH y el tamaño de los subgrupos clave, o las vías de transmisión consignadas en los diagnósticos de VIH notificados (ONUSIDA, 2014).

principalmente a través de las relaciones sexuales comerciales sin protección, el consumo de drogas inyectables y las relaciones sexuales sin protección entre hombres. El aumento del uso de preservativos por trabajadores sexuales y sus clientes, derivado de la promoción eficaz, ha logrado revertir la tendencia ascendente de la prevalencia a mediados de los años noventa. No obstante, en los últimos años, son escasos los cambios observados en las tasas de incidencia anual. Si no aumentan las inversiones orientadas a este objetivo, es probable que la prevalencia comience a subir nuevamente (36). Según una estimación del 2008, un programa ampliado de intervenciones contra el VIH centradas en estos comportamientos riesgosos evitaría cinco millones de nuevas infecciones entre el 2007 y el 2020, un número casi equivalente al número de personas que ya estaban infectadas en Asia en el 2007. Además, el número de defunciones relacionadas con el VIH disminuiría un 40% y, en el 2020, el número de personas infectadas por el VIH sería 3,1 millones menor (37).

En el 2011, el Banco Mundial pronosticó que, si el Perú no aumentaba la cobertura de los programas destinados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, el número anual de nuevas infecciones de la población general aumentaría de cerca de 14.000 en el 2008 a cerca de 20.000 en el 2015. Por el contrario, ampliar la cobertura de los programas específicos para este grupo de población al menos estabilizaría el número anual de nuevas infecciones en la población general o hasta comenzaría a reducirlo.

De manera análoga, la cobertura completa del programa tailandés destinado a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres reduciría el número anual de nuevas infecciones de la población general de 22.500 en el 2008 a 20.000 en el 2015; de lo contrario, este número llegaría a 27.200 (38).

## 1.4 Alcance de estas directrices sobre los grupos de población clave

En estas directrices se describe una respuesta de salud pública frente al VIH centrada en los cinco grupos de población clave. Además, se presentan y describen nuevas recomendaciones y diversas recomendaciones y orientaciones provenientes de las directrices actuales de la OMS, entre las que se cuentan las *Directrices unificadas sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH* publicadas en el 2013 (2) y las directrices sobre cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral y la profilaxis previa a la exposición para el VIH publicadas en el 2015. Asimismo, se resumen los componentes de un conjunto integral de intervenciones orientadas a los grupos de población clave y se describen los problemas, los desafíos y las oportunidades relacionados con su ejecución. También se proporciona orientación para priorizar y planificar los servicios.

En los capítulos 5 y 6 se describen varios estudios de casos que detallan consideraciones respecto de cada grupo de población clave, en las que se describen diversas intervenciones y los métodos de prestación de servicios de una variedad de experiencias programáticas de distintos países y regiones.

## 1.5 Uso de estas directrices


Al igual en las directrices unificadas sobre el uso de los TAR, en estas directrices se considera la necesidad de respaldar toda la secuencia de servicios relativos a la prevención, el diagnóstico, la atención y el tratamiento de la infección por el VIH (figura 1.1).

### Símbolos utilizados en todo el documento:

 Las **recomendaciones integrales de la OMS** están en consonancia con las recomendaciones existentes de la OMS y aparecen sombreadas en celeste (véase adelante), y se detalla la fuente como referencia,


**NUEVO** nuevas recomendaciones de la OMS elaboradas específicamente con estas directrices,  
**EN ELABORACIÓN** recomendaciones en elaboración, ámbitos clínicos clave sobre los que la OMS está elaborando directrices

**Figura 1.1** Secuencia de la prevención, el diagnóstico, la atención y el tratamiento de la infección por el VIH



En estas directrices, el título “recomendaciones sobre buenas prácticas” indica aquellas recomendaciones que podría ser útiles pero no requieren clasificación y son aquellas cuyos efectos deseados claramente pesan más que los efectos indeseables. A menudo entrañan principios de derechos humanos reflejados en varios acuerdos internacionales y cuestiones de equidad y ética.

- Todos los grupos de población clave
- Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
- Personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados
- Personas que consumen drogas inyectables
- Trabajadores sexuales
- Personas transgénero
- Adolescentes de los grupos de población clave



### Codificación de colores utilizada en este documento:

Los documentos de antecedentes redactados para respaldar estas directrices comprenden estudios sobre los valores y las preferencias de los grupos de población clave y los prestadores de servicios. Los cuadros que detallan las revisiones sistemáticas y el análisis GRADE (método de clasificación de la valoración, la elaboración y la evaluación) de las nuevas recomendaciones aparecen en versión completa en los apéndices 1 y 2 publicados en la página web de la OMS [en inglés].

## 1.6 Meta y objetivos

El propósito de estas directrices es proporcionar orientación unificada que fundamente la formulación y la aplicación de las políticas, los programas y los servicios relativos a la infección por el VIH orientados a los grupos de población clave.

Los siguientes son los objetivos específicos de estas directrices:

- **unificar las orientaciones** sobre las intervenciones del sector de la salud relativas a la infección por el VIH destinadas a cada grupo de población clave;
- **describir los conjuntos más habituales de servicios de atención a la infección por el VIH y servicios relacionados** que son beneficiosos y aceptables para todos los grupos de población clave y los servicios adicionales necesarios para algunos grupos de población clave específicos;
- **actualizar las orientaciones** sobre la planificación, la prestación de servicios, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones de prevención, diagnóstico, atención y tratamiento de la infección por el VIH destinadas a cada grupo de población clave;
- proporcionar **orientaciones** sobre intervenciones relativas a la infección por el VIH **específicas al género y la edad** de las personas de los grupos de población clave, incluidos los adolescentes.

## 1.7 Público destinatario

Estas directrices están destinadas principalmente a los directores nacionales de programas contra el VIH y otros encargados de adoptar decisiones dentro de los ministerios de salud, así como a los responsables de las políticas, los programas y los servicios de salud penitenciarios. Además, serán pertinentes para los directores nacionales y subnacionales responsables de los servicios de atención de la tuberculosis, las hepatitis virales, la salud sexual y reproductiva, la reducción de daños y el manejo de adicciones, y la salud mental, así como para la aplicación de programas y las organizaciones de la sociedad civil dirigidas por la comunidad, y los organismos de desarrollo y financiamiento.

## 1.8 Principios de las directrices

La formulación de estas directrices se enmarca en los principios de derechos humanos reflejados en varios acuerdos internacionales (39, 40).

- **Derechos humanos:** La protección de los derechos humanos de todos los integrantes de cada grupo de población clave es un aspecto esencial de la formulación de estas directrices. Los legisladores y otras autoridades gubernamentales deben aprobar y velar por el cumplimiento de las leyes protectoras y antidiscriminatorias, que se deriven de las normas internacionales de derechos humanos, a fin de eliminar el estigma, la discriminación y la violencia de que son objeto las personas de los grupos de población clave y reducir su vulnerabilidad al VIH (40).
- **El acceso a la atención de salud de buena calidad** es un derecho humano que comprende el derecho de los integrantes de los grupos de población clave a recibir una atención de salud de buena calidad sin ser objeto de discriminación. Los prestadores y las instituciones de salud deben atender a las personas pertenecientes a los grupos de población clave apoyándose en los principios de la ética médica y el

### Principios rectores

- derechos humanos,
- acceso a una atención de salud de buena calidad,
- acceso a la justicia,
- aceptabilidad de los servicios,
- conocimientos sobre la salud,
- prestación de servicios integrados.

derecho a la salud (18). Los servicios de salud deben ser accesibles a los colectivos en cuestión. Esta orientación solo podrá ser eficaz cuando los servicios sean aceptables y de buena calidad, y sean aplicados ampliamente. La calidad deficiente y el acceso limitado a los servicios restringen el beneficio individual y los efectos de las recomendaciones sobre la salud pública.

- El **acceso a la justicia** es una de las principales prioridades para las personas de los grupos de población clave, dado que tienen una tasa elevada de contacto con los agentes del orden y, en muchos países, se sigue considerando que su comportamiento es ilegal. El acceso a la justicia comprende el derecho a no ser sometido a prisión o detención arbitrariamente, el derecho a un juicio justo, el derecho a no ser sometido a torturas ni tratamiento cruel, inhumano ni degradante, y el derecho, incluso en las prisiones y otros entornos cerrados, al grado máximo de salud que se pueda lograr (41). La protección de los derechos humanos, como el derecho al empleo, la vivienda y la atención de salud, de las personas que integran los grupos de población clave exige la colaboración entre los organismos de salud y aquellos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, entre los que se cuentan aquellos que administran las prisiones y otros entornos cerrados. La detención en entornos cerrados no anula el derecho a mantener la dignidad y la salud (18).
- **La aceptabilidad de los servicios es un aspecto clave de la eficacia.** Las intervenciones para reducir la carga del VIH en las personas de los grupos de población clave deben ser respetuosas, aceptables, apropiadas y asequibles para los destinatarios si el objetivo es lograr que participen y retenerlas en la atención. Los servicios destinados a atender a los miembros de los grupos de población clave a menudo emplean modelos apropiados de prestación de servicios, pero carecen de las competencias necesarias para manejar el VIH. Por el contrario, algunas personas de estos grupos a veces consideran inaceptables los servicios especializados en la atención de infección por el VIH. Es necesario desarrollar capacidad y competencia para proveer servicios en ambos frentes. Algunas maneras eficaces de avanzar en pro de este objetivo son realizar consultas con organizaciones representativas de los grupos de población clave e incluir a algunas de esas personas como prestadores de servicios (42). La retroalimentación regular y constante entre los beneficiarios y los prestadores ayudará a consolidar y mejorar la aceptabilidad de los servicios.
- **Conocimientos sobre la salud:** Las personas que pertenecen a los grupos de población clave a menudo carecen de conocimientos básicos suficientes sobre la salud y los tratamientos. Esto puede obstaculizar la toma de decisiones sobre los comportamientos riesgosos respecto del VIH y el comportamiento relacionado con la búsqueda de atención de salud. Los servicios de salud deben brindar atención regular y sistemática, y proporcionar información precisa sobre la salud y los tratamientos a las personas de los grupos de población clave. Al mismo tiempo, los servicios de salud deben fortalecer la capacidad de los prestadores para prevenir y tratar la infección por el VIH en las personas de estos grupos, incluidos los adolescentes (42).
- **Prestación de servicios integrados:** Las personas de los grupos de población clave generalmente tienen múltiples comorbilidades y viven en situaciones sociales de carencia. Por ejemplo, es frecuente que tengan VIH, hepatitis virales, tuberculosis, otras enfermedades infecciosas y trastornos de salud mental. Los servicios integrados ofrecen la oportunidad de brindar prevención, atención y tratamiento centrados en el paciente para abordar la multitud de problemas que afectan a estos grupos. Además, mejoran la comunicación y la atención. Por lo tanto, si es factible, es conveniente ofrecer servicios integrados a los grupos de población clave. En caso contrario, es recomendable entablar y mantener una vinculación estrecha entre los distintos servicios de salud que atienden a las personas de estos colectivos (43).



# METODOLOGÍA Y PROCESO DE FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES

## 2

2.1	Perspectiva general .....	14
2.2	Grupos participantes en la formulación de las directrices .....	14
2.3	Definición del alcance de las directrices .....	15
2.4	Examen de los datos .....	16
2.4.1	Información sobre las prisiones y otros entornos cerrados .....	16
2.5	Formulación de las recomendaciones sobre la profilaxis anterior a la exposición .....	16
2.6	Evaluación de la evidencia .....	16
2.6.1	Interpretación de la calidad de evidencia .....	19
2.6.2	Determinación del rigor de las recomendaciones .....	17
2.7	Examen sobre la prestación de servicios, los métodos de ejecución y los estudios de casos .....	18
2.8	Redacción de las directrices .....	18
2.9	Plan de difusión .....	18
2.10	Actualización .....	18

## 2 METODOLOGÍA Y PROCESO DE FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES

### 2.1 Perspectiva general

El Departamento de VIH/Sida de la OMS encabezó la formulación de las presentes directrices unificadas para los grupos de población clave siguiendo los procedimientos de la OMS y las normas relativas a los informes consignadas en el manual de la OMS para la elaboración de directrices (*WHO Handbook for Guideline Development*), publicado en el 2012 (1).

Estas directrices combinan las recomendaciones de la OMS existentes, algunas nuevas recomendaciones y las orientaciones publicadas por la OMS junto con asociados de las Naciones Unidas. Asimismo, incluyen las recomendaciones más importantes de las *Directrices unificadas sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH* (2) publicadas por la OMS en el 2013, respecto de las cuales se señalan consideraciones específicas para cada uno de los grupos de población clave.

### 2.2 Grupos participantes en la formulación de las directrices

El Departamento de VIH/sida de la OMS creó cuatro grupos de trabajo a los que asignó funciones específicas en el proceso de formulación de las directrices. Los miembros de los grupos fueron seleccionados de manera tal que reunieran una variedad de conocimientos especializados y experiencia, así como representación geográfica y pericia en materia de género y de los grupos de población clave aquí considerados. A continuación se describen estos cuatro grupos y sus funciones:

El **grupo consultivo de la OMS sobre las directrices en materia de VIH y grupos de población clave**, presidido por el Departamento de VIH/Sida de la OMS, fue el encargado de impulsar el proceso de formulación de las directrices. Este grupo estuvo conformado por participantes del Departamento de la OMS de Salud de la Madre, el Recién Nacido, el Niño y el Adolescente, el Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva, el Programa Mundial contra la Hepatitis y el Programa Mundial contra la Tuberculosis.

El **grupo consultivo externo**, compuesto por un grupo de 25 expertos, investigadores, directores de programa, ejecutores y personas de redes y organizaciones de grupos de población clave de diversas regiones geográficas y con una representación equilibrada de hombres y mujeres, aportaron a la OMS orientaciones sobre el alcance, el contenido y aspectos nuevos que abordar.

El **grupo de formulación de directrices** compuesto por 26 miembros estuvo conformado por la mayoría del grupo consultivo externo y algunos otros expertos. Este grupo fue responsable de la formulación de las nuevas recomendaciones de la OMS, las orientaciones sobre prácticas adecuadas y el establecimiento de consenso sobre el contenido final.

El **grupo de arbitraje externo** fue seleccionado en consulta con las oficinas regionales de la OMS para garantizar una representación equilibrada, tanto geográfica como de género. En total, más de 70 expertos examinaron las directrices. Estos revisores representaron a la comunidad académica, los formuladores de políticas y la investigación, los programas de ejecución y las redes y las organizaciones de los propios grupos de población clave. En general, los revisores formularon sugerencias para mejorar la claridad del documento e incorporaron textos breves e hicieron algunas correcciones menores en la redacción.

## Participación de grupos y redes de población clave

Ha sido crucial para la formulación de estas directrices la asociación con los grupos y redes de población clave y su participación en todas las etapas del proceso, tanto como integrantes de los grupos de formulación de las directrices como de arbitraje, y como asociados en la definición de los valores y las preferencias en cuanto a la metodología de investigación y evaluación, como se describe adelante.

## Conflictos de intereses

Todos los participantes del grupo consultivo externo, del grupo de formulación de directrices y los miembros del grupo de arbitraje externo presentaron una declaración de intereses ante la Secretaría de la OMS. La Secretaría de la OMS y el grupo de formulación de directrices examinaron todas las declaraciones y no encontraron conflictos de intereses suficientes como para excluir a ningún participante de la formulación de las directrices. La recopilación de la totalidad de las declaraciones presentadas está a disposición de quien la solicite.

## 2.3 Definición del alcance de las directrices

Para formular estas directrices, el grupo consultivo de la OMS localizó todas las orientaciones de la OMS existentes sobre el VIH centradas específicamente en los cinco grupos de población clave, y luego examinó estos y otros materiales para detectar carencias, redundancias e incongruencias y determinar su pertinencia. El resultado de este ejercicio fue presentado ante el grupo consultivo externo en una reunión celebrada para determinar el alcance de las directrices en octubre del 2013. El grupo examinó el producto de este ejercicio y formuló recomendaciones sobre el alcance de las directrices (grupos de población y espectro de intervenciones que se emprenderían) y observó dos ámbitos que necesitan nuevas orientaciones: 1) **la profilaxis previa a la exposición (PrEP)** y 2) **la prevención y el tratamiento de la sobredosis de opioides**. Después de la publicación de estas directrices en el 2014, la OMS publicó nuevas recomendaciones sobre la TAR y la PrEP en el 2015. En esta edición hacemos referencia a estas recomendaciones según sea pertinente.

## Otras directrices en proceso de formulación

El Departamento de VIH/Sida y otros departamentos de la OMS actualmente están formulando o actualizando varias directrices pertinentes para los grupos de población clave, como las que se detallan a continuación:

- **tratamiento de la hepatitis C** (redactadas por el equipo del Programa Mundial contra la Hepatitis durante la formulación de estas directrices e incluidas en el presente documento) y **tratamiento y detección de las hepatitis B y C** (terminadas en el 2015);
- **orientaciones sobre anticoncepción y VIH** (redactadas por el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e incluidas en estas directrices);
- **orientaciones sobre la profilaxis posterior a la exposición** (redactadas por el Departamento de VIH/Sida, e incluidas en estas directrices, [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145719/1/9789241508193\\_eng.pdf?ua=1&ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145719/1/9789241508193_eng.pdf?ua=1&ua=1));
- **orientaciones sobre las ITS** (a ser terminadas en el 2016 por el Departamento de Salud Reproductiva e incluidas en estas directrices, [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145719/1/9789241508193\\_eng.pdf?ua=1&ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145719/1/9789241508193_eng.pdf?ua=1&ua=1));

## Público destinatario

El grupo consultivo externo definió el público destinatario de estas directrices. Los servicios de salud de los entornos de bajos recursos son los que más se beneficiarán de las orientaciones presentadas en este documento, dado que afrontan los retos más importantes a la hora de prestar servicios adaptados a los grupos de población clave. Sin embargo, estas directrices son pertinentes para todos los entornos económicos y epidémicos de la infección por el VIH y, por consiguiente, constituyen una orientación mundial. Las regiones y los países pueden adaptar estas recomendaciones generales a las necesidades locales, los diferentes contextos de la epidemia de infección por el VIH y los servicios existentes para facilitar su ejecución.

## 2.4 Examen de la evidencia

Estas directrices contienen tanto recomendaciones existentes que son pertinentes como nuevas recomendaciones. La formulación de las nuevas recomendaciones empezó con una revisión sistemática de la evidencia. El grupo de formulación de directrices recomendó encargar nuevas revisiones bibliográficas y la evaluación de las revisiones y las encuestas existentes sobre los valores y las preferencias, junto con un examen de los costos y la factibilidad de la ejecución. Además, la OMS encargó estudios nuevos y examinó los estudios existentes sobre los valores y las preferencias relacionadas con las recomendaciones existentes para lograr que la orientación reflejase apropiadamente las inquietudes de los miembros de los grupos de población clave.

### 2.4.1 Información sobre las prisiones y otros entornos cerrados

En el año 2007, se realizó una revisión bibliográfica extensa con el fin de obtener información que fuera de utilidad para la redacción de un documento técnico de la OMS sobre la eficacia de las intervenciones para abordar el VIH en las prisiones (*Effectiveness of interventions to address HIV in prisons*) (3, 4). En el 2014, se actualizó este documento con miras a la formulación de estas directrices, para lo cual se efectuó una revisión bibliográfica abreviada centrada en los materiales preparados entre el 2007 y el 2014. Los resultados respaldaron la revisión del 2007: no se encontró evidencia nueva que cambiara las recomendaciones formuladas en las directrices del 2007. El grupo de formulación de directrices y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) examinaron, confirmaron y aceptaron esta conclusión. La revisión del 2014 señaló la necesidad de seguir investigando sobre este ámbito; en el apéndice 4 [en inglés] publicado en la página web de la OMS se detallan otros ámbitos de investigación posible.

## 2.5 Formulación de las recomendaciones sobre la profilaxis previa a la exposición

A fin de sustentar las recomendaciones relativas a la profilaxis previa a la exposición (PrEP), las preguntas sobre la evidencia se enmarcaron en el formato PICO (por su sigla en inglés): población, intervención, comparador y resultado. Los investigadores externos usaron las preguntas en el formato PICO para elaborar protocolos de búsqueda y realizar revisiones sistemáticas de la evidencia, en los apéndices 1 y 2 [en inglés] que se encuentran en la página web de la OMS se pueden encontrar más detalles.

La OMS convocó a la reunión para formular las directrices en marzo del 2014 con el fin de actualizar las recomendaciones con respecto a la administración de la PrEP a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (5) y analizar los datos con miras a formular una nueva recomendación sobre su administración a las personas que consumen drogas inyectables, así como para examinar todos los apartados de las directrices unificadas. Participaron en esta reunión representantes de una amplia gama de interesados directos ya sea como parte del grupo de formulación de directrices o como expertos observadores. Los participantes en esta reunión evaluaron la evidencia con respecto a las preguntas en el formato PICO relativas a la PrEP, junto con los riesgos y beneficios, los valores y las preferencias, y la factibilidad y los beneficios en función de los costos asociados con cada intervención posible e hicieron recomendaciones al respecto (véase la sección 4.1.5.1). En el 2015 se publicaron las nuevas directrices de la OMS sobre la PrEP, que han sido incluidas aquí en los casos en que eran pertinentes (véase [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565\\_eng.pdf?ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565_eng.pdf?ua=1)).

## 2.6 Evaluación de la evidencia

Conforme al proceso de formulación de directrices de la OMS, el grupo encargado de formularlas redacta las recomendaciones basándose en la **calidad** de la evidencia disponible. Hay otros factores —los valores y las preferencias, los costos y la factibilidad— que también se tienen en cuenta cuando se determina la **fuerza** de las recomendaciones.

### 2.6.1 Interpretación de la calidad de la evidencia

Cuanto mejor es la calidad de la evidencia, mayor es la posibilidad de formular una recomendación firme. El método GRADE para formular recomendaciones, que ha sido adoptado por la OMS, considera que la calidad de la evidencia depende del grado de confianza en que las estimaciones sobre el efecto (deseable o no) derivadas a partir de la evidencia son representativas de los efectos reales de interés (6, 7, 8). El método GRADE distingue cuatro niveles de calidad de la evidencia (9) (cuadro 2.1).

### Cuadro 2.1 Significación de los cuatro niveles de evidencia según el método GRADE

Calidad de la evidencia	Justificación
Alta	Las nuevas investigaciones tienen muy pocas probabilidades de cambiar la confianza en las estimaciones sobre el efecto.
Moderada	Las nuevas investigaciones tienen algunas probabilidades de influir significativamente sobre la confianza en el efecto.
Baja	Las nuevas investigaciones tienen grandes probabilidades de influir significativamente sobre las estimaciones del efecto y tienen probabilidades de cambiarlas.
Muy baja	Todas las estimaciones del efecto son muy inciertas.

#### 2.6.2 Determinación de la fuerza de las recomendaciones

La fuerza de las recomendaciones refleja el grado de confianza del grupo encargado de formular las directrices en que los efectos deseados de la recomendación pesan más que sus posibles efectos indeseables (cuadro 2.2). Los efectos deseados (**posibles beneficios**) pueden incluir resultados beneficiosos en materia de salud (por ejemplo, disminución de la incidencia de la infección por el VIH y de la morbilidad y la mortalidad); reducción de la carga para las personas o los servicios de salud; y posible reducción de los costos para las personas, las comunidades, el programa o el sistema de salud. Los efectos indeseables (posibles daños) son aquellos que afectan a las personas, a las familias, a las comunidades o a los servicios de salud. Otras cargas consideradas son el uso de los recursos y las repercusiones sobre los costos que se derivan de la ejecución de las recomendaciones y que afectarían a los programas, los prestadores o los pacientes; los resultados clínicos adversos (por ejemplo, la farmacoresistencia y los efectos secundarios de los medicamentos); y las ramificaciones jurídicas en los lugares donde algunas prácticas están tipificadas como delito.

En función de su fuerza, las recomendaciones pueden ser firmes o condicionales.

Las recomendaciones son **firmes** (a favor o en contra) cuando hay una gran confianza en que los efectos deseados de su cumplimiento claramente pesan más que los efectos indeseables.

Las recomendaciones son **condicionales** (a favor o en contra) cuando la calidad de la evidencia en la cual se fundamentan es baja o la evidencia es aplicable solo a algunos grupos o entornos específicos; o bien el grupo que las formula llega a la conclusión de que los efectos deseados de su cumplimiento probablemente pesen más que los efectos indeseables o estén casi equilibrados, pero no hay seguridad acerca de los beneficios y el daño en todas las situaciones.

Si se aplican *recomendaciones condicionales*, es preciso vigilarlas cuidadosamente y evaluarlas con rigor. Es necesario emprender nuevas investigaciones que aborden las incertidumbres, y es posible que estas investigaciones aporten nueva evidencia que cambie la relación entre los beneficios y el daño.

Los **valores** y las **preferencias** de los usuarios (los grupos de población clave), la factibilidad y el costo, así como la consideración de los posibles beneficios y daños, ayudan a determinar la fuerza de las recomendaciones.

Se encargaron encuestas, estudios cualitativos y revisiones bibliográficas, y se evaluaron otros materiales para investigar sobre los valores y las preferencias de los grupos de población clave y los prestadores de servicios, así como los beneficios, el daño, el costo y la factibilidad respecto de las orientaciones sobre nuevas áreas, las recomendaciones existentes y los problemas relativos a la prestación de servicios. Se prestó especial atención a los valores y las preferencias de los adolescentes de los grupos de población clave.<sup>1</sup>

La evidencia sobre los valores y las preferencias provenían de los resultados de los talleres celebrados en distintos países con miembros de los grupos de población clave; una encuesta virtual multirregional y anónima realizada a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; entrevistas exhaustivas a informantes clave como

<sup>1</sup> La OMS, el ONUSIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el UNODC han elaborado cuatro resúmenes técnicos sobre los jóvenes de los grupos de población clave. Estas sinopsis de política se basan en exámenes de los datos epidemiológicos, la bibliografía sobre la prestación de los servicios, análisis de las políticas e investigaciones cualitativas sobre los valores y las preferencias de la población joven de los grupos de población clave. Las presentes directrices incluyen mensajes esenciales de todo este trabajo. Véase el apéndice 6 [en inglés] en la página web de la OMS ([www.who.int](http://www.who.int)).

## Cuadro 2.2 Aspectos considerados al valorar el rigor de las recomendaciones

Calidad de la evidencia	Justificación
<b>Beneficios y riesgos</b>	Cuando se formula una nueva recomendación, es preciso sopesar los efectos deseados (beneficios) y los efectos indeseables (riesgos) comparándolos con todas las recomendaciones anteriores u otra alternativa. Cuanto más grande es la brecha o el gradiente a favor de los beneficios sobre los riesgos, más probable es que la recomendación sea firme.
<b>Valores y preferencias (aceptabilidad)</b>	Si hay probabilidades de que se acepte ampliamente la recomendación o se la considere muy valiosa, es probable que la recomendación sea firme. Si hay gran variabilidad o motivos muy sólidos por los que es poco probable que el procedimiento recomendado sea aceptado, es más probable que la recomendación tenga carácter condicional.
<b>Costos e implicaciones financieras</b>	Los costos más bajos (monetarios y de infraestructura, equipamiento o recursos humanos) y la mejor relación de costoeficacia tienen mayores probabilidades de respaldar recomendaciones firmes.
<b>Factibilidad</b>	Si una intervención es realizable en un entorno donde se prevén grandes repercusiones, es apropiado hacer una recomendación firme.

los prestadores de servicios y las personas que consumen drogas inyectables; entrevistas exhaustivas a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; y una revisión bibliográfica sobre los valores y las preferencias de los grupos de población clave en cuanto a la profilaxis previa a la exposición. En el apéndice 3 [en inglés] que se encuentra en la página web de la OMS se pueden consultar los informes completos y un cuadro en el que se describen las diversas actividades desarrolladas.

## 2.7 Examen sobre la prestación de servicios, los métodos de ejecución y los estudios de casos

Se realizó una convocatoria a gran escala de ejemplos de buenas prácticas con el fin de determinar los métodos de prestación que resultan eficaces y aceptables para los grupos de población clave. Estos estudios de casos, presentados en los capítulos 5 y 6, arrojan luz sobre la aplicación eficaz de los servicios destinados a estos grupos. En el apéndice 5 [en inglés] en la página web de la OMS se presenta más información sobre estos estudios de casos.

## 2.8 Redacción de las directrices

Después de la consulta emprendida por el grupo de formulación de directrices, se revisó la versión preliminar completa de las directrices y se la hizo circular electrónicamente entre los miembros del grupo de formulación de directrices y el grupo de arbitraje externo con el fin de que hicieran observaciones y dieran su opinión al respecto. Se tuvieron en cuenta todas las respuestas y, si correspondía, se abordaron en la versión final.

## 2.9 Plan de difusión

Se están difundiendo las directrices como una publicación impresa y en formato electrónico en la página web de la OMS, donde también se incluyen todos los apéndices.

## 2.10 Actualización

El Departamento de VIH/Sida de la OMS se ha comprometido a publicar actualizaciones regulares de las directrices unificadas sobre los grupos de población clave cuando se disponga de evidencia nueva o revisada, incluidas las nuevas orientaciones pertinentes que elaboren otros departamentos de la OMS.

# CONJUNTO INTEGRAL DE INTERVENCIONES

# 3

3.1 Servicios para todos los grupos de población clave .....	20
3.2 Consideraciones específicas .....	21
3.2.1 Prisiones y otros entornos cerrados .....	21
3.2.2 Personas que consumen drogas inyectables .....	21
3.2.3 Adolescentes de los grupos de población clave .....	22

## 3 CONJUNTO INTEGRAL DE INTERVENCIONES

### 3.1 Servicios para todos los grupos de población clave

Para responder eficazmente al VIH en los grupos de población clave, es necesario combinar eficazmente varias intervenciones. Se recomienda a los países aplicar el siguiente conjunto integral de intervenciones, que los ayudará a programar la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH en las personas de los grupos de población clave. Si bien los capítulos 4 y 5 describen las intervenciones con mucho más detalle, en este capítulo resumimos los conceptos generales.

#### Este conjunto integral de intervenciones consta de dos partes:

##### a) Intervenciones esenciales del sector de la salud (véase una descripción detallada en el capítulo 4)

1. programa integral de entrega de preservativos y lubricantes;
2. intervenciones para reducir los daños derivados del consumo de sustancias psicoactivas, en particular, programas de distribución de agujas y jeringas<sup>1</sup> y tratamiento de sustitución de opioides;
3. intervenciones sobre el comportamiento;
4. pruebas de detección del VIH y asesoramiento correspondiente;
5. tratamiento y atención de la infección por el VIH;
6. prevención y tratamiento de las coinfecciones y otras comorbilidades, como las hepatitis virales, la tuberculosis y los problemas de salud mental;
7. intervenciones relativas a la salud sexual y reproductiva.<sup>2</sup>

##### b) Estrategias esenciales para lograr un entorno favorable (véase una descripción detallada en el capítulo 5)

1. legislación propicia, compromiso político y financiero (como la despenalización de los comportamientos de los grupos de población clave);
2. abordaje del estigma y la discriminación;
3. empoderamiento de la comunidad;
4. abordaje de la violencia contra las personas de los grupos de población clave.

<sup>1</sup> Los programas de distribución de agujas y jeringas son importantes para las personas que consumen drogas inyectables y también para las personas transgénero que necesitan material estéril para inyectarse hormonas sin riesgos como tratamiento de afirmación del género. También son importantes los insumos con los que se realizan tatuajes, perforaciones y punciones (piercing) y otras formas de penetración de la piel, que son particularmente frecuentes en las prisiones y otros entornos cerrados.

<sup>2</sup> Por ejemplo, la anticoncepción, el diagnóstico y el tratamiento de las ITS, el tamizaje del cáncer cervicouterino, etc. (véase el capítulo 4).

**Las intervenciones y las estrategias que componen este conjunto tienen una importante interdependencia.**

Las intervenciones y las estrategias que componen este conjunto tienen una importante interdependencia. Las intervenciones del sector de la salud resultan más beneficiosas cuando están combinadas con otras y cuando los factores del entorno propician su ejecución. No obstante, es importante no retrasar la aplicación de intervenciones porque falte algún factor favorable, aunque hay que tener en cuenta

que su presencia aumentará enormemente los efectos. Por lo tanto, si bien los factores favorables pueden estar, en gran parte, fuera del control del sector de la salud, es importante abordarlos desde este sector conjuntamente con otros sectores.

Además de las intervenciones descritas, las personas de los grupos de población clave deben disponer de acceso a servicios médicos, de bienestar social y jurídicos generales para lograr el grado más alto posible de salud y bienestar.

## 3.2 Consideraciones específicas

El conjunto integral de intervenciones ya descrito es pertinente para todas las personas de los grupos de población clave. Hay otros elementos pertinentes a algunos grupos específicos, que se resumen a continuación y se describen detalladamente en los capítulos 4 y 5.

### 3.2.1 Prisiones y otros entornos cerrados

Los servicios de prevención y tratamiento de la infección por el VIH que se prestan a la sociedad en general también deben llegar a las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados. La eficacia comprobada de estas intervenciones prestadas en la comunidad no cambia cuando se prestan en las prisiones y otros entornos cerrados, si bien quizá haya que tener en cuenta algunas consideraciones específicas sobre el mejor modo de prestar estos servicios en las prisiones y otros entornos cerrados a fin de potenciar su eficacia. Para mejorar la equidad de la atención de salud en estos entornos, hay que considerar la conveniencia de asignar la responsabilidad por la salud penitenciaria al ministerio de salud en lugar de al ministerio de justicia o interior (3).

En el año 2013, la UNODC y algunos asociados acordaron la elaboración de un conjunto integral de intervenciones de prevención y tratamiento eficaz de la infección por el VIH en las prisiones y otros entornos cerrados. Además de las intervenciones recomendadas para las personas no reclusas, algunas intervenciones pertinentes para los entornos cerrados comprenden:

- la prevención de la transmisión del VIH mediante servicios médicos y dentales;
- la prevención de la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión hemática mediante tatuajes, perforaciones y otras formas de penetración de la piel;
- la protección del personal de la exposición a riesgos laborales.

Hay algunas otras intervenciones importantes que no deben pasarse por alto, como la distribución de cepillos de dientes y afeitadoras en los estuches de higiene básica, la alimentación adecuada, los programas de visitas íntimas, los cuidados paliativos y la liberación compasiva de los casos terminales (4).

### 3.2.2 Personas que consumen drogas inyectables

Este conjunto de intervenciones es, en esencia, el mismo que el de prevención, tratamiento y atención de la infección por el VIH para las personas que consumen drogas inyectables que ha recibido amplio respaldo en el nivel político más alto y en los principales organismos donantes (1, 2). Aunque las intervenciones destinadas a reducir los daños derivados del consumo de sustancias psicoactivas forman parte de este conjunto integral de intervenciones generales para los grupos de población clave, es importante que los países donde se consumen drogas inyectables prioricen la aplicación inmediata de programas de distribución de agujas y jeringas y de tratamiento de sustitución de opioides. La ejecución de estos servicios esenciales para reducir los daños debe facilitar y mejorar el acceso a servicios específicos de atención de la infección por el VIH, como las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente, el tratamiento antirretroviral y la mejora de la adhesión al tratamiento. Las intervenciones destinadas a reducir los daños de las personas que consumen drogas no inyectables también son importantes y deben constar del tratamiento de consumo de drogas basado en la

evidencia y la entrega de insumos para el consumo de drogas no inyectables según corresponda al contexto y los hábitos locales de consumo de drogas.

### 3.2.3 Adolescentes en los grupos de población clave

Este conjunto integral de intervenciones también es pertinente para los adolescentes en los grupos de población clave. La programación de las intervenciones destinadas a los adolescentes también debe incluir:

- la vacunación contra el VPH como parte de los programas nacionales de lucha contra este virus.

Se insta a los países a:

- examinar las actuales políticas de consentimiento y considerar la posibilidad de modificarlas para reducir los obstáculos por la edad que dificultan el acceso y el uso de los servicios de atención de la infección por el VIH.

Sin embargo, aún quedan lagunas de conocimiento fundamentales en cuanto a la mejor manera de llevar adelante los programas que abordan las necesidades de los adolescentes (5). Es esencial que los servicios sean concebidos y prestados de una manera que tenga en cuenta las múltiples vulnerabilidades superpuestas que enfrentan los adolescentes en los grupos de población clave, así como las diferentes necesidades determinadas por la edad, los comportamientos específicos, las complejidades de su entorno social y jurídico, y el entorno epidémico.

# INTERVENCIONES DEL SECTOR DE LA SALUD

# 4

<b>4.1</b>	Prevención .....	24
4.1.1	Programas integrales de distribución de preservativos y lubricantes .....	24
4.1.2	Reducción de los daños para las personas que consumen drogas inyectables .....	26
4.1.3	Intervenciones sobre el comportamiento .....	36
4.1.4	Prevención de la transmisión en los servicios de atención de la salud .....	38
4.1.5	Prevención mediante antirretrovirales .....	39
4.1.6	Circuncisión masculina médica voluntaria como método de prevención de la infección por el VIH .....	43
<b>4.2</b>	Pruebas de detección del VIH y asesoramiento correspondiente .....	45
<b>4.3</b>	Vinculación e incorporación en la atención .....	48
<b>4.4</b>	Tratamiento y atención de la infección por el VIH .....	49
4.4.1	Tratamiento antirretroviral .....	49
4.4.2	Prevención de la transmisión maternoinfantil .....	52
4.4.3	Interacciones medicamentosas del tratamiento antirretroviral .....	54
<b>4.5</b>	Prevención y tratamiento de las coinfecciones y las comorbilidades .....	56
4.5.1	Tuberculosis .....	56
4.5.2	Hepatitis virales .....	60
4.5.3	Salud mental .....	63
<b>4.6</b>	Atención general .....	64
4.6.1	Nutrición .....	64
4.6.2	Intervenciones relativas a la salud sexual y reproductiva .....	65

## 4 INTERVENCIONES DEL SECTOR DE LA SALUD

### 4.1 Prevención

#### 4.1.1 Programas integrales de distribución de preservativos y lubricantes

##### Antecedentes y justificación

Una estrategia esencial de la respuesta al VIH consiste en aumentar la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y el uso de preservativos femeninos y masculinos junto con lubricantes aptos en las personas de los grupos de población clave mediante programas de distribución específica.

**El uso correcto y sistemático de preservativos masculinos reduce la transmisión sexual del VIH y otras ITS hasta un 94%.**

El uso correcto y sistemático de preservativos masculinos reduce la transmisión sexual del VIH y otras ITS, tanto en las relaciones vaginales como anales, hasta un 94%. El empleo de lubricantes de base acuosa o silicona (a diferencia de aquellos de base oleosa) impide que los preservativos se rompan y muevan de lugar (1, 2, 3, 4). Aunque los datos sobre la eficacia de los preservativos femeninos son

más limitados, estos permiten suponer que los preservativos femeninos también previenen el VIH y las ITS (4).

La programación eficaz de la distribución de preservativos particularmente importante para los grupos de población clave. Es frecuente que estos grupos, en particular los adolescentes, combinen las relaciones sexuales sin protección con otros comportamientos de alto riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas (5, 6, 7).

##### Recomendaciones y orientaciones

###### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Se recomienda que todas las personas de los grupos de población clave usen el preservativo de manera correcta y sistemática junto con los lubricantes adecuados para prevenir la transmisión sexual del VIH y otras ITS (recomendación firme, calidad moderada de la evidencia) (3, 8, 9, 10).

##### Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población específico

###### HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES

- Se recomienda que usen preservativos junto con lubricantes adecuados al mantener relaciones sexuales por vía anal (3).
- Hay que subrayar la importancia de entregar lubricantes adecuados en cantidad suficiente.

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

Pese a la actividad sexual que se desarrolla en las prisiones y otros entornos cerrados, el acceso general a preservativos es usualmente muy limitado. Es importante instaurar programas de distribución de preservativos y lubricantes, y ampliarlos a la escala necesaria, tanto en las prisiones como en otros entornos cerrados, sin restringir las cantidades, con carácter anónimo y de una manera fácilmente accesible (por ejemplo, máquinas expendedoras) (9, 11).

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

- La programación eficaz de la distribución de preservativos es un componente esencial del conjunto de intervenciones de reducción de daños para las personas que consumen drogas inyectables y sus compañeros sexuales (8).
- La transmisión sexual del VIH frecuentemente se pasa por alto en las personas que consumen drogas inyectables. Sin embargo, la transmisión del VIH es significativa en los compañeros sexuales que no consumen drogas inyectables. Además, el uso de estimulantes, tanto por vía inyectable como por otras vías, se asocia frecuentemente a un comportamiento sexual de riesgo (8, 12, 13).

### TRABAJADORES SEXUALES (Y SUS CLIENTES)

- Se recomienda que los trabajadores sexuales y sus clientes usen correcta y sistemáticamente preservativos junto con lubricantes adecuados (10).
- Los trabajadores sexuales a menudo deben enfrentar asimetrías de poder que limitan su capacidad para usar preservativos con los clientes (véase el capítulo 5, donde se describen los elementos facilitadores fundamentales). Los trabajadores sexuales que consumen drogas inyectables podrían ser especialmente vulnerables a estas asimetrías de poder. El preservativo femenino aventaja al masculino en el sentido de que es la mujer quien se lo coloca y puede insertárselo hasta varias horas antes de la relación sexual (14). Las estrategias de alcance comunitario y aquellas dirigidas por pares pueden ayudar a aumentar el conocimiento, desarrollar competencias y dotar a los trabajadores sexuales del poder de decisión necesario para que usen preservativos y lubricantes de forma sistemática.

### PERSONAS TRANSGÉNERO

- Se recomienda que usen preservativos junto con lubricantes adecuados al mantener relaciones sexuales por vía anal (3).
- Hay que subrayar la importancia de entregar lubricantes aptos en cantidad suficiente a las mujeres transgénero y los hombres transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres.

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Las capacidades emocionales, intelectuales y sociales de los adolescentes están en continua evolución. La población joven dentro de los grupos de población clave, quizás más que sus pares de la población general, enfrentan asimetrías de poder que limitan su capacidad de usar preservativos en las relaciones sexuales (5, 15, 16). Las estrategias de alcance comunitario y aquellas dirigidas por pares pueden ayudar a distribuir preservativos y lubricantes, aumentar el conocimiento, desarrollar competencias y dotar a los adolescentes de los grupos de población clave del poder de decisión necesario para que usen preservativos y lubricantes de forma correcta y sistemática (17).

### Consideraciones sobre la ejecución

**La legislación y los métodos de aplicación de las leyes** tienen que brindar apoyo a los programas de distribución de preservativos. Es esencial que no se tome la posesión de preservativos como prueba presuntiva de actividad delictiva y que la policía no hostigue a quienes los tienen (10).

**Promoción del acceso.** Si bien en la mayoría de los países los preservativos y los lubricantes se venden sin restricciones, suministrar gratuitamente preservativos y lubricantes adecuados a las personas de grupos de población clave salva los obstáculos económicos (17, 18). Los preservativos, tanto masculinos como femeninos y en diversos tamaños, deben ofrecerse en diversas bocas de expendio para asegurar que lleguen a los diferentes grupos de población clave y, en particular, a la población joven de estos grupos. Las campañas que promueven el uso de preservativos deben aumentar la concientización, fomentar la aceptabilidad y los beneficios, y ayudar a superar los obstáculos sociales y personales que dificultan su uso (10).

**Lubricantes.** Es fundamental que siempre se distribuyan, junto con los preservativos masculinos y femeninos, lubricantes que sean adecuados. El lubricante reduce el riesgo de rotura de los preservativos y su deslizamiento, y puede reducir cualquier incomodidad durante las relaciones sexuales con penetración (10). Durante las relaciones sexuales anales, es recomendable usar abundante cantidad de lubricante (19). Los lubricantes de base acuosa o silicona no dañan los preservativos de látex, a diferencia de aquellos de base oleosa (grasos o aceitosos), por lo que estos últimos no deben usarse con preservativos de látex.

**Información y desarrollo de competencias.** Junto con la promoción y el suministro, los programas destinados a los grupos de población clave deben ofrecer información y desarrollo de competencias para negociar el uso de preservativos (10). Además, las intervenciones sobre el comportamiento pueden promover el uso sistemático de preservativos. Todos los programas de distribución de preservativos deben abordar los complejos factores de género, religiosos y culturales que pueden dificultar el uso de preservativos. En particular, antes de presentar los programas de distribución de preservativos en las prisiones, debe planificarse cuidadosamente la educación y la información tanto para los internos como para el personal penitenciario (9).

### Lecturas recomendadas

- *Condom programming for HIV prevention: a manual for service providers.* Nueva York, UNFPA, 2005. <http://www.unfpa.org/public/global/pid/1291>
- *Comprehensive condom programming: a guide for resource mobilization and country programming.* Nueva York, UNFPA, 2010. <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CCP.pdf>
- OMS, UNPA, ONUSIDA, NSWP, World Bank. *Implementación de programas integrales de VIH/iTS con personas trabajadoras del sexo: enfoques prácticos basados en intervenciones colaborativas.* (Capítulo 4). Ginebra, OMS, 2015. [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176025/9789243506180\\_spa.pdf?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/176025/9789243506180_spa.pdf?sequence=1)
- *Male latex condom specification, prequalification and guidelines for procurement.* Geneva, WHO, 2010. [http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family\\_planning/9789241599900/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241599900/en/)
- *WHO, UNFPA, FHI360. Use and procurement of additional lubricants with male and female condoms – advisory note.* Ginebra, OMS, 2012. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76580/1/WHO\\_RHR\\_12.33\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76580/1/WHO_RHR_12.33_eng.pdf)

## 4.1.2 Reducción de los daños para las personas que consumen drogas inyectables

### Antecedentes y justificación

Las personas que consumen drogas inyectables corren un mayor riesgo de contraer el VIH y otras infecciones virales de transmisión por vía sanguínea (como las hepatitis B y C) porque comparten los materiales de inyección contaminados. En algunos entornos, el consumo de drogas podría ser más prevalente en las personas de los grupos de población clave que en la población general.

**El conjunto integral de intervenciones.** En la guía técnica de la OMS, el ONUSIDA y la UNODC (*WHO, UNAIDS, UNODC technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users*) se describe un conjunto integral de intervenciones basadas en la evidencia para reducir los daños asociados al consumo de drogas inyectables (8). Esta publicación y el conjunto de intervenciones han recibido un respaldo amplio de las Naciones Unidas (20, 21, 22, 23, 24) y los principales donantes internacionales, como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y el Plan de Emergencia para el Alivio del Sida del Presidente de los Estados Unidos (PEPFAR).

### Conjunto integral de intervenciones para la reducción de daños

1. Programas de distribución de agujas y jeringas.
2. Tratamiento de sustitución de opioides y otros tratamientos de las dependencias de sustancias psicoactivas basados en la evidencia.
3. Pruebas de detección del VIH y asesoramiento correspondiente.
4. Tratamiento antirretroviral.
5. Prevención y tratamiento de las ITS.
6. Programas de distribución de preservativos entre las personas que consumen drogas inyectables y sus parejas sexuales.
7. Información, educación y comunicación destinada específicamente a las personas que consumen drogas inyectables y sus parejas sexuales.
8. Prevención, vacunación, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis virales.
9. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.

Solo las dos primeras intervenciones —programas de distribución de agujas y jeringas, y tratamiento de sustitución de opioides y otros tratamientos de las dependencias de sustancias psicoactivas— son específicas para las personas que consumen drogas y son las que se tratan en este capítulo.

**Actividades de alcance comunitario.** Las actividades de alcance comunitario no aparecen como una intervención separada dentro del repertorio o conjunto de intervenciones, pero son un método eficaz para llegar a las personas, en particular a quienes enfrentan obstáculos para acceder a los servicios más utilizados, como suele suceder a la mayoría de las personas de los grupos de población clave. Las actividades de alcance comunitario son un medio sumamente eficaz de prestar servicios de prevención de la infección por el VIH como los programas de distribución de agujas y jeringas, los programas de distribución de preservativos y las campañas de comunicación específicas para estos grupos, además de que constituyen un punto de acceso de utilidad para derivar a las personas al tratamiento de sustitución de opioides y al tratamiento antirretroviral. En consecuencia, el alcance comunitario es un componente esencial de todos los programas relacionados con el VIH (25).

Algunas otras intervenciones no están incluidas en este conjunto integral de intervenciones para reducir los daños debido a que la evidencia sobre su eficacia en cuanto a la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH es insuficiente. Sin embargo, en este documento se ha incluido una nueva recomendación sobre la distribución de naloxona a la comunidad y se pueden ver más detalles al final de este capítulo.

**Reducción de los daños relacionados con la inyección de sustancias como tratamiento de afirmación del género.** La inyección de sustancias en las personas transgénero como tratamiento de afirmación del género es diferente del consumo de drogas inyectables que ya se describió. En los lugares donde se utilice este tratamiento hormonal, es importante que los servicios de atención de salud garanticen el acceso a

Los programas de distribución de agujas y jeringas logran una disminución sustancial y costoeficaz de la transmisión del VIH en las personas que consumen drogas inyectables.

preparados apropiados, prevengan la dosificación incorrecta y traten adecuadamente cualquier efecto adverso, además de reducir el intercambio de materiales de inyección. Hasta ahora, no se ha publicado ninguna directriz de la OMS sobre el tratamiento hormonal para la afirmación del género.

La inyección de hormonas es distinta de la inyección de preparados no terapéuticos de silicona y otros materiales de relleno de tejidos

blandos para modificar el aspecto corporal directamente (26, 27). La inyección directa de silicona y otras sustancias se ha vinculado a daños como infecciones, desfiguración, migración de la sustancia inyectada dentro del cuerpo y enfermedades sistémicas (28, 29, 30). Es importante que las personas transgénero reciban asesoramiento acerca de los riesgos para la salud que entrañan estas inyecciones y que puedan acceder a los servicios de atención de salud que les proporcionen métodos más seguros de afirmación del género.

**Adolescentes que consumen drogas inyectables.**<sup>1</sup> Los adolescentes que consumen drogas inyectables enfrentan riesgos y obstáculos adicionales para acceder a los servicios debido a diversos factores jurídicos, de desarrollo y del entorno. Los adolescentes a menudo tienen menos conocimientos sobre los métodos de inyección que suponen un menor riesgo y sobre los servicios. En muchos países, las restricciones etarias y los requisitos de consentimiento de un progenitor excluyen a los adolescentes de los programas de distribución de agujas y jeringas, y de los tratamientos de sustitución de opioides. Es probable que sea necesario elaborar estrategias específicas y más creativas de participación para promover la utilización de los servicios en los adolescentes y jóvenes. Lograr el compromiso de los padres de los adolescentes que consumen drogas inyectables con los programas de reducción de los daños puede ayudar a garantizar que el adolescente reciba el apoyo adecuado. Sin embargo, es importante obtener el consentimiento del adolescente antes de incluir a los padres.

#### 4.1.2.1 Programas de distribución de agujas y jeringas

##### Antecedentes y justificación

Una vez que el VIH ingresa en un colectivo de personas que consumen drogas inyectables y suelen compartir jeringas y material de inyección, las tasas de prevalencia pueden alcanzar proporciones epidémicas muy rápidamente (31). Distribuir material de inyección estéril gratuito o a bajo costo entre las personas que se inyectan facilita el uso de agujas y jeringas estériles y reduce el número de inyecciones con agujas y jeringas contaminadas (8, 32, 33, 34, 35, 36, 37).

Los programas de distribución de agujas y jeringas logran una disminución sustancial y costoeficaz de la transmisión del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables (36) y también pueden reducir la transmisión de otros virus de transmisión por vía sanguínea, como las hepatitis virales B y C (35, 36, 38, 39, 40). Además, estos programas no promueven el consumo de drogas y no hay ningún indicio de que tengan importantes consecuencias negativas no intencionales, como promover el inicio en el hábito de inyectarse drogas entre las personas que nunca se han inyectado ni aumentar la frecuencia de inyección a nivel individual o social (41, 42, 43, 44).

Por otra parte, estos programas pueden servir de punto importante de entrada a otros servicios, dado que procuran comprometer a sus usuarios reiteradamente y de forma sistemática. Por lo tanto, ofrecen varias oportunidades de acceso a otros servicios de salud, como los tratamientos de sustitución de opioides y otros tratamientos de dependencia de sustancias, las pruebas de detección del VIH y la orientación subsiguiente, y el tratamiento contra la infección por el VIH, la tuberculosis y las hepatitis virales (45). Además, pueden ofrecer atención básica de salud y abordar otros temas específicos que suelen afectar a las personas que consumen drogas inyectables, como el tratamiento de heridas y la prevención de sobredosis. Hay muchos métodos que pueden emplearse para distribuir agujas y jeringas y prestar servicios, por ejemplo, pueden distribuirse en sitios fijos como farmacias, máquinas dispensadoras automáticas o máquinas expendedoras y servicios móviles y servicios de alcance comunitario (8, 36). Dadas las tasas elevadas de encarcelamiento de las personas que consumen drogas inyectables, el acceso a materiales de inyección estériles y a los programas de distribución de agujas y jeringas constituyen elementos importantes de los servicios de salud penitenciarios (4).

Para prevenir la transmisión del VIH a través del consumo de drogas inyectables, es crucial proporcionar no solo información sobre cómo prevenirla (mediante inyecciones menos riesgosas y sin compartir materiales de inyección), sino también los medios para prevenirla, mediante la distribución de materiales de inyección estériles de manera gratuita o a bajo costo. Los programas de distribución de agujas y jeringas también brindan la oportunidad de derivar a estas personas a otros servicios de salud y otros servicios relacionados, por ejemplo, los servicios de pruebas del VIH y el asesoramiento correspondiente y de tratamiento de las dependencias de sustancias psicoactivas.

<sup>1</sup> Véase también el apéndice 6 [en inglés] sobre la población joven.

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Todas las personas de los grupos de población clave que consumen drogas inyectables deben tener acceso a material de inyección estéril mediante los programas de distribución de agujas y jeringas (recomendación firme, calidad baja de la evidencia) (8, 32, 36, 46).

#### *Observaciones complementarias*

- Se sugiere que los programas de distribución de agujas y jeringas también proporcionen jeringas con escaso espacio muerto junto con información acerca de las ventajas de prevención que ofrecen estas en comparación con las jeringas convencionales (39).
- Los materiales de inyección deben ser apropiados para el contexto local; es decir, deben tener en cuenta factores como el tipo y los preparados de las sustancias que habitualmente se consumen por vía inyectable (8, 27).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada población clave específica

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- Es importante proporcionar a las personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados medidas de prevención, como preservativos y materiales de inyección estériles, en lugar de limitarse a la provisión de información acerca de la prevención de los riesgos. Las personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados deben tener acceso fácil y confidencial al programa de distribución de agujas y jeringas (9).
- Los sistemas penitenciarios deben realizar pruebas piloto y evaluar prácticas más seguras de tatuaje para evaluar si reducen el intercambio y la reutilización de los insumos y, por ende, las infecciones (9, 11).

### PERSONAS TRANSGÉNERO

Las personas transgénero que se inyectan sustancias para la afirmación de género deben usar materiales de inyección estériles y métodos de inyección sin riesgos para reducir las probabilidades de infección con patógenos de transmisión sanguínea como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C (3).

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Las orientaciones de la OMS no especifican restricciones etarias para los programas de distribución de agujas y jeringas.

## Consideraciones sobre la ejecución

Se necesita un **cambio estructural** para crear un entorno normativo, jurídico y social favorable que facilite el acceso equitativo a la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH para todos, incluidos los programas de distribución de agujas y jeringas para las personas que consumen drogas inyectables (8).

En muchos sectores, sobre todo en los órganos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes y la comunidad local, la **defensa de la causa** a menudo debe valerse de evidencia sobre salud pública para fomentar un entorno que sea propicio y permita el funcionamiento pleno del programa de distribución de agujas y jeringas (8, 36, 45, 47).

**Penalización contraproducente.** Si llevar agujas y jeringas usadas es un delito o puede utilizarse como prueba sobre el consumo de drogas, las personas que consumen drogas inyectables podrían ser renuentes a llevar los materiales usados a los programas de distribución de agujas y jeringas para que los desechen (27, 36, 45).

**Al servicio de los grupos de población clave.** Es importante que el programa de distribución de agujas y jeringas sea sensible a las necesidades de salud de cada grupo de población clave. Las organizaciones de estos grupos pueden ocuparse de ofrecer estas intervenciones o disponer de vías eficaces de derivación a los servicios que las ofrecen (32).

**Otros insumos.** Además de las agujas y las jeringas, también pueden suministrarse otros insumos de inyección, como hisopos impregnados de alcohol, ampollas de agua estéril, filtros, torniquetes, vasos de mezcla (por ejemplo, cucharas u “ollas”) y acidificantes (por ejemplo, ácido ascórbico o polvos de ácido cítrico) (8, 27).

**Eliminación sin riesgos de insumos.** El programa de distribución de agujas y jeringas debe instaurar sistemas que permitan eliminar los insumos de inyección sin riesgos y promover su uso (8, 27). Hay diversos modelos de sistemas de desecho que no suponen riesgos, por ejemplo, los cestos unidireccionales resistentes a la punción. La eliminación eficaz y sin riesgos reduce la cantidad de equipo contaminado que circula en la comunidad, por lo que reduce la reutilización y los pinchazos accidentales con agujas, de manera que limita las reacciones negativas de la sociedad. La información suministrada también puede describir las oportunidades para reducir el consumo de drogas a más largo plazo.

**Información y educación en las prisiones y otros entornos cerrados.** Las personas recluidas y el personal penitenciario deben recibir información acerca de los programas y participar en su formulación y aplicación. Los programas piloto de distribución de agujas y jeringas en las prisiones evaluados cuidadosamente podrían ser importantes para allanar el camino de los programas continuos a gran escala, pero esta ampliación no debe esperar los resultados de los programas piloto, en particular donde el consumo de drogas inyectables es frecuente en las prisiones (9).

### Lecturas recomendadas

- WHO, UNODC, UNAIDS. *Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users – 2012 revision*. Ginebra, OMS, 2012. [http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets\\_universal\\_access/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/)
- WHO, UNAIDS, UNODC. *Guide to starting and managing needle and syringe programmes*. Ginebra, OMS, 2007. [http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596275\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596275_eng.pdf)
- *Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/AIDS among injecting drug users*. Ginebra, OMS, 2004. <http://www.who.int/hiv/pub/idu/e4a-needle/en/>
- *Best practices for injections and related procedures toolkit*. Ginebra, OMS, 2010. [http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599252\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599252_eng.pdf)

#### 4.1.2.2 Tratamiento de sustitución de opioides

##### Antecedentes y justificación

**El tratamiento de sustitución de opioides es sumamente eficaz para reducir el consumo de drogas inyectables que expone a las personas dependientes de los opioides a contraer el VIH.**

Las intervenciones que tratan eficazmente la dependencia de sustancias psicoactivas pueden reducir el consumo ilegal de drogas y, en consecuencia, la frecuencia de inyección, así como mejorar la salud y el funcionamiento social (8). Para las personas dependientes de los opioides, el tratamiento de sustitución con agonistas de los opioides —a veces denominado “tratamiento asistido con medicación”— es sumamente eficaz para disminuir la frecuencia con la que las personas adictas a los opioides consumen drogas inyectables, lo que las pone en

riesgo de contraer el VIH (33, 34, 48, 49, 50). El tratamiento de sustitución de opioides puede reducir el consumo de estas sustancias psicoactivas y mejorar la retención en el tratamiento contra la infección por el VIH (51, 52, 53). El acceso a este tratamiento y el cumplimiento terapéutico pueden mejorar los resultados en materia de salud (4), disminuir las sobredosis y la mortalidad resultante (54), reducir la actividad delictiva (55), lograr mejores resultados psicosociales (56) y reducir el riesgo para las embarazadas adictas a las drogas y sus hijos (57).

La metadona y la buprenorfina, dos medicamentos que integran la lista de la OMS de medicamentos esenciales, son los agonistas opioides que más se utilizan (58). La metadona es un opioide sintético usado para tratar la dependencia a la heroína y a otros opioides que reduce los síntomas de abstinencia y el efecto eufórico de estas sustancias. Este medicamento se toma por vía oral todos los días y es importante asegurarse de que la dosis sea adecuada (60-120 mg) y que el tratamiento tenga una duración suficiente (8, 50). La buprenorfina es un agonista parcial de eficacia similar a la metadona contra la dependencia de opioides cuya principal vía de administración es sublingual (8-24 mg/día). Los programas de tratamiento de sustitución de opioides deben crear entornos y relaciones favorables que faciliten el tratamiento coordinado de los problemas coexistentes de salud mental y física, y aborden los factores psicosociales pertinentes (50).

- Para lograr una cobertura óptima y resultados terapéuticos excelentes, el tratamiento de sustitución de opioides debe ser gratuito o estar cubierto por el seguro de salud pública y la atención debe ser accesible a todos los necesitados, incluidas las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados (50).
- El tratamiento de sustitución de opioides no debe ser obligatorio; los pacientes deben otorgar el consentimiento informado para recibir el tratamiento (8, 50).
- A fin de garantizar la eficacia plena, es preciso proporcionar mantenimiento con el tratamiento de sustitución de opioides con una duración suficiente y en las dosis adecuadas (8, 50).

#### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Es esencial ofrecer a todas las personas de los grupos de población clave que son dependientes de los opioides el tratamiento de sustitución conforme a las directrices de la OMS (recomendación firme, calidad baja de la evidencia) (8, 32, 50), incluidas las personas reclusas en prisión y otros entornos cerrados (9).

##### *Observaciones complementarias*

- A fin de potenciar la seguridad y la eficacia de los programas de tratamiento de sustitución de opioides, las políticas y los reglamentos deben promover estructuras flexibles de administración de los medicamentos, sin restringir las dosis ni la duración del tratamiento (50). Las dosis usuales de mantenimiento con metadona deben ser de un mínimo de 60-120 mg por día, y las dosis promedio de mantenimiento con buprenorfina deben ser de al menos 8 mg por día (50). Se puede ofrecer a estas personas que se lleven el medicamento a casa cuando la dosis y la situación social sean estables y cuando sea mínimo el riesgo de que lo usen con fines ilegítimos (50). El tratamiento de sustitución de heroína y opioides es más eficaz como tratamiento de mantenimiento si es prolongado (quizá sean necesarios varios años). La deshabitación de los opioides (en lugar del tratamiento de mantenimiento) tiene resultados desfavorables a largo plazo, pero los pacientes deben recibir ayuda para deshabituarse de los opioides si esa es su decisión fundamentada (50).
- Para tratar la dependencia de opioides durante el embarazo, es más conveniente administrar el tratamiento de sustitución de esas sustancias en lugar de intentar la deshabitación (50, 59).
- Todas las personas dependientes de los opioides deben tener acceso a apoyo psicosocial además de los tratamientos farmacológicos. Como mínimo, este apoyo debe incluir la evaluación de las necesidades psicosociales, terapia de apoyo y vinculación a los servicios familiares y comunitarios (50).
- Las personas dependientes de los opioides que tienen tuberculosis, hepatitis viral B o C, o VIH deben recibir los agonistas opioides junto con el tratamiento médico contra esas infecciones. No hay ninguna necesidad de esperar a que se deshabituén de los opioides para comenzar el tratamiento contra estas infecciones (50).

- Los servicios de tratamiento deben ofrecer vacunación contra la hepatitis B a todos los pacientes dependientes de los opioides (independientemente de que estén participando en programas de tratamiento de sustitución de opioides o no) (50).
- Los entornos de atención que proporcionan tratamiento de sustitución de opioides deben iniciar y mantener el tratamiento antirretroviral de las personas que tienen VIH que cumplan los criterios de tratamiento (4).

### Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

#### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- Las autoridades penitenciarias de los países donde se ofrece tratamiento de sustitución de opioides en la comunidad deben incorporar con carácter urgente programas que los ofrezcan en las prisiones y ampliarlos a la escala necesaria cuanto antes (9).
- Los países deben respaldar y fortalecer el principio de proporcionar tratamiento, educación y rehabilitación como alternativa a la reclusión y el castigo por los delitos relacionados con la droga (8).
- Es preciso tener la precaución de que quienes ya estén en tratamiento de sustitución de opioides antes de entrar en prisión o en otros entornos cerrados puedan seguir ese tratamiento sin interrupciones durante su encierro y cuando sean transferidos entre entornos (9, 50), además conectarlos con programas ofrecidos en la comunidad una vez que recuperen la libertad (60).
- La prestación de tratamiento de sustitución de opioides antes de la liberación puede ayudar a reducir la mortalidad por sobredosis (61).

#### PERSONAS TRANSGÉNERO

No se han registrado datos sobre interacciones medicamentosas entre el tratamiento de sustitución de opioides y los medicamentos utilizados para la afirmación del género, pero las investigaciones son muy limitadas.

#### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Las recomendaciones de la OMS no especifican restricciones etarias respecto del tratamiento de sustitución de opioides.

### Consideraciones sobre la ejecución

Es preciso establecer **procesos documentados** para garantizar métodos seguros y legales de compra, almacenamiento, entrega y dosificación de los medicamentos, en particular de la metadona y la buprenorfina (50).

**Supervisión.** En la primera fase del tratamiento, hay que supervisar directamente la administración de las dosis de metadona y buprenorfina (50).

Cabe ofrecer a estas personas que se lleven el medicamento a casa cuando la dosis y la situación social son estables y cuando es mínimo el riesgo de que lo usen con fines ilegítimos (50).

El **alta involuntaria** del tratamiento a veces está justificada para garantizar la seguridad del personal y otros pacientes, pero no debe estar motivada por el incumplimiento de las reglas del programa. Antes del alta involuntaria, hay que tomar medidas razonables para mejorar la situación, como reevaluar el tipo de tratamiento (50).

### Lecturas recomendadas

- *Guidelines for psychosocially assisted pharmacotherapy for the management of opioid dependence.* Ginebra, OMS, 2009. <http://www.who.int/hiv/pub/idu/opioid/en/index.html>
- *Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users – 2012 revision.* Ginebra, OMS, 2012. [http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets\\_universal\\_access/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/)
- *Operational guidelines for the management of opioid dependence in the South-East Asia Region.* Nueva Delhi, Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, 2008. [http://www.who.int/hiv/pub/idu/op\\_guide\\_opioid\\_depend/en/index.html](http://www.who.int/hiv/pub/idu/op_guide_opioid_depend/en/index.html)
- *Guidelines for identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy.* Ginebra, OMS, 2014. [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/pregnancy\\_guidelines/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/pregnancy_guidelines/en/)

#### 4.1.2.3 Otros tratamientos de las dependencias de sustancias psicoactivas

##### Antecedentes y justificación

La **evidencia** sobre la prevención de la infección por el VIH no fue tan firme como la relativa a los programas de distribución de agujas y jeringas, y el tratamiento de sustitución de opioides. De todos modos, se recomienda enfáticamente instaurar otras intervenciones contra las drogodependencias donde esté muy difundido el consumo de drogas no derivadas del opio u opioides o no se consiga el tratamiento de sustitución de opioides.

El objetivo del tratamiento de las dependencias es lograr y mantener el bienestar físico, psicológico y social disminuyendo los riesgos asociados al consumo de drogas, reduciendo la cantidad de droga que se consume, o absteniéndose por completo del consumo de drogas. Debido a la naturaleza crónica y recidivante de la drogodependencia y la necesidad de abordar las dimensiones sociales y psicológicas, la abstinencia, si ese es el objetivo, a menudo entraña un proceso prolongado y difícil. La definición de metas pequeñas o estrategias de estabilización —metas más realizables a corto plazo— puede ayudar a definir y estructurar el progreso, y también a reducir los daños relacionados con la droga, uno de los cuales es el contagio de virus de transmisión hemática, como el VIH y las hepatitis B y C (62).

La evidencia sobre los efectos que tienen otras formas de tratamiento de las drogodependencias sobre la incidencia de la infección por el VIH es menos convincente que la relativa al tratamiento de sustitución de opioides (8, 63). De todos modos, se recomienda instaurar estas otras intervenciones donde esté muy difundido el consumo de drogas no opioides, como los estimulantes anfetamínicos, la cocaína, los sedantes y los hipnóticos, y también donde sigue sin conseguirse el tratamiento de sustitución de opioides (8). El tratamiento de las dependencias ayuda a prevenir el VIH porque disminuye el consumo de drogas inyectables, reduce el intercambio de insumos de inyección, disminuye los comportamientos sexuales riesgosos y crea oportunidades de educación y atención médica de la infección por el VIH (64).

Por lo general, el tratamiento de la dependencia combina diferentes métodos terapéuticos, los que, en términos sencillos, pueden clasificarse en psicosociales (intervenciones sobre el comportamiento o dirigidas a la abstinencia) o farmacológicos. Los métodos farmacológicos pueden clasificarse, a su vez, en tratamientos de deshabitación, prevención de recaídas y disminución del ansia por consumir y el consumo de drogas (62).

**La detención no es un tratamiento.** En varios países, las personas que consumen drogas inyectables son detenidas y confinadas a centros de detención, aparentemente para recibir farmacoterapia y rehabilitación, pero sin un juicio previo ni una evaluación clínica de la dependencia, y los resultados del tratamiento clínico rara vez determinan la duración de la detención. Normalmente, estos centros carecen de supervisión médica de los procesos de deshabitación y no ofrecen tratamientos de las drogodependencias basados en la evidencia. Los detenidos muchas veces se ven obligados a trabajar sin remuneración o a efectuar ejercicios de entrenamiento militar y pueden ser objeto de castigos físicos. Una vez liberados de estos centros, muchos recaen en el consumo de drogas y pueden quedar expuestos a un riesgo mayor de sobredosis (65).

Estos métodos violan los derechos humanos. Además, dado que no hay pruebas sobre su eficacia para tratar las dependencias ni reducir la transmisión del VIH, no corresponde considerarlos tratamientos de las drogodependencias (8). Por estos motivos, la OMS y otros asociados de las Naciones Unidas no apoyan estas formas de detención e instan a los Estados Miembros a que cierren los centros de detención y rehabilitación obligatoria de las drogodependencias y a que instauren servicios de atención de la salud y servicios sociales voluntarios basados en los derechos humanos y fundamentados en la evidencia dentro de la comunidad (66).

La contención de la propagación del VIH es más eficaz donde se ofrecen diversos servicios integrales basados en la evidencia de tratamiento de las drogodependencias (62).

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Todas las personas de los grupos de población clave que consumen alcohol u otras sustancias psicoactivas en cantidades que produzcan desinhibición, obnubilación e intoxicación deben tener acceso a intervenciones basadas en la evidencia, como las intervenciones psicosociales breves que comprenden la evaluación, la retroalimentación específica y el asesoramiento (recomendación condicional, calidad muy baja de la evidencia) (3, 46).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para grupos de población clave específicos

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- Las personas recluidas en prisión deben tener acceso a las mismas opciones de tratamiento basadas en la evidencia contra la dependencia de sustancias psicoactivas que las personas de la comunidad (9, 60).
- Para reducir el exceso de arrestos y el hacinamiento en los centros de detención y prisiones, que aumentan el riesgo de contraer la infección por el VIH, es importante que los países examinen las leyes y políticas nacionales que tipifican como delito el consumo de bebidas alcohólicas y drogas (9, 60).

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Deben recibir el tratamiento que más los beneficie conforme a su propia decisión.

## Consideraciones sobre la ejecución

Las **intervenciones psicosociales** deben formar parte del tratamiento integral contra la dependencia de sustancias psicoactivas (39, 50).

**Alternativas a la penalización.** Los países deben respaldar y fortalecer el principio de proporcionar tratamiento, educación y rehabilitación en lugar de recluir y castigar a estas personas por delitos relacionados con la droga. Actualmente, muchos países destinan importantes partidas de gastos al encarcelamiento de las personas farmacodependientes, método asociado a tasas muy altas de recaída poco después de la liberación. No hay pruebas de que ese método sea eficaz ni costoeficaz (8).

### Lecturas recomendadas

- *mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings*. Ginebra, OMS, 2011. [http://www.who.int/mental\\_health/publications/mhGAP\\_intervention\\_guide/en/index.htm](http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/index.htm)
- *Technical briefs on amphetamine-type substances*. Manila, Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Oriental, 2011. [http://www.who.int/hiv/pub/idu/ats\\_tech\\_brief/en/index.html](http://www.who.int/hiv/pub/idu/ats_tech_brief/en/index.html)
- *Basic principles for treatment and psychosocial support of drug dependent people living with HIV/AIDS*. Ginebra, OMS, 2006. [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/basic\\_principles\\_drug\\_hiv.pdf](http://www.who.int/substance_abuse/publications/basic_principles_drug_hiv.pdf)

#### 4.1.2.4 Prevención y tratamiento de la sobredosis de opioides

##### Antecedentes y justificación

En todo el mundo, la sobredosis de drogas es la principal causa de muerte en las personas que consumen drogas inyectables y una causa frecuente de las defunciones no relacionadas con el VIH de las personas que tienen el virus. Todos los años, mueren aproximadamente 69.000 personas a causa de sobredosis (67).

**La sobredosis de opioides es evitable y tratable si sucede en presencia de otra persona.**

La sobredosis de opioides es evitable y tratable si sucede en presencia de otra persona. El tratamiento de sustitución de opioides es el método de prevención más eficaz para las personas dependientes de los opioides (50). La sobredosis de opioides es tratable mediante asistencia respiratoria y la administración de naloxona, un antagonista opioide de acción corta. La naloxona tiene una historia extensa como tratamiento

satisfactorio de la sobredosis por opioides. Este medicamento no tiene ningún efecto si no hay opioides en el organismo y no es adictivo. La naloxona está incluida en la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales (68).

Si bien por mucho tiempo el personal médico y los establecimientos de atención de salud han utilizado ampliamente la naloxona, algunos países de varias regiones han comenzado de manera más reciente a distribuirla a la sociedad, es decir, han comenzado a permitir la distribución y la administración entre las personas dependientes de los opioides y sus pares y familiares así como los agentes de respuesta rápida, como la policía y los servicios de urgencias. La mayor disponibilidad de la naloxona mediante la distribución a la sociedad podría ayudar a reducir las altas tasas de sobredosis por opioides, en particular donde el acceso a los servicios de salud esenciales es limitado para las personas que consumen drogas inyectables.

##### Recomendaciones y orientaciones

###### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Las personas que tienen probabilidades de presenciar una sobredosis por opioides deben tener acceso a la naloxona y recibir instrucciones sobre su uso en situaciones de urgencia por presunta sobredosis de opioides (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (69).
- La naloxona es eficaz cuando se administra por vía intramuscular, intranasal, intravenosa o subcutánea. Las personas que administren la naloxona deben elegir la vía en función de la forma farmacéutica que tengan a su alcance, su pericia para administrarla, el entorno y el contexto local (*recomendación condicional, calidad muy baja de la evidencia*) (69).

- En los casos de presunta sobredosis de opioides, quienes socorran a la persona afectada deben centrarse en mantenerle las vías respiratorias permeables, brindarle asistencia respiratoria y administrarle la naloxona (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (69).
- Una vez reanimada la persona afectada tras la administración de la naloxona, es preciso mantener en estricta observación el estado de conciencia y la respiración, si es posible, hasta que esté recuperada plenamente (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (69).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave específico

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Las orientaciones de la OMS no especifican restricciones etarias respecto del tratamiento de las sobredosis.

## Consideraciones sobre la implementación

**Cuestiones jurídicas y normativas.** Puede haber obstáculos, tanto jurídicos como normativos, que impidan el acceso y la administración de naloxona por los socorristas sin formación profesional que atienden a la persona afectada, por lo que quizá sea necesario examinarlos para poner en práctica esta recomendación.

**Dosis.** Si es posible, es preciso adaptar la dosis para prevenir los síntomas intensos por abstinencia de opioides. La elección de la dosis inicial dependerá de la forma farmacéutica y del contexto, pero las dosis superiores a los 0,8 mg im/iv/sc tienen mayores probabilidades de provocar síntomas de abstinencia significativos.

### Lecturas recomendadas

- *Community management of opioid overdose.* Ginebra, OMS, de próxima publicación. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137462/1/9789241548816\\_eng.pdf?ua=1&ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137462/1/9789241548816_eng.pdf?ua=1&ua=1)
- *WHO model list of essential medicines, 18th list.* Ginebra, OMS, 2013. [http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/18th\\_EML\\_Final\\_web\\_8Jul13.pdf](http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/18th_EML_Final_web_8Jul13.pdf)
- *UNODC, OMS. Discussion paper. Opioid overdose: preventing and reducing opioid overdose mortality.* Viena, Naciones Unidas, 2013. <http://www.unodc.org/docs/treatment/overdose.pdf>

## 4.1.3 Intervenciones sobre el comportamiento

### Antecedentes y justificación

Para reducir el riesgo de contraer alguna ITS o el VIH, las personas deben comprender el riesgo al que están expuestas y contar con el conocimiento, las aptitudes y la confianza en la capacidad propia para reducir ese riesgo. Las intervenciones sobre el comportamiento suministran la información, la motivación, la educación y el desarrollo de capacidades que ayudan a las personas a disminuir las prácticas de riesgo y mantener este cambio positivo.

Las **intervenciones sobre el comportamiento** ayudan a las personas a tener prácticas de menor riesgo y mantener este cambio positivo.

Las intervenciones sobre el comportamiento pueden estar dirigidas a personas o a grupos. El asesoramiento personalizado puede centrarse en crear conciencia sobre el riesgo personal y las estrategias que permiten reducir los riesgos; por ejemplo, los orientadores psicológicos o los trabajadores comunitarios pueden hablar sobre los comportamientos de riesgo, relacionar las actividades del participante directamente con el riesgo de contraer el VIH y describir las estrategias que puede aplicar

para reducir este riesgo. Por el contrario, las intervenciones entre pares y las sesiones grupales pueden centrarse más en la conciencia sobre el riesgo en términos generales, en tanto que las sesiones grupales ofrecen además

el beneficio del apoyo grupal a la hora de buscar estrategias viables para reducir el riesgo. Las campañas de mercadotecnia social también pueden ayudar promoviendo las pruebas de detección, el tratamiento de la infección y otros servicios.

Las intervenciones que apuntan a lograr cambios de comportamiento pueden suministrarse como parte de otras intervenciones dentro del conjunto integral. Pueden tener lugar en persona o a través de los medios de difusión de gran alcance y los medios de comunicación digitales por internet. La elección del contenido y el enfoque, así como del medio, debe estar fundamentada por un buen análisis formativo de la situación local.

Aunque la lógica de las intervenciones sobre el comportamiento se basa principalmente en la concientización individual y la toma de decisiones acerca del riesgo, estas intervenciones también pueden operar sobre la comunidad en pleno. Por ejemplo, las intervenciones pueden incluir la capacitación de personalidades influyentes para que se comuniquen con sus pares, lo que puede cambiar las percepciones sobre las normas sociales acerca de los riesgos y la forma de evitarlos.

Los adolescentes merecen consideración especial ya que, en esta etapa, el deseo de explorar y experimentar suele desarrollarse antes que la capacidad para tomar decisiones (70). Las capacidades cognitivas en evolución de los adolescentes son importantes a la hora de definir las intervenciones sobre el comportamiento específicas para ellos.

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Hay diversas intervenciones sobre el comportamiento que pueden suministrar la información y los conocimientos técnicos que ayudan a disminuir los riesgos, previenen la transmisión del VIH y aumentan la utilización de los servicios por todos los grupos de población clave. No encontramos evidencia suficiente para emitir unas recomendaciones aplicables a todos los grupos de población clave. Sin embargo, algunos enfoques específicos con respecto al comportamiento aplicables a grupos específicos de población clave han sido evaluados y los podemos recomendar.

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES

- Se recomiendan las siguientes estrategias para que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres adopten comportamientos sexuales de menor riesgo y aumenten la utilización de las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente:
  - información específica publicada en internet;
  - estrategias de “mercadeo social”;
  - estrategias de alcance comunitario en lugares de encuentros sexuales (3, 32).
- Se sugiere utilizar intervenciones sobre el comportamiento tanto a nivel individual como de la comunidad (3, 32).

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- Los métodos integrales que se basan en los pares mejoran la eficacia de las iniciativas penitenciarias de educación sobre el VIH (9).
- La información y los programas de educación acerca del VIH y otras enfermedades infecciosas son importantes tanto para los prisioneros como para el personal penitenciario. Es esencial prestar especial atención a las necesidades de las personas que estuvieron recluidas en prisión tras su liberación.

### TRABAJADORES SEXUALES

Los programas que fomentan el uso de preservativos, como los dirigidos por la comunidad, pueden aumentar el uso de los preservativos en los trabajadores sexuales y sus clientes. Mediante intervenciones dirigidas por pares y por la comunidad, estos programas pueden suministrar información y conocimientos prácticos que fomenten el uso de preservativos y aumenten la demanda de las pruebas de detección del VIH, la detección de las ITS y la atención y el tratamiento de la infección por el VIH (71).

### PERSONAS TRANSGÉNERO

Se recomiendan las siguientes estrategias para que las personas transgénero adopten comportamientos sexuales de menor riesgo y aumenten la utilización de las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente:

- información específica publicada en internet;
- estrategias de "mercadeo social";
- estrategias de alcance comunitario en los sitios de encuentros sexuales (3, 32).

Se recomienda utilizar intervenciones sobre el comportamiento tanto a nivel individual como de la comunidad (3, 32).

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Se comprobado que los métodos interactivos y participativos que aportan conocimientos técnicos a los adolescentes de los grupos de población clave, como las estrategias de salud en línea y móvil, y los programas de pares y de extensión, resultan aceptables para los adolescentes y han sido prometedores en algunos contextos (72, 73).

### Lecturas recomendadas

- Kennedy CE et al. *Behavioural interventions for HIV positive prevention in developing countries: a systematic review and meta-analysis*. Bulletin of the World Health Organization, 2010, 88(8):615–623. <http://www.who.int/bulletin/volumes/88/8/09-068213/en/>
- *Prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men and transgender people*. Ginebra, OMS, 2011. [http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/msm\\_guidelines2011/en/](http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/msm_guidelines2011/en/)

#### 4.1.4 Prevención de la transmisión en los entornos de atención de salud

A continuación se indican los elementos esenciales para prevenir la transmisión del VIH en los entornos de atención de salud.

##### Procedimientos de prevención primaria

- Seguridad de la sangre (véase <http://www.who.int/bloodsafety/publications/en/>);
- prevención de las inyecciones con instrumental contaminado;
- atención de urgencia y quirúrgica esencial que limite la necesidad de transfusiones de sangre;
- precauciones usuales para reducir al mínimo la propagación de infecciones como resultado de intervenciones médico-quirúrgicas y de enfermería, y para evitar el contacto directo e indirecto con sangre, fluidos corporales, secreciones y contacto con piel cortada o lesionada. Estas precauciones básicas de control de las infecciones en los entornos de atención de salud comprenden la higiene de las

manos, los equipos de protección personal para prevenir la exposición, la eliminación segura de objetos punzocortantes y desechos, y la limpieza y desinfección seguras del entorno y los materiales;

- detección, eliminación y control de la exposición a riesgos en el lugar de trabajo y prevención de los pinchazos accidentales.

La **prevención secundaria**, o sea, la profilaxis posterior a la exposición, es aplicable en los espacios de atención de salud cuando han fallado las medidas de prevención primaria o cuando un trabajador de salud o paciente ha quedado expuesto al riesgo de transmisión del VIH, sea accidentalmente o a causa de procedimientos poco seguros (véase la sección 4.1.5.2).

### Lecturas recomendadas

- *Blood donor selection. Guidelines on assessing donor suitability for blood donation.* Ginebra, OMS, 2012. [http://www.who.int/bloodsafety/publications/bts\\_guideline\\_donor\\_suitability/en](http://www.who.int/bloodsafety/publications/bts_guideline_donor_suitability/en)

## 4.1.5 Prevención mediante antirretrovirales

### 4.1.5.1 Profilaxis previa a la exposición

En el 2015, la OMS publicó las directrices sobre la profilaxis previa a la exposición (PrEP), las cuales fueron incluidas en esta publicación. A continuación se describe la totalidad de la orientación y su justificación.

#### Antecedentes y justificación

La PrEP oral utiliza fármacos antirretrovirales en personas que aún no están infectadas por el VIH para evitar que contraigan el virus antes de exponerse al mismo.

Se han realizado doce ensayos para probar la eficacia de la PrEP por vía oral en parejas serodiscordantes, hombres heterosexuales, mujeres, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que consumen drogas inyectables y mujeres transgenero. En los casos donde el cumplimiento terapéutico fue adecuado se logró una gran eficacia, lo que pone de manifiesto la utilidad de esta intervención en el marco de una serie de métodos de prevención combinados.

La OMS recomendó en el 2012 el uso de la PrEP en parejas serodiscordantes, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgenero, con la salvedad de que se necesitaban proyectos de demostración para determinar los mejores métodos de tratamiento (74). En la versión del 2014 de este documento la PrEP se recomienda exclusivamente para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (véase el apéndice 7).

Esta nueva recomendación sustituye a recomendaciones anteriores de la OMS sobre la PrEP y permite ofrecer la PrEP a personas que corren riesgo elevado de contraer el VIH, en lugar de restringir su recomendación a colectivos específicos. Esta nueva recomendación permitirá que un grupo de colectivos más diverso se beneficie de esta alternativa adicional de prevención. Asimismo, permite ofrecer la PrEP utilizando una valoración del riesgo individual y no con respecto a un grupo de riesgo; su objetivo es fomentar su aplicación cuando haya pruebas epidemiológicas a nivel local en relación con los factores de riesgo de contraer el VIH.

Se puede obtener más información sobre esta recomendación en las directrices de la OMS relativas a cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral y la profilaxis previa a la exposición en relación con el VIH (4). Véase el apéndice 7 para consultar el texto en el que se describe esta recomendación, que figura en la versión del 2014 de este documento.

#### Recomendaciones y orientaciones

NUEVO

##### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

La PrEP por vía oral (que contiene TDF) debe ofrecerse como alternativa adicional de prevención en los grupos de población clave que corren un gran riesgo de contraer el VIH, en el marco de una serie de métodos de prevención combinados (*recomendación firme, calidad alta de la evidencia*) (4).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

- Las intervenciones prioritarias para prevenir el VIH en las personas que consumen drogas inyectables se siguen basando en la disminución de daños, en particular los programas de distribución de agujas y jeringas y el tratamiento de sustitución de opioides (8).

### Lecturas recomendadas

- Apéndices 1, 2, 3 y 7 [en inglés].
- Orientaciones sobre profilaxis previa a la exposición (PrEP) por vía oral para parejas serodiscordantes, hombres y mujeres transgénero que mantienen relaciones sexuales con hombres con alto riesgo de contraer el VIH: recomendaciones de uso en el marco de proyectos de demostración. Ginebra, OMS, 2012. [en inglés]  
[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75188/1/9789241503884\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75188/1/9789241503884_eng.pdf).
- Información técnica actualizada sobre profilaxis previa a la exposición. Ginebra, OMS, 2015. [en inglés] <http://www.who.int/hiv/pub/prep/prep-technical-update-2015/en/>
- Directrices sobre el momento de inicio del tratamiento antirretroviral y sobre la profilaxis previa a la exposición en relación con el VIH. Ginebra, OMS, 2015. [en inglés]  
[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565\\_eng.pdf?ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565_eng.pdf?ua=1)
- La OMS amplía su recomendación sobre la profilaxis previa a la exposición oral en relación con la infección del VIH. Ginebra, OMS, 2015. [en inglés]  
<http://www.who.int/hiv/pub/prep/policy-brief-prep-2015/en/>

### 4.1.5.2 Profilaxis posterior a la exposición

#### Antecedentes y justificación

**La profilaxis posterior a la exposición es la única manera de reducir el riesgo de infección después de la exposición al VIH.**

La profilaxis posterior a la exposición (PEP) se administra para reducir la probabilidad de contraer VIH después de una posible exposición. A principios de los años noventa, comenzaron a recetarse medicamentos antirretrovirales como método de profilaxis tras la exposición laboral al VIH, práctica que se ha extendido a situaciones de exposición no laboral, como la que es producto de una agresión sexual. Otras exposiciones no laborales son las que surgen por compartir materiales

de inyección entre las personas que consumen drogas inyectables y la posible exposición mediante relaciones sexuales consensuadas (79). En la actualidad, la profilaxis posterior a la exposición es la única manera de reducir el riesgo de contraer la infección por el VIH de las personas que estuvieron expuestas al VIH. Por tanto, hay bastante acuerdo en que forma parte de la estrategia general de prevención (79).

Las directrices de la OMS sobre profilaxis posterior a la exposición para todos los grupos de población clave se actualizaron a fines del 2014. Las directrices actuales recomiendan que esta profilaxis tenga una duración de 28 días; la primera dosis debe tomarse cuanto antes y en un plazo de 72 horas después de la exposición. Hay una tendencia progresiva hacia la adopción de los esquemas de PEP mejor tolerados, a menudo compuestos por combinaciones de tres medicamentos antirretrovirales, como los análogos nucleotídicos y los inhibidores de la proteasa reforzados en formulaciones termoestables, administrados una vez al día. Más recientemente, se han considerado otras clases de medicamentos, como los análogos no nucleotídicos y los inhibidores de la integrasa. La orientación de la OMS sobre la PEP del 2014 detalla los esquemas actualizados para los adultos, los adolescentes y los niños.

**NUEVO**

A pesar de su corta duración, este tratamiento preventivo registra tasas de cumplimiento bajas, por lo que se recomienda complementar el tratamiento con asesoramiento y otras medidas que apoyen la adhesión terapéutica. Dado que la profilaxis posterior a la exposición no es completamente eficaz, es indispensable que las políticas hagan hincapié en la importancia de la prevención primaria y el asesoramiento sobre las medidas de prevención del riesgo en todos los entornos donde podría transmitirse el VIH (79).

Podría ser conveniente ofrecer profilaxis previa a la exposición después de la finalización del ciclo terapéutico de 28 días de profilaxis posterior a la exposición a las personas que mantienen un comportamiento de alto riesgo o que acuden repetidas veces para solicitar ciclos terapéuticos de profilaxis posterior.

La profilaxis posterior a la exposición debe estar al alcance de todas las personas de los grupos de población clave que reúnan los criterios para recibirla después de una posible exposición al VIH, si desean hacerlo.

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Se recomienda considerar la conveniencia de administrar profilaxis posterior a la exposición al VIH a las personas que acuden a los servicios de atención antes de transcurridas 72 horas de haber experimentado una agresión sexual. La decisión debe tomarse conjuntamente con la persona agredida para determinar si es apropiado administrar este tipo de profilaxis (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (80).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

La profilaxis posterior a la exposición debe estar al alcance de todas las personas reclusas en centros de detención y penitenciarios y otros entornos cerrados que pudieran estar expuestas al VIH. Es preciso formular directrices claras y comunicarlas a los reclusos, al personal de salud de la prisión y a otros empleados (9, 11).

## Consideraciones sobre la implementación

La intervención relativa a la profilaxis posterior a la exposición debe constar de una evaluación del riesgo de infección por el VIH y asesoramiento específico sobre el VIH (79).

Es esencial que las personas que reciban profilaxis posterior a la exposición dispongan de acceso a servicios integrales continuos, como el tratamiento y la atención de las personas en las que haya una seroconversión (79).

### Lecturas recomendadas

- *Guidelines on post-exposure prophylaxis (PEP) to prevent HIV infection*. Ginebra, OMS y OIT, 2007. [http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596374\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596374_eng.pdf)
- *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. Ginebra, OMS, 2013. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf)

### 4.1.5.3 Inicio temprano del tratamiento antirretroviral independientemente de la cifra de linfocitos CD4

#### Antecedentes y justificación

**La evidencia respalda el inicio temprano del tratamiento antirretroviral, independientemente de la cifra de linfocitos CD4, para prevenir la transmisión del VIH.**

La carga viral es el principal determinante del riesgo de transmisión del VIH. Cuando la persona presenta supresión viral (la carga viral es indetectable), el riesgo de transmisión del VIH se reduce significativamente. Cada vez es mayor la evidencia que confirma que el tratamiento antirretroviral puede reducir la transmisión del VIH al disminuir la carga viral. Estos datos respaldan el inicio temprano del tratamiento antirretroviral, independientemente de la cifra de linfocitos

CD4, para prevenir la transmisión del VIH (4).

Las nuevas directrices de la OMS sobre los antirretrovirales recomiendan iniciar el tratamiento antirretroviral independientemente de la cifra de linfocitos CD4 en todas las personas con VIH (4). El inicio temprano del TAR también se recomienda por razones clínicas, otorgando prioridad a las personas coinfectadas por el VIH y el virus de la hepatitis B que presenten una hepatopatía grave o tuberculosis activa

En las directrices unificadas de la OMS sobre el uso del TAR del 2015, se recomienda dar inicio al tratamiento antirretroviral en toda la población, incluidas las personas de los grupos de población clave.

La justificación para comenzar el TAR independientemente de la cifra de linfocitos CD4 a las personas de los grupos de población clave que tienen VIH es tanto por motivos operativos (aumentar el acceso al tratamiento antirretroviral de los grupos que actualmente tienen escaso acceso, vinculación deficiente y altos porcentajes de pérdida al seguimiento tras el diagnóstico) como para lograr el beneficio para la salud pública de disminuir la transmisión del VIH.

Aunque el tratamiento antirretroviral tiene un efecto preventivo considerable de la infección por el VIH, debe usarse en combinación con otras intervenciones biomédicas que reduzcan las prácticas que suponen riesgo de contraer el VIH o la probabilidad de transmisión del VIH por contacto, como los preservativos masculinos y femeninos, los programas de distribución de agujas y jeringas, el tratamiento de sustitución de opioides con metadona o buprenorfina y la circuncisión masculina médica voluntaria (4).

#### Recomendaciones y orientaciones

NUEVO

##### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Se recomienda comenzar a administrar el tratamiento antirretroviral a todas las personas que tienen VIH independientemente del estadio clínico según la clasificación de la OMS y de la cifra de linfocitos CD4, con prioridad en los siguientes grupos:

- Las personas que tienen VIH y tuberculosis activa (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*).
- Las personas coinfectadas con el VIH y el virus de la hepatitis B (VHB) que presentan un cuadro clínico de hepatopatía crónica grave (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*).
- Por razones programáticas y operativas, en particular en los entornos de epidemia generalizada, todas las mujeres durante el embarazo y la lactancia que tienen VIH deben recibir tratamiento antirretroviral de por vida (*recomendación condicional, calidad baja de la evidencia*) (4).
- Hay que ofrecer el tratamiento al miembro de una relación serodiscordante que tiene la infección por el VIH para reducir la transmisión del VIH a su pareja no infectada (*recomendación firme, calidad alta de la evidencia*) (4).

#### Lecturas recomendadas

- *Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre exposure prophylaxis for HIV*. OMS, Ginebra, septiembre del 2015. <http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/>

## 4.1.6 Circuncisión masculina médica voluntaria como método de prevención de la infección por el VIH

### Antecedentes y justificación

La circuncisión masculina médica reduce el riesgo de transmisión sexual del VIH de mujeres a hombres cerca del 60%.

Tres ensayos clínicos comparativos y aleatorizados realizados en África han aportado pruebas convincentes de que la circuncisión masculina médica reduce el riesgo de transmisión sexual del VIH de las mujeres a los hombres en aproximadamente un 60% (81, 82, 83). Por lo tanto, la OMS y el ONUSIDA recomiendan la circuncisión masculina médica voluntaria como otra intervención eficaz para prevenir la transmisión heterosexual del VIH, en particular en los entornos de epidemia generalizada (84). Los datos más

recientes de Uganda muestran que, en los cinco años desde que ese país finalizó el ensayo, se mantuvo la alta eficacia en los hombres circuncisos y el efecto protector contra la infección por el VIH fue del 73% (85).

La circuncisión masculina médica voluntaria no entraña riesgos cuando la realizan profesionales de la salud capacitados adecuadamente en entornos bien equipados. Los mensajes de salud sobre este tema deben estar adaptados cuidadosamente y tener presente el factor cultural, tomar expresiones del idioma y los símbolos locales, y ser apropiados para el nivel de escolaridad y la comprensión particulares de los grupos de población a los que se dirigen. Los mensajes deben estar dirigidos tanto a los hombres como a las mujeres (84).

#### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Se recomienda la circuncisión masculina médica voluntaria como otra estrategia importante de prevención de la infección por el VIH adquirida a través relaciones heterosexuales, en particular en entornos con epidemias hiperendémicas y generalizadas y prevalencia baja de la circuncisión masculina (84).
- La prestación de servicios de circuncisión masculina médica voluntaria debe servir de oportunidad para atender las necesidades de salud sexual de los hombres; estos servicios deben brindar asesoramiento activo y promover los comportamientos sexuales menos riesgosos (84).

### Recomendaciones y orientaciones

#### HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES

- No se recomienda la circuncisión masculina médica voluntaria como método de prevención de la transmisión del VIH a través de las relaciones sexuales entre hombres, dado que no se dispone de pruebas que confirmen que esta medida protege durante la relación anal receptiva (3).
- De todas formas, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres pueden beneficiarse de la circuncisión masculina médica voluntaria si también mantienen relaciones sexuales con mujeres. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no deben quedar excluidos de los servicios de circuncisión masculina médica voluntaria en los países del África oriental y meridional donde se ofrece esta intervención como medida de prevención de la infección por el VIH.

#### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

La circuncisión masculina médica voluntaria **no** es una de las intervenciones recomendadas como parte del conjunto de intervenciones para las personas recluidas. Si se ofrece a los hombres recluidos en prisión en algunos países prioritarios del África oriental y meridional en los que hay epidemia generalizada y tasas bajas de circuncisión masculina, es crucial practicarla respetando plenamente la ética médica y los principios de derechos humanos. Antes del procedimiento, es imprescindible obtener el consentimiento informado y garantizar la confidencialidad y la ausencia de coacción.

### TRABAJADORES SEXUALES

- Los mensajes de promoción de salud y el asesoramiento deben destacar que reanudar las relaciones sexuales antes de que esté completa la cicatrización de la herida puede aumentar el riesgo de contraer el VIH para los hombres seronegativos al VIH recientemente circuncidados y puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH a las compañeras de los hombres seropositivos al VIH recientemente sometidos a la intervención (84).
- Los “servicios de salud para hombres” que ofrecen la circuncisión masculina médica voluntaria a los clientes de trabajadores sexuales u otros hombres expuestos a un gran riesgo (como aquellos que se encuentran en relaciones serodiscordantes) podrían constituir un método prometedor en los países más prioritarios del África oriental y meridional para llegar a los hombres que están expuestos a un mayor riesgo de contraer la infección por el VIH. Sin embargo, no se ha examinado ni evaluado sistemáticamente este enfoque.

### PERSONAS TRANSGÉNERO

No se recomienda la circuncisión masculina médica voluntaria como método de prevención de la infección por el VIH en las mujeres transgénero (3).

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Los países con epidemias generalizadas o hiperendémicas de la infección por el VIH y prevalencia baja de la circuncisión masculina deben aumentar el acceso a los servicios de circuncisión masculina dando prioridad a los adolescentes y los hombres jóvenes (84).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### Consideraciones sobre la implementación

**Protección parcial.** La circuncisión masculina protege solo parcialmente contra la transmisión de la infección por el VIH de mujeres a hombres. Por consiguiente, es esencial no prestar los servicios de circuncisión masculina de manera aislada sino que como parte de un conjunto mínimo de intervenciones recomendadas que también incluya la entrega de información acerca de los riesgos y los beneficios del procedimiento, asesoramiento sobre las prácticas sexuales menos riesgosas, acceso a pruebas de detección del VIH, fomento del uso de preservativos y distribución de los mismos, y tratamiento de las ITS (84).

**Oportunidad para ampliar los servicios.** La incorporación y la ampliación de los servicios de circuncisión

### Lecturas recomendadas

- *Male circumcision for HIV prevention.* Ginebra, OMS, 2014  
<http://www.who.int/hiv/topics/malecircumcision/en/>
- *Clearinghouse on male circumcision for HIV prevention.* Research Triangle Park NC, USA, FHI360, 2014. <http://www.malecircumcision.org/>
- *New data on male circumcision and HIV prevention: policy and programme implications.* Ginebra, OMS, 2007. [http://libdoc.who.int/publications/2007/9789241595988\\_eng.pdf](http://libdoc.who.int/publications/2007/9789241595988_eng.pdf)

masculina médica voluntaria en los países más prioritarios del África oriental y meridional deben servir de oportunidad para llegar a todos los hombres con la atención de la infección por el VIH.

Las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente constituyen un primer paso esencial, pero cerca de la mitad de personas que tienen VIH desconocen su estado serológico.

## 4.2 Pruebas de detección del VIH y asesoramiento correspondiente

### Antecedentes y justificación

Las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente constituyen un primer paso esencial para que las personas con VIH reciban los servicios de prevención, tratamiento y atención de la infección por el VIH. Para los que obtienen un

resultado seronegativo, estas pruebas y el asesoramiento representan una importante oportunidad de ponerse en contacto con los programas de prevención primaria y promover la repetición posterior de la prueba de detección a quienes están en riesgo de contraer la infección (4).

Las prueba de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente a veces se usan como estrategias punitivas o coercitivas sobre los grupos de población clave, en particular sobre aquellos cuyo comportamiento está localmente tipificado como delito, pese a que esas intervenciones siempre deben ser de realización voluntaria y exenta de coacción, en particular por parte de los prestadores de atención de salud, las parejas, la familia, los clientes de trabajadores sexuales y dentro de una prisión u otro entorno cerrado (4, 8, 9, 10, 86). Como todos los servicios de pruebas y asesoramiento, los destinados a los grupos de población clave deben subrayar las 5 C definidas por la OMS [por las iniciales en inglés] —consentimiento, confidencialidad, asesoramiento (counselling), resultados correctos y vínculo con la atención (*care*) (87)— pero, en particular, el consentimiento y la confidencialidad.

Además, estos servicios deben formar parte de un programa integral de prevención, atención y tratamiento (4). Es importante que haya un vínculo claro y firme entre las pruebas de detección y los servicios de prevención, tratamiento y atención de la infección por el VIH para las personas que obtienen un resultado seropositivo, y con los servicios de prevención para los que obtienen un resultado seronegativo; la vinculación deficiente impide a las personas tomar decisiones respecto de los resultados. Las pruebas de detección del VIH realizadas a los grupos de población clave deben seguir los algoritmos de detección validados en el país donde se realicen, ser acordes a las estrategias de detección propuestas por la OMS y disponer de mecanismos apropiados para mejorar y garantizar la calidad (88).

Desconocimiento del estado con respecto a la infección por el VIH. Se calcula que, a nivel mundial, cerca de la mitad de las personas que actualmente tienen la infección por el VIH no saben que están infectadas (88). Entre las personas de los grupos de población clave, el acceso a las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente y, por lo tanto, al conocimiento sobre su estado con respecto a la infección suele ser mucho menor. Es frecuente que las personas de estos grupos tarden en hacerse pruebas de detección y no logren establecer el vínculo entre el diagnóstico y la atención y la evaluación para determinar el tratamiento antirretroviral apropiado (88). Por lo tanto, muchos comienzan el tratamiento cuando ya están muy inmunodeprimidos, cuando es más probable que los resultados del tratamiento no sean exitosos y en el caso de las embarazadas que acuden hacia el final de la atención prenatal o en el parto, es más probable que haya transmisión vertical del VIH (4).

El asesoramiento es un componente esencial de las pruebas de detección. El asesoramiento anterior a las pruebas de detección debe suministrar información exacta acerca de las pruebas y las implicaciones de un resultado positivo o negativo para que la persona haga una elección fundamentada. El asesoramiento posterior a la prueba debe ofrecer apoyo en cuanto a la revelación del estado con respecto a la infección por el VIH, entre otros servicios. Además, las pruebas de detección y el asesoramiento brindan una oportunidad valiosa de suministrar información exacta acerca de las actividades sexuales de menor riesgo y sobre la reducción de daños que sea pertinente para la persona que se realiza la prueba según el resultado obtenido. El cambio de comportamiento y el asesoramiento sobre la reducción de los riesgos también pueden ser valiosos.

Múltiples entornos. Con las pruebas rápidas de detección del VIH, el personal de salud puede informar a los pacientes de los resultados en el mismo día en que se realizan. Por lo tanto, es posible ofrecer las pruebas de detección y el asesoramiento en diversos entornos, como los establecimientos de atención primaria (por ejemplo, de salud materna, neonatal e infantil), y pueden realizarlas diversos prestadores, como los trabajadores

de sensibilización comunitaria.

Las pruebas de detección que se realizan en la comunidad y están vinculadas a la prevención, la atención y el tratamiento pueden llegar a número mayor de personas que las que se realizan en los establecimientos de salud, en particular a quienes tienen menos probabilidad de acudir a un establecimiento para someterse a la prueba y los que son asintomáticos (89). Es importante tener implantados procedimientos claros, que respeten las estrategias y los algoritmos nacionales de detección del VIH, para confirmar los resultados seropositivos y vincular a los pacientes con los servicios de tratamiento y atención de la infección por el VIH (9).

Las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente iniciados por el prestador apuntan a aumentar la cobertura donde estos servicios se ofrecen sistemáticamente en los entornos de atención de salud. Estas estrategias se recomiendan siempre que no sean obligatorias ni coercitivas y que estén vinculadas a los servicios de tratamiento y atención, de conformidad con las directrices de la OMS. Hay que prestar especial atención a suministrar información exacta; siempre debe obtenerse el consentimiento informado y los

Todas las pruebas de detección y el asesoramiento correspondiente deben ofrecerse de manera voluntaria y respetar las cinco C: el consentimiento, la confidencialidad, el asesoramiento (*counselling*), los resultados correctos y la vinculación con los servicios de atención, tratamiento y prevención. La garantía de la calidad tanto de las pruebas de detección como del asesoramiento conexo es esencial cualquiera sea el método que se emplee (4, 90).

resultados deben mantenerse en confidencialidad.

#### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Se recomienda ofrecer sistemáticamente las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente de manera voluntaria a todos los grupos de población clave, tanto en la comunidad como en servicios clínicos (3, 4, 8, 10, 86, 91).
- Se recomienda ofrecer a las personas de los grupos de población clave las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente dentro de la comunidad y garantizar la vinculación con los servicios de prevención, atención y tratamiento, además de las pruebas y el asesoramiento iniciados por el prestador (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*) (4).

#### *Observación complementaria*

Es recomendable ofrecer a las parejas estables y ocasionales estos servicios voluntarios junto con el apoyo para la revelación mutua de los resultados (92).

## Recomendaciones y orientaciones

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

Es importante proteger a las personas recluidas en centros penitenciarios de las consecuencias negativas que puedan surgirles por someterse a las pruebas de detección en prisión —por ejemplo, la segregación de los reclusos— y respetar su confidencialidad. También es importante que las personas que obtienen un resultado seropositivo tengan acceso a la atención de la infección por el VIH y se establezcan la vinculación necesaria con los servicios de atención y tratamiento (9, 93).

- Las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente deben ser voluntarias (93).
- La prueba rápida para detectar el VIH puede aumentar la probabilidad de que los reclusos reciban los resultados (93).
- Las pruebas de detección combinadas con otros servicios de reducción de prácticas de riesgo, como la entrega de preservativos con lubricantes y el tamizaje de las ITS, pueden aumentar los beneficios de las pruebas de detección y el asesoramiento (93).

## ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

En todos los entornos epidémicos, los servicios accesibles y aceptables de pruebas de detección del VIH y asesoramiento deben estar al alcance de los adolescentes y ser proporcionados de una manera que no los pongan en riesgo (86). Se insta a los países a que examinen sus políticas actuales sobre consentimiento y a que consideren la posibilidad de modificarlas para reducir los obstáculos relacionados con la edad que dificultan el acceso y la utilización de estos servicios y la vinculación con los servicios de prevención, tratamiento y atención de la infección por el VIH posteriores a la detección (86). Es esencial que la población joven pueda acceder a estos servicios sin necesidad de obtener el consentimiento paterno, materno o de un tutor, ni estar obligados a contar con su presencia para recibir asesoramiento o atención.

- Se recomienda ofrecer a los adolescentes de los grupos de población clave, sea cual sea el escenario epidemiológico (epidemias generalizadas, bajas y concentradas) las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento, y vincularlos con los servicios de prevención, tratamiento y atención (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (4, 86).
- Los adolescentes deben recibir asesoramiento acerca de los posibles beneficios y riesgos de revelar su estado con respecto a la infección por el VIH y obtener el empoderamiento y el apoyo necesarios para determinar cuándo, cómo y a quién revelarlo (*recomendación condicional, calidad muy baja de la evidencia*) (86).
- Los niños en edad escolar tienen el derecho de saber si son seropositivos al VIH (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*) (86).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### Consideraciones sobre la implementación

**Pruebas rápidas.** Las pruebas rápidas de diagnóstico del VIH en el lugar de la atención facilitan sobremedida el acceso, el retorno de los resultados en el mismo día y la derivación y el seguimiento apropiados (4).

**Suministro continuo.** Deben crearse los mecanismos para garantizar un suministro constante de estuches de prueba y evitar los desabastecimientos.

La **calidad** de los servicios determina la utilización de las pruebas de detección y el asesoramiento correspondiente. Por consiguiente, es fundamental instituir un sistema de garantía de la calidad a nivel nacional y subnacional, así como en los establecimientos de salud y en la comunidad (95).

Los **sistemas penitenciarios** deben formar parte de los esfuerzos nacionales para aumentar el acceso a las pruebas de detección y el asesoramiento correspondiente. La ampliación del alcance de estos servicios en las prisiones no debe emprenderse de manera aislada sino como parte de un programa integral contra la infección por el VIH encaminado a mejorar la atención de salud y lograr el acceso universal a los servicios de prevención en las prisiones y otros entornos cerrados (93).

**Pruebas de detección del VIH y asesoramiento para las parejas.** Son muchas las posibles ventajas que se derivan de apoyar a las parejas para que se sometan juntos a las pruebas de detección y se revelen mutuamente los resultados. Juntos pueden tomar decisiones fundamentadas acerca de la prevención y ofrecerse apoyo para recibir tratamiento con antirretrovirales y cumplir con este tratamiento. Estos servicios específicos para las parejas deben ofrecerse a todos, independientemente de cómo definan su relación. El principio —y la política— debe ser que los prestadores brinden apoyo y atención a todas las personas que mantienen una relación de tipo sexual para que se hagan pruebas de forma conjunta e, independientemente de su orientación sexual o la duración o naturaleza (estable u ocasional) de su relación.

La **autoadministración de la prueba de detección del VIH** es un procedimiento mediante el cual una persona que quiere conocer su estado con respecto a la infección por el VIH recoge una muestra, realiza una prueba e interpreta el resultado en privado. Se trata de una prueba de tamizaje que no define el diagnóstico (96), de manera que es necesario efectuar una prueba confirmatoria si el resultado inicial es positivo. El uso de las pruebas autoadministradas podría aumentar el número de personas que se hacen la prueba, conocen su estado

y, si obtienen un resultado seropositivo, comienzan un tratamiento. La OMS publicará directrices al respecto en el 2016 y en la actualidad alienta a los países a que lleven adelante pruebas piloto y proyectos de demostración a fin de determinar los enfoques eficaces para su implementación en los grupos de población clave.

Aunque los estuches de las pruebas autoadministradas del VIH quizá cuenten con la aprobación para la venta y el uso, muchos países no disponen de reglamentos formales ni políticas al respecto.

### Lecturas recomendadas

- *Consolidated Guidelines on HIV testing services*. Ginebra, OMS, 2015. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926\\_eng.pdf?ua=1&ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf?ua=1&ua=1) y *Supplement guidelines on HIV self-testing and partner notification*. Ginebra, OMS, 2016. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251655/1/9789241549868-eng.pdf?ua=1>
- *UNODC, WHO, UNAIDS. HIV testing and counselling in prisons and other closed settings*. Viena, UNODC, 2009. [http://www.who.int/hiv/pub/idu/tc\\_prison\\_tech\\_paper.pdf](http://www.who.int/hiv/pub/idu/tc_prison_tech_paper.pdf)
- *Delivering HIV test results and messages for re-testing and counselling in adults*. Ginebra, OMS, 2010. [http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599115\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599115_eng.pdf)
- *Service delivery approaches to HIV testing and counselling: a strategic policy framework*. Ginebra, OMS, 2010. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75206/1/9789241593877\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75206/1/9789241593877_eng.pdf)
- *Guidance on couples HIV testing and counselling and antiretroviral therapy for treatment and prevention in serodiscordant couples*. Ginebra, OMS, 2012. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44646/1/9789241501972\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44646/1/9789241501972_eng.pdf)
- *Report on the first International Symposium on Self-testing for HIV: the legal, ethical, gender, human rights and public health implications of HIV self-testing scale-up*. Ginebra, OMS, 2013. [http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85267/1/9789241505628\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85267/1/9789241505628_eng.pdf)
- *HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for policy-makers and managers*. Ginebra, OMS, 2013. [http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168_eng.pdf)

## 4.3 Vinculación e incorporación en la atención

Las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente solo constituyen el primer paso del proceso continuo que compone la atención de la infección por el VIH; el diagnóstico seropositivo sin una vinculación con los servicios de prevención, atención y tratamiento tiene beneficios escasos. Es necesario vincular a las personas con la atención clínica e incorporarlas en el sistema para que logren la plena salud y los beneficios de prevención del tratamiento con antirretrovirales. Por desgracia, se registran pérdidas sustanciales a cada paso de este proceso continuo, pérdidas que pueden ser particularmente considerables en el caso de las personas de los grupos de población clave.

**Obstáculos psicológicos y sociales.** Hay varios obstáculos psicológicos y sociales que dificultan la vinculación con la atención de las personas que acaban de recibir el diagnóstico de infección por el VIH. El estigma que perciben quienes asisten a consultorios especializados en el VIH sigue siendo un impedimento para que se incorporen en la atención apenas reciben el diagnóstico. La falta de apoyo familiar y el temor a revelar su situación con respecto al VIH también obstaculizan el acceso. Además, el modo en que las personas que tienen VIH perciben tanto su propia salud como la eficacia del tratamiento antirretroviral puede incidir en su voluntad para buscar atención clínica. Las personas que tienen VIH que creen que las terapias alternativas serán eficaces, que temen a los efectos colaterales del tratamiento antirretroviral, o que perciben que están sanos tienen menos probabilidades de incorporarse en la atención que quienes no tienen estas percepciones (99). Además, el consumo de drogas inyectables está asociado a la vinculación deficiente con la atención y una escasa retención (100, 101).

Se han evaluado varias intervenciones para abordar estos obstáculos psicosociales. Las estrategias de asesoramiento intensificado posterior a la prueba combinadas con asesoramiento de seguimiento a cargo de trabajadores de la salud de la comunidad aumenta significativamente la proporción de personas que se incorporan en la atención (102). Las personas que consumen drogas inyectables tienen mayores probabilidades de comenzar y permanecer en el tratamiento de la infección por el VIH si también están participando en programas de tratamiento de sustitución de opioides (103).

**Limitaciones económicas.** La migración en busca de oportunidades laborales (104) y la incapacidad para faltar al trabajo a fin de asistir a las citas médicas (105, 106) también puede inhibir la incorporación en la atención clínica del VIH.

Los **factores del sistema de salud** que influyen en la vinculación con la atención comprenden la confianza en la derivación pasiva como única estrategia, la dotación insuficiente de personal, las esperas prolongadas, el servicio deficiente ofrecido en consultorios especializados en el VIH y la mala actitud por parte de los trabajadores de la salud.

Es preciso tener en cuenta y abordar algunas cuestiones operativas esenciales para mejorar la vinculación con la atención, como mejores asociaciones entre la comunidad y los prestadores de atención de salud, y mayores esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios (véase capítulo 6).

## 4.4 Tratamiento y atención de la infección por el VIH

### 4.4.1 Tratamiento antirretroviral

#### Antecedentes y justificación

El tratamiento antirretroviral contra la infección por el VIH en los grupos de población clave debe seguir los mismos principios y las mismas recomendaciones generales que el tratamiento administrado a todos los demás adultos (4). Además, estos grupos deben gozar también del mismo acceso. Las personas de los grupos de población clave pueden sufrir discriminación y marginación, lo que puede impedir su acceso a la atención de salud, incluido el tratamiento contra el VIH. Es importante lograr que las personas de los grupos de población clave tengan un acceso equitativo al tratamiento y la atención de la infección por el VIH.

**Orientación actualizada.** La revisiones del 2013 y del 2015 de las directrices de la OMS sobre el tratamiento antirretroviral incluye nuevas recomendaciones sobre el momento en que se debe iniciar el tratamiento antirretroviral, los esquemas farmacológicos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea, y el seguimiento a las personas que están en tratamiento antirretroviral. Es preciso consultar estas directrices (4) para obtener una descripción detallada sobre el manejo de los tratamientos antirretrovirales.

Las personas de los grupos de población clave que tienen VIH deben tener el mismo acceso al tratamiento antirretroviral y la atención y el mismo manejo de los tratamientos antirretrovirales que otros grupos de la población.

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

#### Inicio del tratamiento antirretroviral

- Como estrategia prioritaria, se recomienda comenzar a administrar tratamiento antirretroviral a todas las personas con infección clínica por el VIH grave o avanzada (estadio clínico 3 o 4 en la clasificación de la OMS) y las personas cuya cifra de linfocitos CD4 sea de  $\leq 350$  linfocitos/mm<sup>3</sup> (*recomendación firme, calidad moderada de la evidencia*) (4).
- Se recomienda comenzar a administrar tratamiento antirretroviral a todas las personas que tengan VIH independientemente del estadio clínico en la OMS (*recomendación firme, calidad moderada de la evidencia*) (4).
- Se recomienda comenzar a administrar tratamiento antirretroviral a todas las personas que tienen VIH, independientemente del estadio clínico en la clasificación de la OMS y la cifra de linfocitos CD4, con prioridad en los siguientes grupos (4):
  - las personas que tienen VIH y tuberculosis activa (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*);
  - las personas coinfectadas por el VIH y el VHB que presenten un cuadro clínico de hepatopatía crónica grave (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*);
  - el miembro infectado por el VIH de las relaciones serodiscordantes, para reducir la transmisión del VIH a su pareja no infectada (*recomendación firme, calidad alta de la evidencia*);
  - las mujeres durante el embarazo y la lactancia (*recomendación firme, calidad moderada de la evidencia*).

#### Observación complementaria

No hay ninguna recomendación clínica especial sobre el tratamiento antirretroviral que sea específica para algún grupo de población clave. Sin embargo, debido al estigma, la discriminación y la marginación, es habitual que acudan tarde a solicitar tratamiento.

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- Es posible aumentar la adhesión al tratamiento de la infección por el VIH abordando el estigma y la discriminación que genera la infección, preservando la confidencialidad del estado con respecto a la infección por el VIH de los prisioneros y permitiendo a las personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados acceder a la atención y el tratamiento sin ser discriminados por los funcionarios penitenciarios.
- En caso de estar en proceso de transferencia a otro sitio, las personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados deben recibir un suministro de tratamiento antirretroviral que les dure hasta que reciban atención de salud en la nueva prisión o, si han quedado en libertad, hasta que se establezca la vinculación con la atención de la infección por el VIH en la comunidad (60, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114).

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

- Las orientaciones actuales de la OMS sobre el uso del tratamiento antirretroviral contra la infección por el VIH en los adultos y los adolescentes se aplican también a las personas que tienen VIH y que consumen drogas inyectables (4).
- Cuando se proporciona tratamiento antirretroviral en un entorno propicio, las personas que consumen drogas inyectables tienen resultados terapéuticos similares a los de los demás grupos (115).

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Los enfoques de atención con base en la comunidad pueden mejorar el cumplimiento terapéutico y la retención en la atención de los adolescentes que tienen VIH (86).

La capacitación de los trabajadores de salud puede contribuir a la adhesión al tratamiento y la retención en la atención de los adolescentes que tienen VIH (86).

Los prestadores de servicios de salud pueden fomentar la adhesión al tratamiento de los adolescentes de las siguientes formas:

- ayudándoles a explorar los factores que influyen en su cumplimiento;
- mejorando su comprensión sobre el VIH, el tratamiento antirretroviral y el cumplimiento terapéutico;
- reconociendo sus necesidades de desarrollo, pero apoyando su independencia emergente;
- ayudándolos a integrar el tratamiento antirretroviral en la vida cotidiana;
- ofreciéndoles esquemas simplificados de tratamiento antirretroviral;
- alentando su participación en grupos de apoyo de pares e intervenciones comunitarias (116, 117, 118).

### Consideraciones sobre la implementación

**Prestación de los servicios de tratamiento antirretroviral.** Las directrices unificadas de la OMS sobre el TAR del 2013 y la revisión del 2015 (4) ofrecen varias recomendaciones sobre la prestación de los servicios, como la descentralización de la atención relativa al tratamiento antirretroviral y su integración en otros servicios clínicos, como los de atención de la tuberculosis y atención prenatal y los servicios donde se brinda tratamiento de sustitución de opioides.

**Enfoques para apoyar la prestación del tratamiento antirretroviral, la retención en la atención y el cumplimiento terapéutico.** Las personas de los grupos de población clave a menudo se enfrentan con más obstáculos que otros grupos en el acceso a la atención y su continuidad del tratamiento. Es frecuente que resulte difícil localizarlas porque son móviles, tienen menos acceso a los servicios de salud en general y los usan menos, y pueden ser objeto de estigmatización y discriminación en los servicios de salud. En el capítulo 6 se describen diversos enfoques para mejorar el acceso, la retención y el cumplimiento terapéutico.

**Tratamiento antirretroviral en prisión y otros entornos cerrados.** El tratamiento de la infección por el VIH —compuesto por el tratamiento antirretroviral, la atención y el apoyo— que se brinda en las prisiones debe ser equivalente al que tienen a su alcance las personas que tienen VIH en la comunidad y debe respetar las directrices nacionales.

Las personas reclusas en prisión están expuestas al riesgo adicional de contraer tuberculosis. Sin embargo, con el apoyo adecuado y programas terapéuticos estructurados, pueden lograrse resultados excelentes en el entorno penitenciario (4, 9). Dadas las tasas elevadas de encarcelamiento que se observan en los grupos de población clave, hay que hacer todo lo posible para conseguir que dispongan de tratamiento antirretroviral (y tratamiento contra la tuberculosis) como parte de los servicios de salud penitenciarios (4, 9).

### Lecturas recomendadas

- *Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach.* Ginebra, OMS, 2013.  
[http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf)
- *Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV.* Ginebra, OMS, 2015. <http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/>
- *Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy.* Ginebra, OMS; 2014.  
[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/107130/1/9789241548731\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/107130/1/9789241548731_eng.pdf)

## 4.4.2 Prevención de la transmisión maternoinfantil

### Antecedentes y justificación

La prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH, también denominada "prevención de la transmisión vertical", comprende las intervenciones orientadas a prevenir la transmisión del VIH entre una madre infectada y su hijo durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto o durante la lactancia. La PTMI también se centra en el inicio temprano del tratamiento antirretroviral de la madre y la garantía de la salud de la madre.

La OMS recomienda un enfoque de cuatro vertientes que conforma una estrategia integral de PTMI:

1. prevención primaria de la infección por el VIH de las mujeres en edad fértil;
2. prevención de embarazos involuntarios en las mujeres que tienen VIH;
3. prevención de la transmisión del VIH de las mujeres que tienen VIH a sus bebés;
4. prestación del tratamiento, la atención y el apoyo apropiados a las madres que tienen VIH, sus hijos y su familia.

Las **intervenciones directas para prevenir la transmisión vertical consisten en una cascada de servicios.**

En la tercera vertiente, que se centra en emprender intervenciones directas para prevenir la transmisión vertical, los procedimientos preventivos constan de una gama de servicios, desde pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente, tratamiento antirretroviral, parto seguro, lactancia más segura, intervenciones puerperales en el contexto del tratamiento antirretroviral continuo,

diagnóstico temprano de los lactantes y diagnóstico definitivo de los lactantes expuestos al VIH, hasta la vinculación de la madre y el niño con la atención y el tratamiento apropiados (vertiente 4).

Todas las embarazadas de los grupos de población clave deben tener el mismo acceso a los servicios de PTMI y seguir las mismas recomendaciones que las mujeres de otros grupos de la población.

### Recomendaciones y orientaciones

#### TODAS LAS EMBARAZADAS<sup>1</sup> DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Se recomienda comenzar a administrar un tratamiento de tres antirretrovirales (ARV) a todas las mujeres durante el embarazo y la lactancia que tengan VIH y mantener este tratamiento al menos mientras se mantenga el riesgo de transmisión maternoinfantil. Las mujeres que reúnan los criterios de selección del tratamiento deben seguir con el tratamiento antirretroviral durante toda la vida (CD4 <500 linfocitos/mm<sup>3</sup>) (*recomendación firme, calidad moderada de la evidencia*) (4).
- Por motivos programáticos y operativos, en particular en los entornos de epidemia generalizada, se recomienda comenzar a administrar el tratamiento antirretroviral a todas las mujeres durante el embarazo y la lactancia que tengan VIH y mantener este tratamiento durante toda la vida (opción B+) (*recomendación condicional, calidad baja de la evidencia*) (4).

<sup>1</sup> Se incluye en este grupo el embarazo de los hombres transgénero.

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

Todas las embarazadas y su familia afectada por los trastornos ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas deben tener acceso a servicios asequibles de prevención y tratamiento, así como a intervenciones suministradas con una atención especial a la confidencialidad, la legislación nacional y las normas de derechos humanos internacionales; las mujeres no deben quedar excluidas de la atención de salud debido al consumo de sustancias psicoactivas (119).

### Consideraciones sobre la implementación

**Equidad y superación de los obstáculos que impiden el acceso.** En la mayoría de los países, las mujeres de los grupos de población clave tienen menos acceso a la PTMI que las mujeres de la población general. En particular, tienen menos acceso las personas que consumen drogas inyectables y sus parejas, y los trabajadores sexuales. Además, las adolescentes en general y las adolescentes de los grupos de población clave en particular tienen menos acceso a las intervenciones de PTMI y presentan peores resultados. Es preciso realizar esfuerzos especiales para comprender y superar los obstáculos que impiden el acceso y para prestar servicios aceptables que lleguen a las mujeres adolescentes y adultas de los grupos de población clave.

**Consulta tardía.** Las mujeres adolescentes y adultas de los grupos de población clave con frecuencia solicitan atención prenatal cuando el embarazo ya está bastante avanzado o llegan al servicio ya en trabajo de parto, sin haber recibido ningún tipo de atención prenatal, por lo que el acceso que obtienen a las intervenciones de PTMI es muy tardío. Además, a menudo afrontan retos especiales en cuanto al seguimiento y las intervenciones continuas durante el puerperio. Esta situación tiene consecuencias adversas para su propia salud y la de sus hijos, y reduce la eficacia de las intervenciones de PTMI. Es preciso elaborar estrategias para promover y fomentar la atención prenatal más temprana de las embarazadas de los grupos de población clave.

**Apoyo a la adhesión al tratamiento.** Es necesario poner especial empeño e instituir iniciativas especiales para optimizar el acceso a la atención y la adhesión al tratamiento por parte de las mujeres de los grupos de población clave y fomentar una vinculación eficaz con el tratamiento a largo plazo. Esta necesidad es especialmente importante durante la lactancia materna, período durante el cual el seguimiento suele ser deficiente.

### Lecturas recomendadas

- *Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach.* Ginebra, OMS, 2013. [http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf)
- *Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV.* Ginebra, OMS, 2015. <http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/>
- *Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy.* Ginebra, OMS, 2014. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/107130/1/9789241548731\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/107130/1/9789241548731_eng.pdf)

### 4.4.3 Interacciones medicamentosas del tratamiento antirretroviral

#### Antecedentes y justificación

Las **interacciones medicamentosas posibles** añaden complejidad para la prescripción de los medicamentos antirretrovirales y el seguimiento de sus efectos clínicos.

Los prestadores deben estar al tanto de todos los medicamentos que están tomando las personas que tienen VIH cuando comienzan el tratamiento antirretroviral y las nuevas sustancias que se agreguen durante el tratamiento continuo. En el caso de muchas personas de los grupos de población clave, estas sustancias pueden incluir drogas, medicamentos contra las coinfecciones y las comorbilidades y, en las personas

transgénero, hormonas sexuales. Las interacciones medicamentosas posibles añaden complejidad a la prescripción de los medicamentos antirretrovirales y al seguimiento del tratamiento. El asesoramiento sobre las posibles consecuencias de las interacciones medicamentosas y un entorno que promueve y facilita que el paciente informe acerca de los medicamentos y las drogas concomitantes son componentes fundamentales de la atención de alta calidad de todas las personas con VIH.

#### Tuberculosis

Las directrices de la OMS sobre el tratamiento contra la tuberculosis examinan consideraciones esenciales sobre el control de la coinfección con tuberculosis y VIH (120). Una combinación medicamentosa importante que está contraindicada es la rifampicina junto con inhibidores de la proteasa (IP). Cuando las personas coinfectadas con tuberculosis y VIH están recibiendo un IP reforzado, puede reemplazarse la rifampicina con rifabutin. Si no se dispone de rifabutin, solo puede administrarse lopinavir/ritonavir (LPV/R) de manera concomitante durante el tratamiento contra la tuberculosis, a condición de que se aumente la dosis de ritonavir o se duplique la dosis ordinaria de LPV/R.

#### Hepatitis C

La ribavirina y el interferón pegilado alfa-2a suelen administrarse conjuntamente para tratar la infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC). La administración de estos medicamentos junto con zidovudina (AZT) ha estado asociada a un mayor riesgo de anemia y descompensación hepática. Es probable que, para las personas coinfectadas por el VHC y el VIH que están en tratamiento con AZT, sea necesario reemplazarla con tenofovir (TDF) (121).

#### Hormonas anticonceptivas

Los medicamentos antirretrovirales pueden reducir o aumentar la biodisponibilidad de las hormonas esteroideas contenidas en los anticonceptivos hormonales (122). Algunos datos indican la posibilidad de interacciones medicamentosas entre las hormonas anticonceptivas y muchos medicamentos antirretrovirales (en particular, algunos inhibidores no nucleotídicos de la transcriptasa inversa [INNTI] y los IP reforzados con ritonavir [RTV]). Estas interacciones pueden alterar la seguridad y la eficacia tanto del anticonceptivo hormonal como la del medicamento antirretroviral. Sin embargo, las directrices actuales de la OMS sobre la anticoncepción establecen que ninguna de las interacciones medicamentosas entre los antirretrovirales recomendados actualmente como tratamiento y profilaxis previa a la exposición, por una parte y, por otra, los anticonceptivos hormonales son de suficiente significación para desaconsejar su uso concomitante (122). Si las mujeres que reciben tratamiento antirretroviral deciden comenzar a usar anticonceptivos hormonales o seguir usándolos, se recomienda que utilicen preservativos en todas las relaciones sexuales tanto para prevenir la transmisión del VIH como para compensar cualquier posible disminución de la eficacia de la anticoncepción hormonal.

#### Hormonas que integran los protocolos de tratamiento hormonal para las mujeres y los hombres transgénero

Son limitados los datos sobre las interacciones entre los antirretrovirales y una variedad de otros medicamentos que integran los protocolos de tratamiento hormonal para las mujeres transgénero, en particular con antiandrógenos (por ejemplo, el acetato de ciproterona y la flutamida). Lo mismo sucede con los andrógenos (por ejemplo, la dihidrotestosterona) que suelen utilizar los hombres transgénero. Hasta hoy no se ha documentado ninguna interacción medicamentosa entre estos medicamentos y los antirretrovirales. Sin embargo, este tema merece más investigación, dado que las mujeres y los hombres transgénero suelen utilizar varios medicamentos

combinados y a veces en dosis altas, lo que puede generar interacciones medicamentosas multidireccionales. Entretanto, como el tratamiento antirretroviral puede provocar fluctuaciones hormonales a las mujeres transgénero que toman medicamentos como tratamiento de afirmación del género, se recomienda un control estrecho.

Por otra parte, algunos medicamentos antirretrovirales pueden potenciar las alteraciones metabólicas de la glucosa y de los lípidos asociadas a alteraciones hormonales así como aumentar el riesgo de episodios tromboembólicos y toxicidad hepática (123). Todos estos riesgos son aún mayores debido a la práctica frecuente de automedicación, que a menudo incluye productos y dosis que son menos seguros que los que suelen prescribir los prestadores de salud. También son necesarias más investigaciones sobre estas cuestiones.

### Opioides

La OMS recomienda el tratamiento con metadona y buprenorfina para tratar la dependencia de los opioides (50). La administración concomitante de efavirenz (EFV) disminuye las concentraciones de metadona, lo que podría causar síntomas de abstinencia y aumentar el riesgo de recaída. Es necesario realizar un control minucioso de las personas que reciben metadona y EFV, y ajustar la dosis de metadona de quienes presenten síntomas de abstinencia (50).

Los escasos datos científicos sobre las interacciones no indican que haya alguna entre los antirretrovirales y las drogas, pero las interacciones entre las drogas pueden ser peligrosas. Por ejemplo, el consumo concomitante de nitrito de amilo (inhalantes) y sildenafil pueden causar complicaciones cardiovasculares.

## Cuadro 4.1 Importantes interacciones medicamentosas con los antirretrovirales y sustituciones que se sugieren

Medicamento antirretroviral	Interacciones importantes	Sugerencias de sustituciones
AZT	Ribavirina e interferón pegilado alfa-2a	De primera línea: reemplazar el AZT con TDF De segunda línea: reemplazar el AZT con estavudina (d4T)
IP reforzados (ATV/r, DRV/r, LPV/R)	Rifampicina Anticoncepción hormonal con estrógenos Metadona y buprenorfina	Reemplazar la rifampicina con rifabutina <sup>1</sup> Recomendar el uso adicional de preservativos masculinos o femeninos Ajustar las dosis de metadona y buprenorfina según corresponda
Efavirenz (EFV)	Metadona Anticoncepción hormonal con estrógenos	Ajustar la dosis de metadona según corresponda Recomendar el uso adicional de preservativos masculinos o femeninos
Nevirapina	Rifampicina Anticoncepción hormonal con estrógenos	Reemplazar la nevirapina con EFV Recomendar el uso adicional de preservativos masculinos o femeninos

### Lecturas recomendadas

- *HIV-drug interactions*. The University of Liverpool. <http://www.hiv-druginteractions.org/>
- Policy Brief Transgender people and HIV. Ginebra, OMS, 2015. <http://www.who.int/hiv/pub/transgender/transgender-hiv-policy/en/>

<sup>1</sup> Si no hay rifabutina, solo puede usarse LPV/R, a condición de que se aumente la dosis del ritonavir o se duplique la dosis ordinaria de LPV/R.

## 4.5 Prevención y tratamiento de las coinfecciones y las comorbilidades

Una parte esencial del tratamiento y la atención de infección por el VIH es el manejo de las infecciones oportunistas como la tuberculosis y las hepatitis virales. Abordar el VIH eficazmente también requiere ocuparse de otras comorbilidades, como otras infecciones de transmisión sexual transmitidas por la sangre y los trastornos de salud mental. Para lograr sinergia entre las estrategias de prevención y de control, es apropiado buscar oportunidades para combinar los servicios de pruebas de detección del VIH, tratamiento y prevención con los de estas coinfecciones y comorbilidades.

### 4.5.1 Tuberculosis

#### Antecedentes y justificación

A pesar de ser prevenible y curable, la tuberculosis es la principal causa de mortalidad asociada al VIH, dado que representa una de cada cinco defunciones relacionadas con el VIH. El riesgo de contraer tuberculosis es 30 veces mayor en las personas que tienen VIH que en las personas que no están infectadas (124). En el 2012, había aproximadamente 1,1 millones de casos de tuberculosis en los 35 millones de personas con VIH en todo el mundo (124). Independiente de su estado con respecto a la infección por el VIH, los grupos de población clave, en particular las personas que consumen drogas inyectables y las personas reclusas, están expuestos a un riesgo mayor de contraer tuberculosis, incluida la tuberculosis multirresistente (50, 125, 126, 127, 128). Además, se han notificado brotes de tuberculosis y tuberculosis multirresistente en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y en los trabajadores sexuales que son transgénero (129, 130). Los factores de riesgo y los determinantes sociales habituales que exponen a los grupos de población clave a un riesgo mayor de padecer tuberculosis comprenden la infección por el VIH, la pobreza, la desnutrición, el estrés, el alcoholismo, el tabaquismo, la diabetes, la contaminación del aire en entornos cerrados, el consumo de drogas, el encarcelamiento y las condiciones de vida y de trabajo desfavorables (131).

La **tuberculosis es prevenible y tratable, pero representa una de cada cinco defunciones relacionadas con el VIH.**

Las prisiones constituyen un factor fundamental para las epidemias de tuberculosis y tuberculosis multirresistente, y se cree que la tuberculosis es la principal causa de muerte en las personas reclusas en entornos que presentan una carga de enfermedad alta (132, 133). De manera similar, otros entornos de reunión a los que suelen acudir las personas que tienen VIH y los grupos marginados pueden exponerlos a un

riesgo mayor de padecer tuberculosis si no se tienen instauradas medidas adecuadas de control de infección. Entre estos entornos se cuentan los burdeles, los bares, los centros de acogida, las clínicas de tratamiento de adicciones, los establecimientos de salud y los albergues (130, 134, 135, 136).

Para abordar el problema de la tuberculosis en las personas con VIH, incluidos los grupos de población clave, la OMS recomienda un conjunto de doce actividades conjuntas contra la tuberculosis y la infección por el VIH cuyo objetivo es establecer y fortalecer los mecanismos de prestación de servicios integrados contra la tuberculosis y la infección por el VIH, reducir la carga de enfermedad de la tuberculosis en las personas que tienen VIH y reducir la carga de enfermedad del VIH en los pacientes con tuberculosis (4, 65, 137, 138, 139).

Es preciso abordar los obstáculos que impiden el acceso a la prevención y la atención de los grupos de población clave para garantizar el acceso a servicios integrados centrados en el paciente, preferentemente en el punto inicial de atención, y para promover la adhesión al tratamiento (65).

**Prevención de la tuberculosis.** La administración concomitante de tratamiento preventivo con isoniazida y tratamiento antirretroviral puede disminuir hasta un 97% el riesgo de contraer tuberculosis en las personas que tienen VIH (140). Se ha demostrado que, administrado solo, el tratamiento preventivo con isoniazida disminuye un 68% el riesgo de tuberculosis en las personas que tienen VIH (137). Una vez descartada la tuberculosis activa, es conveniente ofrecer a estas personas al menos seis meses de tratamiento preventivo con isoniazida y apoyo para garantizar el cumplimiento terapéutico. Además, es esencial instaurar medidas apropiadas para controlar la tuberculosis y localizar a los contactos para reducir la transmisión de la tuberculosis en los entornos de reunión (50, 125).

**Tamizaje y diagnóstico de la tuberculosis.** Todas las personas que tienen VIH deben someterse a un tamizaje regular que siga el algoritmo de los cuatro síntomas de tuberculosis recomendado por la OMS —o sea, tos en el

momento actual, fiebre, sudores nocturnos o pérdida de peso— en cada contacto con un profesional de salud (137). Este tamizaje ayuda a determinar si la persona reúne los criterios para el tratamiento preventivo con isoniazida porque descarta la probabilidad de que padezca tuberculosis activa y permite individualizar a quienes necesitan evaluación, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, según corresponda. La OMS recomienda comenzar realizando la prueba de diagnóstico Xpert MTB/RIF a todas las personas que tienen VIH y a toda persona que presente un cuadro clínico presuntivo de tuberculosis multirresistente (independientemente de su estado con respecto a la infección por el VIH) (141). Los interesados directos que prestan apoyo a los grupos de población clave pueden ofrecer vías de acceso a la detección temprana de la tuberculosis y la prevención oportuna, así como al tratamiento de ambas infecciones (tuberculosis y VIH). Es crucial, por consiguiente, que los miembros del personal reconozcan los síntomas de la tuberculosis.

**Tratamiento contra la tuberculosis.** El tratamiento contra la tuberculosis consta de un esquema estandarizado de antibióticos que debe tomarse durante al menos seis meses, independientemente del estado con respecto a la infección por el VIH. La finalización del tratamiento contra la tuberculosis es fundamental para reducir la mortalidad y evitar la aparición y la propagación de la tuberculosis farmacorresistente. Asimismo, es esencial crear un entorno propicio, libre de prejuicios y discriminación, que permita a las personas de los grupos de población clave finalizar el tratamiento, les facilite otras medidas de apoyo para garantizar su cumplimiento terapéutico y mejorar los resultados del tratamiento, y disminuya el riesgo de transmisión continua de la enfermedad (65).

**El inicio oportuno del tratamiento antirretroviral** reduce significativamente el riesgo de muerte a causa de la tuberculosis asociada al VIH. Dado que la tuberculosis es una de las enfermedades definitorias de sida más frecuentes, es prioritario ofrecer a todas las personas que presenten tuberculosis presunta o confirmada las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente, de manera que quienes obtengan un resultado positivo puedan comenzar el tratamiento antirretroviral cuanto antes, a más tardar ocho semanas después de haber comenzado el tratamiento contra la tuberculosis, independientemente de la cifra de linfocitos CD4.

Los programas que atienden a los grupos de población clave deben garantizar el acceso a servicios integrados centrados en el paciente, preferentemente en el primer lugar de atención (punto de entrada), entre los que se incluya la detección, la prevención y el tratamiento de la tuberculosis, y el apoyo para garantizar el cumplimiento terapéutico (65).

Los grupos de población clave deben gozar del mismo acceso a los servicios de prevención, detección y tratamiento de la tuberculosis que las personas de otros grupos de población en riesgo de contraer el VIH o que tengan VIH (138).

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Se recomienda ofrecer la realización de las pruebas de detección del VIH de rutina a todas las personas que presentan tuberculosis presunta o confirmada (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*) (138).
- Se recomienda administrar tratamiento antirretroviral a todas las personas que tengan VIH y que presenten tuberculosis activa, independientemente del estadio clínico según la clasificación de la OMS y de la cifra de linfocitos CD4 (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*) (4).

### Observaciones complementarias

- El tratamiento antirretroviral debe iniciarse cuanto antes, a más tardar ocho semanas después del inicio del tratamiento contra la tuberculosis (4).
- El alcoholismo, el consumo activo de drogas y los trastornos de salud mental no deben usarse como excusas para negar el tratamiento contra la tuberculosis (65).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- Se recomienda considerar la realización de tamizaje sistemático de la tuberculosis activa en las prisiones y otros entornos cerrados (124). El tamizaje debe ser prioritario en los países donde es alta la prevalencia de la tuberculosis en la población general o los habitantes de las prisiones; donde es alta la tasa de encarcelamiento; donde es alta la prevalencia del VIH o la tuberculosis multirresistente; y donde las condiciones de vida son desfavorables.
- Se recomienda realizar a todas las personas recluidas en prisión, al momento de su ingreso en prisión y de allí en adelante, un examen médico que incluya el tamizaje de la tuberculosis y respete las normas internacionalmente aceptadas sobre la confidencialidad y la atención médicas (65).
- Las personas recluidas en prisión deben tener acceso a una atención equivalente a la proporcionada a la población general (65).
- Dado el alto riesgo de transmisión de la tuberculosis y las tasas elevadas de comorbilidad entre el VIH y la tuberculosis en los entornos cerrados, todas las prisiones deben emprender una búsqueda intensificada de casos, proporcionar tratamiento preventivo con isoniazida a las personas que tienen VIH e instituir medidas eficaces de control de la tuberculosis (65).
- Para prevenir la tuberculosis en las prisiones, es esencial mejorar las condiciones de vida limitando el número de prisioneros por celda y proporcionando ventilación y nutrición adecuadas (65).
- Se recomienda separar (en un entorno clínico) de las demás personas a las personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados con diagnóstico confirmado o presuntivo de tuberculosis infecciosa hasta que reciban el tratamiento adecuado y se demuestre que ya no son contagiosas (65).
- Las actividades de educación para todos los prisioneros deben instruirlos sobre las normas de comportamiento al toser y la higiene respiratoria (11).
- La continuidad del tratamiento contra la tuberculosis en las prisiones y otros entornos cerrados es esencial para prevenir la aparición de resistencia, por lo que debe garantizarse en todas las etapas de la detención, también durante la transferencia entre establecimientos penitenciarios y después de la liberación. Por lo tanto, es fundamental la estrecha colaboración entre los servicios de salud que prestan atención a la población general y los que cuidan a los detenidos, los prisioneros y otras personas recluidas (11).

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

- Las personas con tuberculosis que consumen drogas inyectables deben tener un acceso equitativo al tratamiento contra la tuberculosis (50).
- La comorbilidad, como con la infección por hepatitis virales, no debe contraindicar el tratamiento contra la tuberculosis para las personas que consumen drogas inyectables sino que debe administrarse adecuadamente (65).
- El tratamiento de sustitución de opioides debe administrarse a los pacientes con tuberculosis conjuntamente con el tratamiento médico; no hay ninguna necesidad de esperar a que logren superar la dependencia de los opioides para comenzar el tratamiento antirretroviral o contra la tuberculosis (50).
- La rifampicina, uno de los medicamentos de primera línea para tratar la tuberculosis, puede reducir significativamente la concentración y el efecto de la metadona y la buprenorfina, lo que podría ocasionar síntomas de abstinencia de opioides (142, 143, 144) (véase la sección 4.4.3).

## TRABAJADORES SEXUALES

Los programas clínicos y los servicios de extensión comunitaria destinados a los trabajadores sexuales pueden llevar a cabo el tamizaje de la tuberculosis y brindarles el apoyo necesario durante todo el ciclo de la atención, desde la prevención hasta el diagnóstico y el tratamiento. Pueden enseñar a los trabajadores sexuales a reconocer los síntomas de la enfermedad y entender las formas en que se transmite la infección, así como apreciar la importancia del control de las infecciones y las normas de comportamiento al toser. Además, los trabajadores sexuales pueden informar a sus clientes acerca de los establecimientos de salud cercanos que ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis (71).

### Consideraciones sobre la implementación

**Colaboración.** Es esencial que los programas contra la tuberculosis y la infección por el VIH, los servicios sociales, los servicios de farmacoterapia y los servicios de salud penitenciarios colaboren en cuanto a las derivaciones y los servicios destinados a las personas de los grupos de población clave para garantizar el acceso a programas integrales de prevención, tratamiento y atención de la tuberculosis y la infección por el VIH de una manera holística, centrada en la persona —en un solo sitio, si fuera posible— que potencie al máximo el acceso y el cumplimiento terapéutico (65).

**Capacitación.** Los trabajadores de salud (incluidas las personas de la comunidad que ayudan con el tratamiento y la prevención) que atienden a los grupos de población clave deben recibir capacitación específica que les permita ofrecer una atención de calidad contra la tuberculosis y la infección por el VIH a las personas de los grupos de población clave. El personal, incluido el personal penitenciario, también debe saber cómo protegerse de la exposición laboral a la tuberculosis y la infección por el VIH (65).

**Control de la infección por tuberculosis.** Todos los establecimientos de atención de salud y otros entornos de reunión deben tener instaurado un plan de control de la tuberculosis (con preferencia, como parte del plan general de control de infecciones), que cuente con el respaldo de todos los interesados directos y abarque medidas administrativas, ambientales y de protección personal para reducir la transmisión de la tuberculosis y vigilar la tuberculosis en los trabajadores (65).

Los servicios ordinarios de tratamiento contra la tuberculosis deben ser accesibles y receptivos a las necesidades de los grupos de población clave (65).

### Lecturas recomendadas

- WHO, UNODC, UNAIDS. *Policy guidelines for collaborative TB and HIV services for injecting and other drug users – an integrated approach*. Ginebra, OMS, 2008.  
[http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596930\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596930_eng.pdf)
- *Integrating collaborative TB and HIV services within a comprehensive package of care for people who inject drugs. Consolidated guidelines*. Ginebra, OMS, 2015.  
[http://www.who.int/tb/publications/integrating-collaborative-tb-and-hiv\\_services\\_for\\_pwid/en/](http://www.who.int/tb/publications/integrating-collaborative-tb-and-hiv_services_for_pwid/en/)
- *WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders*. Ginebra, OMS, 2012.  
[http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503006\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503006_eng.pdf)
- *Guidelines for intensified tuberculosis case finding and isoniazid preventive therapy for people living with HIV in resource-constrained settings*. Ginebra, OMS, 2011.  
[http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241500708\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241500708_eng.pdf)

## 4.5.2 Hepatitis virales

### Antecedentes y justificación

Un enfoque integral para abordar las hepatitis virales en los grupos de población clave comprende combinar la prevención, el tamizaje, la vacunación contra el VHB y el tratamiento y la atención.

Las hepatitis virales B y C afectan a los grupos de población clave desproporcionadamente debido a la transmisión sexual y el intercambio de agujas, jeringas y otros materiales de inyección.

Se calcula que, a nivel mundial, hay 240 millones de personas que tienen una infección crónica por VHB y más de 185 millones de personas infectadas por el VHC.<sup>1,2</sup> Las personas que consumen drogas inyectables representan aproximadamente 1,1 millones de quienes están infectados por el VHB y 10 millones de aquellos infectados con el VHC (145).

En todo el mundo, la infección crónica por VHB afecta a alrededor del 5 al 20% y el VHC afecta del 5 al 15% de los 35 millones de personas que tienen el VIH. La carga de coinfección es mayor en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en Asia sudoriental y, en cuanto a la infección por el VHB, en particular en el África meridional. Las personas que tienen VIH y coinfección con el VHB o el VHC presentan un avance más acelerado de la hepatopatía y una mortalidad mayor que la asociada al VHB o al VHC en las personas no infectadas por el VIH.

Las tasas de seroprevalencia del VHC en las prisiones son incluso mayores que las tasas de la infección por el VIH, y en muchos países los antecedentes de infección por el VHC están asociados a antecedentes de encarcelamiento (146, 147, 148, 149, 150).

Un enfoque integral para abordar las hepatitis virales en los grupos de población clave consiste en combinar la prevención, el tamizaje, la vacunación contra el VHB y el tratamiento y la atención de las personas coinfectadas con VIH y VHB o VHC (4).

### Prevención de las hepatitis B y C

Las principales vías de transmisión de las hepatitis virales son las inyecciones u otros procedimientos médicos con material no estéril, las transfusiones de sangre contaminada, las relaciones sexuales sin protección y las prácticas de inyección poco seguras (39, 61, 149, 151, 152, 153). Es infrecuente que el VHC se transmita a través de las relaciones heterosexuales. Durante el último decenio, sin embargo, se han notificado varios brotes de infección por VHC de presunta transmisión sexual entre hombres seropositivos al VIH que tienen relaciones sexuales con hombres. También se ha notificado una transmisión similar del VHC entre los hombres seronegativos al VIH que tienen relaciones sexuales con hombres y un comportamiento relacionado con la droga (154).

Dado que las vías de transmisión de las hepatitis virales se superponen a las del VIH, muchas intervenciones que previenen la infección por el VIH también previenen la transmisión del VHB y el VHC. Algunos ejemplos son el uso correcto y sistemático de preservativos, los programas de distribución de agujas y jeringas, el tratamiento de sustitución de opioides y las prácticas de tatuaje con materiales estériles.

### Vacuna contra el virus de la hepatitis B

La vacuna contra el VHB es inocua, eficaz y de un costo bastante bajo. La mayoría de los países tienen instaurados programas específicos y generales de vacunación contra el VHB, como aquellos dirigidos a los lactantes, la vacunación de puesta al día y las campañas dirigidas a personas de grupos de población clave con prácticas de riesgo o en situaciones de vulnerabilidad, que son las personas que consumen drogas inyectables, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las parejas sexuales de las personas que tienen VIH, las personas recluidas en prisión y otras, así como quienes reciben transfusiones de hemoderivados y los trabajadores de salud. Hacia el año 2012, 181 países ya habían incorporado la vacuna contra el VHB en su calendario nacional como parte del programa nacional de vacunación de los lactantes (155). Alrededor del 79% de la cohorte nacida en el 2012 en todo el mundo recibió tres dosis de la vacuna contra el VHB (156).

Las implicaciones para los programas nacionales de vacunación contra el VHB es que la vacunación contra el VHB de los grupos de alto riesgo será menos crucial con el transcurso del tiempo a medida que cada vez más personas reciban la vacuna durante sus primeros años de vida y, por ende, estén inmunizadas (39).

<sup>1</sup> Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection. Ginebra, OMS, 2015.

<sup>2</sup> Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection. Ginebra, OMS, 2014.

Actualmente no hay ninguna vacuna contra el VHC. En consecuencia, es mucho más importante redoblar los esfuerzos actuales para prevenir la transmisión del VHC en las personas de los grupos de población clave (39).

### Tratamiento de las hepatitis B y C

Es importante controlar la coinfección del VIH con el VHB o el VHC apropiadamente. La coinfección con el VIH y el VHC acelera la progresión de la fibrosis hepática relacionada con el VHC y deriva en una tasa más alta de hepatopatía terminal y mortalidad (121, 151, 157).

Los grupos de población clave deben tener el mismo acceso a los servicios de prevención, detección y tratamiento de las hepatitis B y C que las personas de otros grupos de población en riesgo de contraer la infección por el VIH o ya infectadas.

### Recomendaciones y orientación

#### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

##### Hepatitis B

- Se recomienda instituir estrategias de vacunación de puesta al día contra la hepatitis B en los entornos donde la inmunización de los lactantes no ha alcanzado la cobertura completa (3, 10, 32).
- Se recomienda ofrecer tratamiento antirretroviral con una combinación de tenofovir (TDF) y lamivudina (3TC) (o emtricitabina [FTC]) a las personas de grupos de población clave coinfectadas por el VIH y el VHB que presentan hepatopatía crónica grave independientemente de la cifra de linfocitos CD4 y el estadio clínico según la clasificación de la OMS (recomendación firme, calidad baja de la evidencia) (4).<sup>1</sup>

##### Hepatitis C

- Se recomienda ofrecer la realización de análisis serológicos para detectar el VHC a las personas de los grupos de población clave que tienen una alta prevalencia de la infección por el VHC o que tienen antecedentes personales de exposición o comportamientos que los exponen al riesgo de contraer el VHC (recomendación firme, calidad moderada de la evidencia) (158).
- Se recomienda realizar una evaluación sobre la ingesta de alcohol a todas las personas infectadas por el VHC y ofrecer una intervención sobre el comportamiento para ayudarlas a reducirla si presentan una ingesta de alcohol moderada a alta (recomendación firme, calidad moderada de la evidencia) (158).
- Se recomienda evaluar a todos los adultos y niños que presentan infección crónica por el VHC, incluidas las personas que consumen drogas inyectables, para determinar si administrarles tratamiento antiviral (recomendación firme, calidad moderada de la evidencia) (158).
- Además, se ofrecen varias recomendaciones sobre el diagnóstico y los esquemas de tratamiento antiviral contra el VHC (158).

##### Observaciones complementarias

- Se han publicado nuevas directrices sobre el tratamiento de la hepatitis B y las estrategias de detección de las hepatitis B y C en el 2014 y el 2015.
- Las directrices de la OMS sobre el VHC proporcionan orientaciones detalladas acerca del tratamiento y la atención (158).
- El diagnóstico y el tratamiento de la infección activa por el VHC plantean algunos problemas en determinados segmentos de la población, como las personas que consumen drogas inyectables, en particular en entornos donde hay escaso acceso a los análisis de anticuerpos y del ARN del VHC, los métodos de diagnóstico para estadificar la hepatopatía y el tratamiento de la infección por el VHC. Es preciso vigilar estrechamente a las personas que reciben tratamiento antirretroviral y medicamentos contra la infección por el VHC para detectar las posibles interacciones medicamentosas (158, 159).

NUEVO

<sup>1</sup> La evidencia es insuficiente o el perfil de beneficios en función de los riesgos es poco favorable para respaldar el inicio del tratamiento antirretroviral a todas las personas coinfectadas con el VIH y el VHB que presentan una cifra de linfocitos CD4 >500 linfocitos/mm<sup>3</sup> o independientemente del número de linfocitos CD4 o el estadio clínico según la clasificación de la OMS. Por lo tanto, solo se recomienda comenzar el tratamiento antirretroviral independientemente de la cifra de CD4 a las personas que presentan un cuadro clínico de hepatopatía grave crónica, que corren mayor riesgo de progresión y mortalidad por hepatopatía. En cuanto a las personas que no presentan este cuadro clínico, el inicio del tratamiento antirretroviral debe seguir los principios y las recomendaciones definidos para los demás adultos.

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- Es importante que las prisiones ofrezcan vacunación contra la hepatitis B (50, 60).
- Es importante ofrecer a las personas que tienen VIH, poco después de su ingreso en la prisión, la realización voluntaria de las pruebas para detectar el VHC y el VHB, así como el tratamiento y la atención de estas infecciones, además de la evaluación para determinar si deben recibir tratamiento y, en ese caso, administrarlo de acuerdo con las actuales recomendaciones de la OMS. También se recomienda ofrecer a los prisioneros medidas de reducción de los daños.

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

Además del conjunto integral de nueve intervenciones destinadas a reducir los daños de las personas que consumen drogas inyectables (8), entre las que se destacan los programas de distribución de agujas y jeringas y el tratamiento de sustitución de opioides, que son las dos más importantes, algunas otras recomendaciones específicas son las siguientes:

- ofrecer el esquema rápido de vacunación contra la hepatitis B a las personas que consumen drogas inyectables (39);
- ofrecer jeringas con escaso espacio muerto a través de los programas de distribución de agujas y jeringas (39);
- ofrecer intervenciones a cargo de pares para reducir la transmisión de las hepatitis virales en las personas que consumen drogas inyectables (39).

Asimismo, es importante considerar las siguientes cuestiones:

- Para el esquema rápido, la vacuna contra el VHB debe contener una dosis mayor.<sup>1</sup>
- Si no se dispone del esquema rápido de vacunación, debe ofrecerse el esquema ordinario.
- Tanto para los esquemas ordinarios como los rápidos, la prioridad es suministrar la primera dosis.
- Para reducir la transmisión de las hepatitis virales, los programas de distribución de agujas y jeringas deben ofrecer todos los tipos de jeringas y demás materiales que sean necesarios para preparar drogas inyectables, como las ollas, el agua estéril, los hisopos impregnados de alcohol, los filtros y los torniquetes, según corresponda a las necesidades locales.

## Consideraciones sobre la implementación

**Oportunidades desaprovechadas.** Es frecuente que se desaprovechen las oportunidades de vacunar a las personas que consumen drogas inyectables porque tienen un acceso limitado o se rehúsan a vacunarse (160). Ofrecer incentivos a estas personas y un acceso cómodo puede aumentar la captación y el cumplimiento del calendario de vacunación contra el VHB (87, 152). Sin embargo, la vacunación, aunque sea parcial, también confiere algún grado de inmunoprotección (89). La decisión sobre la conveniencia de ofrecer incentivos depende de la aceptabilidad y los recursos locales (161).

**Inmunodepresión.** Las personas que tienen VIH y que recibieron tratamiento insuficiente y aquellas que presentan la infección crónica por el VHC pueden tener suprimida la respuesta inmunitaria, de manera que probablemente les resulte más beneficioso el esquema ordinario de vacunación contra el VHB que el rápido (39).

<sup>1</sup> El esquema ordinario de vacunación de los lactantes y de los adultos no vacunados se realiza en los meses 0, 1 y 6, mientras que el esquema rápido se realiza en los días 1, 7 y 21 (39).

### Lecturas recomendadas

- *Hepatitis B, Fact sheet N° 204*. Ginebra, OMS, 2014. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/>
- *Hepatitis C, Fact sheet N°164*. Ginebra, OMS, 2014. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/>
- *Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection*. Ginebra, OMS, 2014. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/111747/1/9789241548755\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/111747/1/9789241548755_eng.pdf)
- *Guidance on prevention of viral hepatitis B and C among people who inject drugs*. Ginebra, OMS, 2012. [http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75357/1/9789241504041\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75357/1/9789241504041_eng.pdf)
- *Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis b infection*. Ginebra, OMS, 2015. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154590/1/9789241549059\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154590/1/9789241549059_eng.pdf)

### 4.5.3 Salud mental

#### Antecedentes y justificación

Las personas con VIH —incluidas aquellas de los grupos de población clave— y sus familias y cuidadores pueden presentar una amplia gama de necesidades de salud mental. Algunas comorbilidades frecuentes son la depresión y la ansiedad. La demencia y otros trastornos cognoscitivos también están asociados a la infección por el VIH más prolongada. Los entornos de atención de la infección por el VIH pueden brindar una oportunidad para detectar y tratar los problemas de salud mental de las personas que tienen VIH, incluidos los problemas de salud mental preexistentes.

Las personas de los grupos de población clave pueden enfrentar la doble carga de los problemas de salud mental asociados a la infección por el VIH y los resultantes de la marginación, la discriminación y el estigma.

Además de soportar una carga desproporcionada por el VIH, los grupos de población clave experimentan tasas más altas de depresión, ansiedad, tabaquismo, consumo nocivo de alcohol y alcoholismo, consumo de otras sustancias psicoactivas y suicidio como resultado del estrés crónico, el aislamiento social, la violencia y la desconexión de una variedad de servicios de salud y de apoyo (3).

Los estudios indican que los trastornos de salud mental de las personas con VIH pueden dificultar el inicio del tratamiento y el cumplimiento terapéutico, lo que deriva en resultados

terapéuticos deficientes (162). La presencia de comorbilidades de salud mental puede influir en la adhesión al tratamiento con antirretrovirales a causa de olvido o mala organización, escasa motivación o incomprensión de los planes terapéuticos. El apoyo psicosocial, el asesoramiento, las farmacoterapias apropiadas y algunas intervenciones, como la atención médica integral, pueden ayudar a mejorar el cumplimiento del tratamiento con antirretrovirales y la retención en la atención (4). La publicación de la OMS *Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada* formula recomendaciones relacionadas con la atención de salud mental general que pueden ser pertinentes para las personas que tienen VIH, incluidas aquellas de los grupos de población clave (4, 46).

**Adolescentes de los grupos de población clave.** Las comorbilidades de salud mental de los adolescentes generan gran preocupación. El suicidio es una de las principales causas de muerte de los adolescentes en todo el mundo; los trastornos depresivos unipolares y la autoagresión son las principales causas de la pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en los adolescentes de 10 a 19 años (163). Los adolescentes de los grupos de población clave pueden sufrir aislamiento social, acoso y discriminación, lo que aumenta su vulnerabilidad a las comorbilidades de salud mental, el sufrimiento emocional y el autoestigma.

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Se recomienda ofrecer detección y tratamiento sistemáticos de los trastornos de salud mental (en particular de la depresión y el estrés psicosocial) a las personas de los grupos de población clave que tengan VIH para optimizar los resultados en materia de salud y mejorar el cumplimiento del tratamiento con antirretrovirales. El tratamiento de estos trastornos puede comprender desde psicoterapia orientada a la infección por el VIH y la depresión hasta tratamientos farmacológicos apropiados (4).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Los grupos de apoyo con pares y los espacios seguros pueden ayudar a mejorar la autoestima y abordar el autoestigma. Además, la psicoterapia individual y familiar puede abordar las comorbilidades de salud mental de los adolescentes. La participación positiva de los padres o tutores puede ser beneficiosa, sobre todo para los adolescentes que deben recibir tratamiento y atención continuos. Sin embargo, es importante obtener el permiso explícito del adolescente antes de comunicarse con los padres o cuidadores (86).

## Consideraciones sobre la implementación

Los servicios integrados e integrales ofrecen oportunidades para aplicar intervenciones de prevención, atención y tratamiento centradas en el paciente para los múltiples problemas de salud emocional y mental que afectan a los grupos de población clave. Además, los servicios integrados aumentan la probabilidad de mejorar la comunicación entre los diferentes prestadores que brindan servicios a los grupos de población clave, lo que a su vez redundará en una mejor atención (39).

### Lecturas recomendadas

- *Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada*. Ginebra, OMS, 2011.  
[http://www.who.int/publications/guidelines/mhGAP\\_intervention\\_guide/es/](http://www.who.int/publications/guidelines/mhGAP_intervention_guide/es/)

## 4.6 Atención general

### 4.6.1 Nutrición

#### Antecedentes y justificación

Es necesario y factible fomentar la **colaboración** entre los programas nacionales relacionados con el VIH y los programas nacionales existentes de apoyo nutricional.

El aporte energético bajo combinado con una mayor exigencia de energía a causa de la infección por el VIH y las infecciones o enfermedades relacionadas suele provocar adelgazamiento y desgaste físico. Además, las alteraciones del metabolismo, la falta de apetito y las enfermedades diarreicas pueden disminuir la ingesta y la absorción de nutrientes, lo que también puede ocasionar pérdidas nutricionales (164). Estos efectos quizá estén magnificados en los contextos de ingresos bajos donde no hay seguridad alimentaria, como la que padecen muchos grupos de población clave. A su vez, las carencias nutricionales pueden acelerar la progresión de

la enfermedad por el VIH; el bajo índice de masa corporal (IMC) de los adultos (IMC inferior a 18,5 kg/m<sup>2</sup>) es un factor de riesgo independiente de la progresión de la infección por el VIH y la mortalidad (4).

Es necesario y factible fomentar la colaboración entre los programas relacionados con el VIH y los programas nacionales existentes de apoyo nutricional para lograr resultados óptimos en materia de salud en los entornos que carecen de seguridad alimentaria. Es recomendable considerar la prestación de apoyo nutricional a las personas de los grupos de población clave que tengan VIH y vivan en circunstancias de inseguridad alimentaria (4). El tratamiento antirretroviral combinado con el apoyo nutricional podría acelerar la recuperación.

En la actualidad, la OMS está formulando recomendaciones acerca de la atención y el apoyo nutricional para los adolescentes y los adultos infectados por el VIH.

NUEVO

### Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

#### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

La nutrición inadecuada que padecen muchas personas recluidas en prisión es un problema fundamental que puede tener repercusiones significativas sobre las personas infectadas por el VIH o la tuberculosis, dado que pone en peligro los resultados del tratamiento y el cumplimiento terapéutico. La protección y la promoción de la salud de las personas recluidas en prisión y otros entornos cerrados deben tener en cuenta la nutrición adecuada, incluido el acceso a agua potable y a suplementos nutricionales (11).

## 4.6.2 Intervenciones relativas a la salud sexual y reproductiva

Los prestadores de atención de salud a menudo pasan por alto la salud sexual y reproductiva de las personas que tienen VIH.

Los miembros de los grupos de población clave, independientemente de que tengan VIH o no, tienen derecho a disfrutar de una vida sexual plena y placentera, y a acceder a diversas opciones reproductivas. Las mujeres de los grupos de población clave deben gozar de los mismos derechos a la salud reproductiva que todas las demás mujeres; es importante que tengan acceso a la planificación familiar y otros servicios de salud reproductiva, como la prevención, la detección y el tratamiento del cáncer del aparato reproductor (32). Muchas mujeres de los grupos de población clave no solo se preocupan

por el VIH y las ITS sino también por otros problemas de salud reproductiva. Sin embargo, los prestadores de atención de salud a menudo pasan por alto la salud sexual y reproductiva de las personas con VIH.

### 4.6.2.1 Prevención, detección y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual

#### Antecedentes y justificación

A nivel mundial, las ITS representan una de las principales causas de enfermedad aguda, esterilidad, discapacidad a largo plazo y muerte. Además, varias ITS propician la transmisión sexual de la infección por el VIH (165).

Las ITS, en particular las que generan úlceras genitales, aumentan la sensibilidad a la infección por el VIH tanto de los hombres como de las mujeres. Además, las ITS agudas son un marcador importante del comportamiento sexual riesgoso y del riesgo de transmisión del VIH. Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales y las personas transgénero suelen estar expuestos a un riesgo mayor de tener ITS.

Por lo tanto, es importante ofrecer tratamiento clínico de las ITS a las personas de los grupos de población clave que las padecen, de conformidad con las directrices vigentes de la OMS (138). A falta de análisis de laboratorio, cabe administrar tratamiento sintomático. Los análisis de laboratorio y el tratamiento siempre deben ofrecerse de manera voluntaria y exenta de coacción. Dado que la mayoría de los casos de ITS son asintomáticos, en particular los de las mujeres, es fundamental que los grupos de población clave tengan acceso a los programas de tamizaje de las ITS.

Se están actualizando las directrices de la OMS sobre las ITS y se las publicará en el 2016.

EN ELABORACIÓN

Se recomienda ofrecer de forma rutinaria servicios de tamizaje, diagnóstico y tratamiento de las ITS como parte del programa integral de prevención y atención del VIH para los grupos de población clave (4).

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- El tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento de las ITS son un componente fundamental de la respuesta integral al VIH, lo que incluye los servicios para los grupos de población clave (4). El tratamiento de las ITS debe ser acorde a las directrices vigentes de la OMS y estar adaptado al contexto nacional (166). Además, debe ser confidencial y libre de coacción, y los pacientes deben dar su consentimiento informado para recibir tratamiento (32, 166).
- Se recomienda efectuar el tamizaje periódico de las ITS asintomáticas a las personas de los grupos de población clave (*recomendación condicional, calidad baja de la evidencia*) (4, 10).
- A falta de análisis de laboratorio, se recomienda administrar tratamiento sintomático a las personas sintomáticas de los grupos de población clave de conformidad con las directrices nacionales de tratamiento de las ITS (166).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

Los prestadores de servicios de salud deben mantenerse en alerta para controlar y tratar las ITS en las personas que consumen drogas inyectables. Estas personas también pueden ser trabajadores sexuales, y los hombres que consumen drogas inyectables pueden tener relaciones sexuales con otros hombres, por lo que están expuestos a un riesgo mayor de contraer alguna ITS (153, 167).

### TRABAJADORES SEXUALES

- Sugerimos ofrecer tratamiento periódico presuntivo para las ITS asintomáticas a los trabajadores sexuales en entornos de alta prevalencia y donde los servicios clínicos son limitados (*recomendación condicional, calidad moderada a alta de la evidencia*).
- El tratamiento periódico presuntivo debe emplearse solo como medida a corto plazo y ofrecerse de manera gratuita, voluntaria y confidencial como parte de los servicios integrales de salud sexual y mientras los servicios para el VIH y las ITS están en desarrollo en entornos de alta prevalencia de las ITS, por ejemplo, donde la prevalencia de *N. gonorrhoeae* o *C. trachomatis* sea  $> 15\%$  (10).

### PERSONAS TRANSGÉNERO

Los prestadores de atención de salud deben ser sensibles a las necesidades específicas de salud de las personas transgénero y conocerlas en profundidad. Estas personas pueden sentirse incómodas o alterarse, en particular durante el examen genital y la recogida de muestras independientemente de que se hayan sometido a cirugía plástica genital (32).

## Consideraciones sobre la implementación

A continuación se indican algunas estrategias que podrían aumentar las tasas de detección y tratamiento de las ITS (3):

- Los servicios ordinarios de tratamiento de las ITS deben ser accesibles y receptivos a las necesidades de los grupos de población clave.
- En los entornos donde los grupos de población clave están en gran parte marginalizados, se recomienda instaurar servicios específicos, como la extensión comunitaria y el apoyo de pares.

- Es recomendable establecer vías de derivación activa, e integrar los programas de tamizaje y detección con otros servicios que utilicen los grupos de población clave.
- Es conveniente que los servicios de diagnóstico y tratamiento de las ITS estén ubicados en el mismo sitio que los servicios relativos a la infección por el VIH que utilizan las personas de los grupos de población clave.

Las prisiones y otros entornos cerrados deben ofrecer las pruebas de detección de las ITS y el tratamiento relacionado de manera voluntaria y confidencial, y garantizar la obtención del consentimiento informado del paciente. Si no fuera posible prestar la atención adecuada dentro de las prisiones, es fundamental que las personas allí recluidas puedan obtener servicios de salud fuera de la prisión (11).

### Lecturas recomendadas

- *Guidelines for the management of sexually transmitted infections*. Ginebra, OMS, 2004. <http://www.who.int/hiv/pub/sti/pub6/en/>
- *Training modules for the syndromic management of sexually transmitted infections*. Ginebra, OMS, 2007. <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241593407/en/index.html>
- OMS, UNPA, ONUSIDA, NSW, World Bank. *Implementación de programas integrales de VIH/iTS con personas trabajadoras del sexo: enfoques prácticos basados en intervenciones colaborativas*. (Capítulo 4). Ginebra, OMS, 2015. [http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/1176025/9789243506180\\_spa.pdf?sequence=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/1176025/9789243506180_spa.pdf?sequence=1)
- UNFPA, MSMGF, UNDP, WHO, USAID, PEPFAR, World Bank *Implementing Comprehensive HIV and STI programmes with men who have sex with men. Practical guidance for collaborative interventions*. <http://aidsetc.org/resource/implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-men-who-have-sex-men-practical-guidance>

#### 4.6.2.2 Servicios de anticoncepción

##### Antecedentes y justificación

**Es importante** que los prestadores de atención de salud recomienden enfáticamente la protección doble.

La anticoncepción es un servicio importante para los grupos de población clave que suele pasarse por alto (32). Es importante que los prestadores de atención de salud recomienden enfáticamente la protección doble a todas las personas expuestas a un riesgo significativo de contraer el VIH, ya sea mediante el uso de preservativos y otros métodos simultáneamente o el uso uniforme y correcto de preservativos solos (122).

La actualización completa de las directrices de la OMS sobre la anticoncepción se encuentra actualmente en marcha y se prevé su finalización en el 2015.

Los integrantes de los grupos de población clave, incluidas las personas que tienen VIH, tienen derecho a disfrutar de una vida sexual plena y placentera, y a acceder a diversas opciones reproductivas (32, 122).

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Es importante que los servicios de anticoncepción sean gratuitos, voluntarios y no coercitivos para todas las personas de los grupos de población clave.

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

Es importante que los servicios de salud penitenciarios ofrezcan métodos anticonceptivos a las mujeres que viven en entornos cerrados (9, 169, 170, 171, 172).

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

Es importante que los prestadores de atención de salud que están en contacto con mujeres que consumen drogas les ofrezcan métodos anticonceptivos, como los anticonceptivos hormonales, como parte del conjunto ordinario de servicios.

### TRABAJADORES SEXUALES

Es fundamental recomendar a las mujeres expuestas a un gran riesgo de contraer el VIH, incluidas las trabajadoras sexuales, que estén comenzando a usar anticonceptivos hormonales o ya los usen que siempre utilicen preservativos masculinos o femeninos y otras medidas preventivas contra la infección por el VIH debido a que la evidencia indica, aunque no de manera concluyente, que podrían correr mayor riesgo de contraer el VIH cuando utilizan anticonceptivos inyectables que solo contienen progestágeno (4, 168).

#### Observaciones complementarias

Se recomienda ofrecer asesoramiento sobre anticoncepción a las trabajadoras sexuales para explorar su intención de quedar embarazadas y ofrecerles diversas opciones de anticoncepción, incluida la protección doble.

### PERSONAS TRANSGÉNERO

- Es importante advertir a las mujeres transgénero que usan anticonceptivos orales como método de feminización que corren mayor riesgo de sufrir episodios trombo-embólicos si toman etinil-estradiol que si utilizan de 17-beta estradiol.
- Hay que considerar la conveniencia de ofrecer a los hombres transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres opciones anticonceptivas apropiadas que no provoquen una feminización sistémica no deseada.

#### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Para satisfacer las necesidades educativas y de servicio de los adolescentes, se recomienda prestarles servicios de salud sexual y reproductiva en los que se ofrezca información sobre los métodos anticonceptivos y servicios de anticoncepción, sin necesidad de autorización ni notificación paterna, materna ni de un tutor (173).
- Para actuar en beneficio de los adolescentes, los servicios de salud deberían priorizar sus necesidades inmediatas de salud sin dejar de estar atentos a los signos de vulnerabilidad, abuso y explotación. La derivación confidencial a un profesional apropiado, en caso de que así lo solicite el adolescente, puede proporcionar una vinculación con otros servicios y sectores de apoyo (73).

#### Lecturas recomendadas

- *Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services: guidance and recommendations*. Ginebra, OMS, 2014.  
[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748_eng.pdf)
- *Medical eligibility criteria for contraceptive use: fourth edition*. Ginebra, OMS, 2010.  
[http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563888\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563888_eng.pdf)  
En proceso de ser actualizada, se prevé que la próxima edición saldrá en el 2015.

#### 4.6.2.3 Aborto sin riesgos y atención posterior al aborto

Las leyes y los servicios relativos al aborto deben proteger la salud y los derechos humanos de todas las mujeres, incluidas aquellas de los grupos de población clave.

#### Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

##### TODAS LAS MUJERES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- En los países donde el aborto es legal, es importante vincular a las mujeres con los servicios de aborto sin riesgos.
- En los países donde el aborto es ilegal, quizá sea frecuente que los abortos se practiquen en condiciones riesgosas y representen graves riesgos para la salud. Las mujeres de los grupos de población clave deben recibir información acerca de estos riesgos (174).
- El acceso a la atención posterior al aborto apropiada es esencial para reducir la morbilidad y la mortalidad.

##### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Es probable que las adolescentes desistan de solicitar servicios de salud si piensan se les pedirá el permiso de sus padres o tutores; esta situación puede aumentar la probabilidad de que acudan a personas que realizan abortos en condiciones riesgosas (174).

## Consideración sobre la implementación

**Servicios de aborto sin riesgos.** En la medida en que lo permita la ley, todas las mujeres deben tener acceso fácil y asequible a servicios de aborto sin riesgos, lo que significa que los servicios deben ofrecerse en el nivel de atención primaria y deben estar instaurados sistemas de derivación a todos los niveles superiores de atención que sean necesarios.

### Lecturas recomendadas

- *Safe abortion: technical and policy guidance for health systems.* Ginebra, OMS, 2012.  
[http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe\\_abortion/9789241548434/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/)

#### 4.6.2.4 Detección y tratamiento del cáncer cervicouterino

La detección y el tratamiento del cáncer cervicouterino se realizan para detectar el cáncer y los cambios en el cuello uterino que son precursores del cáncer para tratarlos adecuadamente. Las mujeres que tienen VIH están expuestas a un riesgo mayor de contraer la infección por el virus del papiloma humano (VPH) y presentar tumores relacionados con el VPH, como la neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o 3 (NIC 2 y NIC 3) y el carcinoma de cérvix invasor (175). Se ha notificado que, cuanto mayor es la inmunodepresión, más alta es la prevalencia del VPH y la neoplasia intraepitelial cervical (176, 177).

Es importante ofrecer servicios de tamizaje del cáncer cervicouterino a todas las mujeres de los grupos de población clave y a los hombres transgénero, si corresponde, como se indica en las directrices de la OMS del 2013 sobre el tamizaje para el cáncer cervicouterino (178).

## Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

### TODAS LAS MUJERES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

En las regiones que presentan tasas altas de infección endémica por el VIH, es importante ofrecer servicios de tamizaje para el cáncer cervicouterino a las adolescentes y las mujeres sexualmente activas apenas obtengan un resultado positivo en la prueba de detección del VIH (178).

### PERSONAS TRANSGÉNERO

Es necesario considerar algunas cuestiones específicas de los hombres transgénero (178):

- Los hombres transgénero que conservan los genitales femeninos no suelen someterse al tamizaje del cáncer cervicouterino y otros servicios de salud sexual porque quizá no lo soliciten o queden excluidos de esos servicios. En consecuencia, están expuestos a un riesgo mayor de padecer enfermedades ováricas, uterinas y del cuello uterino.
- Después de la histerectomía completa, si hay antecedentes de displasia cervical o cáncer cervicouterino de grado alto, es posible efectuar la prueba anual de Papanicolaou del muñón vaginal hasta que se comprueben tres resultados normales y luego repetir la prueba cada dos a tres años.
- Cuando se extraen los ovarios, pero se conservan intactos el útero y el cuello uterino, se deben seguir las directrices de la OMS sobre el tamizaje del cáncer cervicouterino de las mujeres asignadas con sexo femenino al nacer. Es posible retrasar el tamizaje si el hombre transgénero no tiene antecedentes de actividad sexual genital. Es importante informar al anatomopatólogo acerca del uso actual o previo de testosterona, dado que la atrofia del cuello uterino puede simular displasia.

#### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- La vacunación contra el VPH no reemplaza el tamizaje del cáncer cervicouterino. En los países donde se ha incorporado la vacuna contra el VPH, podría ser necesario formular programas de tamizaje o fortalecerlos (179).
- La OMS recomienda administrar la vacuna contra el VPH a las niñas de 9 a 13 años que todavía no están sexualmente activas, grupo en el que también se incluye a aquellas que tienen VIH (179).

#### 4.6.2.5 Tamizaje del cáncer anal

Las personas que tienen VIH están expuestas a un riesgo al menos 20 veces mayor de presentar cáncer anal que las personas no infectadas (180). Al igual que el cáncer cervicouterino, el cáncer anal está asociado al virus del papiloma humano (VPH). El tamizaje puede realizarse para detectar el cáncer anal y las lesiones precursoras, que son las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado (LEIAG) del ano, en particular en los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero y otras personas de los grupos de población clave que tienen mayores probabilidades de mantener relaciones sexuales por vía anal.

#### Lecturas recomendadas

- *WHO guidelines for screening and treatment of precancerous lesions for cervical cancer prevention.* Ginebra, OMS, 2013. [http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/screening\\_and\\_treatment\\_of\\_precancerous\\_lesions/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/screening_and_treatment_of_precancerous_lesions/en/)

#### 4.6.2.6 Concepción y embarazo

Es importante que todas las mujeres de los grupos de población clave tengan el mismo apoyo y acceso a los servicios relacionados con la concepción y la atención prenatal que las mujeres de otros grupos, como se indica en las directrices de la OMS.

#### Recomendaciones relacionadas y problemas contextuales para cada grupo de población clave

##### TODAS LAS MUJERES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- De acuerdo con las directrices de la OMS, todas las mujeres adultas y adolescentes de los grupos de población clave que tienen VIH y están embarazadas deben recibir el tratamiento y la atención apropiados para prevenir la transmisión vertical del VIH (4).
- Las mujeres que tienen VIH y aquellas que tienen una pareja serodiscordante y desean tener hijos deben recibir información y apoyo para ayudarlas a concebir con la mayor seguridad posible.
- Muchas mujeres de los grupos de población clave, en particular las adolescentes, tienen acceso inadecuado a la atención prenatal, acuden a los servicios al final del embarazo y tienen menos acceso a los servicios de PTMI (véase la sección 4.4.2).



# ELEMENTOS FACILITADORES FUNDAMENTALES

# 5

5.1	Derecho y políticas .....	75
5.1.1	Obstáculos jurídicos .....	75
5.1.2	Elementos facilitadores fundamentales .....	76
5.2	Estigma y discriminación .....	82
5.2.1	Obstáculos .....	82
5.2.2	Elementos facilitadores fundamentales .....	82
5.3	Empoderamiento de la comunidad .....	85
5.3.1	Obstáculos .....	85
5.3.2	Elementos facilitadores fundamentales .....	85
5.4	Violencia .....	90
5.4.1	Obstáculos .....	90
5.4.2	Elementos facilitadores fundamentales .....	91

## 5 ELEMENTOS FACILITADORES FUNDAMENTALES

La epidemia de la infección por el VIH, en particular en los grupos de población clave, sigue aumentando debido al estigma y la discriminación, la desigualdad en materia de género, la violencia, la falta de poder de decisión de las comunidades, las violaciones de los derechos humanos, y las leyes y políticas que tipifican como delito el consumo de drogas y las diversas formas de identidad de género y sexualidad. Estos factores socioestructurales limitan el acceso a los servicios de atención de la infección por el VIH, restringen el modo en que se prestan estos servicios y disminuyen su eficacia.

En consecuencia, es importante comprender los diversos contextos políticos, geográficos y sociales en los cuales viven los grupos de población clave y donde se les presta atención de la infección por el VIH. También es esencial reconocer que cada grupo de población clave es heterogéneo, de manera que los programas, para ser eficaces, deben tener en cuenta esta diversidad.

A pesar de los problemas que generan la marginación, la penalización del comportamiento de algunos grupos de población clave y, en algunos entornos, la violación directa de los derechos humanos, sigue siendo necesario y factible ofrecer servicios de atención de la infección por el VIH de manera que protejan la seguridad y el bienestar de las personas de estos grupos y de los prestadores de los servicios. Los prestadores de atención de salud tienen la obligación ética de cuidar y tratar a las personas de forma imparcial y equitativa. Los programas y los países pueden garantizar la confidencialidad de los servicios, facilitar el acceso a las personas de los grupos de población clave a los principales servicios de salud, mejorar la calidad, capacitar y sensibilizar a los prestadores de atención de salud, y reducir el estigma y la discriminación. En la medida en que la seguridad lo permita, hay que alentar y apoyar a las personas de estos grupos para que participen en la formulación y la ejecución de iniciativas de prevención y respuesta al VIH. A pesar de que aún se mantienen las restricciones legislativas impuestas a las personas de los grupos de población clave en la mayoría de los países, es posible encontrar maneras de actuar en asociación para prestar apoyo, además de que también se puede llegar a estas personas por medio de internet y de redes regionales.

La incorporación de la atención de la infección por el VIH y otros servicios de salud relacionados dentro del sistema de atención primaria puede ayudar a aumentar el acceso y hacerlo más equitativo en los grupos de población clave. Para mejorar la eficacia de estos servicios como parte de la atención primaria de salud, será de utilidad que los prestadores de atención de salud comprendan las cuestiones atinentes a la identidad de género y la diversidad de comportamientos e identidades sexuales, así como el consumo de drogas y la drogodependencia y el modo de abordarlos al prestar los servicios. El sector de la salud puede adoptar medidas para cambiar las actitudes y los comportamientos de los prestadores de atención de salud con el propósito de disminuir la estigmatización y la discriminación, en particular en relación con el rechazo a los homosexuales, el rechazo a los transexuales, la prostitución y el consumo de drogas. Los trabajadores de la salud deben disponer de los recursos, la capacitación y el apoyo que son necesarios para prestar servicios a los grupos de población clave. Al mismo tiempo, cuando los prestadores de atención de salud no cumplen con las normas basadas en la ética profesional y los principios de derechos humanos acordados internacionalmente, deben asumir su responsabilidad (1). El seguimiento y la evaluación son importantes para velar no solo por la calidad técnica y las repercusiones de los servicios sino también por el espíritu con el que se proporcionan y, por lo tanto, por la aceptabilidad entre las personas de los grupos de población clave.

El término “elementos facilitadores fundamentales”, como se emplea en este documento, se refiere a las estrategias, las actividades y los enfoques utilizados como medio para lograr el objetivo de mejorar la accesibilidad, la aceptabilidad, la captación, la cobertura equitativa, la calidad, la eficacia y la eficiencia de las intervenciones y la atención de la infección por el VIH. Los elementos facilitadores operan a muchos niveles —individual, de la comunidad, institucional, de la sociedad, además de nacional, regional y mundial— y son cruciales para aplicar programas integrales contra el VIH destinados a los grupos de población clave en

todos los contextos epidémicos. Los elementos facilitadores fundamentales procuran superar los principales obstáculos que dificultan la utilización de los servicios, como la exclusión y la marginación social, la penalización, la estigmatización y la desigualdad. Si no se abordan, estos obstáculos socavan la prestación de la atención de la infección por el VIH, especialmente en los grupos de población clave (2).

Los obstáculos y los elementos facilitadores fundamentales que se describen en este capítulo son aplicables tanto a los adultos como a los adolescentes de los grupos de población clave. Es probable que estos factores estén más exacerbados para los adolescentes de estos grupos debido a su rápido desarrollo mental y físico y las complejas vulnerabilidades psicosociales y socioeconómicas. Además, estos adolescentes enfrentan obstáculos socioestructurales en el acceso a los servicios, principalmente normativos y jurídicos con respecto a la edad de consentimiento. Los allegados a las personas de los grupos de población clave, como su pareja y sus hijos, también pueden ser objeto de estigmatización y discriminación, por lo que enfrentan las mismas dificultades de acceso. Por lo tanto, puede ser importante incluir a los dependientes en la prestación de la atención de la infección por el VIH.

La aplicación eficaz de los elementos facilitadores fundamentales depende de la colaboración entre diferentes sectores.

El sector de la salud desempeña un papel importante, pero la aplicación eficaz de los elementos facilitadores fundamentales depende de la colaboración entre los diferentes sectores, como los que se ocupan de la salud, la justicia, la vivienda, el bienestar y el trabajo. También depende de la participación de múltiples asociados del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, y es crucial la participación plena de los grupos de población clave y las personas que tienen VIH (3, 4).

**Figura. 5.1 Elementos facilitadores fundamentales para los grupos de población clave**



En este capítulo se describen distintos obstáculos que dificultan el acceso de los grupos de población clave a los servicios de atención de la infección por el VIH apropiados y de buena calidad, se señalan los elementos facilitadores fundamentales para superar estos obstáculos (como se muestra en la figura 5.1) y se formulan varias recomendaciones sobre las mejores prácticas, basadas en documentos anteriores de la OMS sobre los grupos de población clave. Si bien los obstáculos y los elementos facilitadores están interrelacionados, intentaremos describir cada uno por separado.

## 5.1 Legislación y políticas

### 5.1.1 Obstáculos jurídicos

Sesenta por ciento de los países de todo el mundo tienen leyes, reglamentos o políticas que obstaculizan el acceso efectivo de los grupos de población clave y los grupos vulnerables a la atención de la infección por el VIH (5). En particular, más de 100 países tipifican como delito algún aspecto o todos los aspectos de la prostitución y al menos 76 países tipifican como delito las relaciones sexuales entre las personas del mismo sexo. De hecho, en virtud de esas leyes, algunos países condenan a la pena de muerte a los culpables de esos delitos.

Además, las personas transgénero no gozan de reconocimiento jurídico en muchos países (5), por lo que se enfrentan a políticas restrictivas hacia su expresión de género. En muchos entornos, las políticas punitivas

sobre el consumo de drogas exigen sanciones severas por la posesión de cantidades pequeñas de droga para consumo personal y, en algunos sitios, las políticas ordenan la detención obligatoria como “tratamiento” para las personas que consumen drogas o utilizan drogas inyectables (5). En muchas prisiones y otros entornos cerrados, la atención de la infección por el VIH es de mala calidad o es totalmente inexistente (6).

Si bien las leyes no son uniformes, en muchos entornos los adolescentes menores de 18 años están considerados menores de edad a los efectos jurídicos, por lo que deben obtener el consentimiento de un progenitor para recibir atención médica, incluida la atención de la infección por el VIH. Estas leyes y políticas pueden representar obstáculos para los adolescentes o pueden disuadirlos de solicitar los servicios (7). Además, las restricciones de esta índole pueden crear dilemas complejos para los prestadores que están comprometidos a actuar en beneficio de su paciente pero que pueden plantearse interrogantes acerca de su propia responsabilidad jurídica así como de la seguridad de sus pacientes jóvenes.

## 5.1.2 Elementos facilitadores fundamentales

### Examen de las leyes y las políticas

Las leyes y las políticas pueden ayudar a proteger los derechos humanos de los grupos de población clave, tanto de las personas que tienen VIH como de aquellas en riesgo de contraerlo. Las reformas jurídicas, como la despenalización de determinados comportamientos sexuales y el consumo de drogas, el reconocimiento jurídico del estado transgénero y la disminución de la edad de consentimiento, así como la consideración de excepciones en las políticas sobre la edad ordinaria de consentimiento (como los menores maduros), son elementos facilitadores fundamentales que pueden tornar propicio un ambiente hostil para los grupos de población clave (8). En particular, es preciso considerar reformas jurídicas como las mencionadas como parte de la revisión general que se emprenda de las políticas o los programas destinados a los grupos de población clave. Por ejemplo, en muchos países, la posesión, el uso y la venta de agujas y jeringas estériles o de preservativos sigue siendo motivo de detención. De ser así, está justificado examinar estas leyes.

### Despenalización del comportamiento de los grupos de población clave

Si no se aplican **políticas e iniciativas protectoras** para despenalizar el comportamiento de los grupos de población clave, no se derribarán los obstáculos que impiden el acceso a los servicios de salud esenciales.

Para proteger la salud y el bienestar de los grupos de población clave cuyo comportamiento sexual, consumo de drogas, expresión de género u orientación sexual percibida actualmente están tipificados como delito, es preciso cambiar la legislación y adoptar nuevas políticas y leyes protectoras de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Si no se aplican políticas e iniciativas protectoras para despenalizar el comportamiento de los grupos de población clave, no se

derribarán los obstáculos que impiden el acceso a los servicios de salud esenciales; muchas personas de los grupos de población clave quizá teman que solicitar atención de salud las exponga a consecuencias jurídicas adversas (9).

Las instancias normativas y los dirigentes de gobierno deben examinar las leyes, normas jurídicas y prácticas y, si es necesario, modificarlas, proceso en el que deben dar cabida a la participación significativa de los interesados directos de los grupos de población clave, para propiciar y respaldar el mejor acceso a los servicios para estos grupos de población (10, 11, 13).

## Recomendaciones sobre buenas prácticas en cuanto a la despenalización

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Los países deben orientar los esfuerzos para lograr la despenalización de comportamientos como el consumo y la inyección de drogas, la prostitución, las relaciones sexuales con personas del mismo sexo y las identidades de género discordantes, para eliminar la aplicación injusta del derecho civil y los reglamentos contra las personas que consumen drogas inyectables, los trabajadores sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas transgénero (10, 11, 12, 13, 14).

### HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES

Los países deben orientar los esfuerzos para formular políticas y leyes que despenalicen las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo (11).

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

- Los países deben orientar los esfuerzos para formular políticas y leyes que despenalicen el consumo de drogas por vía inyectable u otras y, de ese modo, disminuyan el encarcelamiento.
- Los países deben orientar los esfuerzos para formular políticas y leyes que despenalicen el uso de agujas y jeringas estériles (y que habiliten los programas de distribución de agujas y jeringas) y que legalicen el tratamiento de sustitución de opioides para las personas dependientes de los opioides.
- Los países deben prohibir el tratamiento obligatorio de las personas que consumen drogas o utilizan drogas inyectables (12, 13, 14).

### TRABAJADORES SEXUALES

- Los países deben orientar los esfuerzos para despenalizar la prostitución y eliminar la aplicación injusta de las leyes y los reglamentos no penales contra los trabajadores sexuales.
- Debe eliminarse la práctica policial de tomar la posesión de preservativos como prueba del ejercicio de la prostitución y como motivo de detención (10).

### PERSONAS TRANSGÉNERO

- Los países deben orientar los esfuerzos para formular políticas y leyes que despenalicen las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y las identidades de género discordantes.
- Los países deben orientar los esfuerzos para lograr el reconocimiento jurídico de las personas transgénero (11).

## Recomendaciones sobre las mejores prácticas en cuanto a las políticas y las leyes sobre la edad de consentimiento

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Se insta a los países a que examinen las políticas actuales de consentimiento y consideren la posibilidad de modificarlas para reducir los obstáculos relacionadas con la edad que dificultan el acceso a la atención de la infección por el VIH y para facultar a los prestadores a actuar en beneficio del adolescente (7).
- Se recomienda ofrecer a los adolescentes servicios de salud sexual y reproductiva en los que se les proporcione información sobre los métodos anticonceptivos y los servicios anticonceptivos, sin necesidad de autorización ni notificación paterna, materna ni de un tutor (15).

### Estudio de caso: Despenalización del consumo de drogas en Portugal

GIRUBarcelos, APDES, Portugal  
<http://www.apdes.pt/en/>

Hasta el año 2012, 21 países ya habían adoptado medidas para despenalizar el consumo y la posesión de drogas (16). Por ejemplo, Portugal cambió su legislación en el 2001, en virtud de la cual la posesión de medicamentos fiscalizados constituye un "delito administrativo", mientras que quienes son apresados con drogas para consumo personal son enviados ante una "junta de disuasión" en lugar de ser enjuiciados y posiblemente condenados a prisión. Un estudio independiente analizó el impacto de estos cambios y encontró (17) que:

- El número de personas que consumen drogas y que estaban en tratamiento aumentó de 23.654 en 1998 a 38.532 en el 2008.
- Entre el 2000 y el 2008, el número anual de nuevos casos de VIH registrados en los consumidores de drogas descendió de 907 a 267, disminución atribuida a la ampliación de los servicios para la reducción de daños.
- Contrariamente a las predicciones, no hubo un aumento importante del consumo de drogas, los datos indicaron que disminuyeron los daños relacionados con las drogas de uso problemático y el hacinamiento en el sistema judicial penal.

Las organizaciones de la comunidad siguen siendo esenciales para abordar el estigma y la discriminación y para mejorar el acceso a los servicios. La Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES), fundada en el 2004, trabaja con personas y comunidades vulnerables sobre el acceso a la atención de salud, el empleo y la educación con el fin de empoderar a estos grupos y reforzar la cohesión social. Este organismo lidera a GIRUBarcelos, un equipo de alcance multidisciplinario que trabaja principalmente con consumidores de heroína y cocaína y trabajadores sexuales del norte de Portugal, y centra sus esfuerzos en reducir los daños. Gracias a sus iniciativas, se ha reducido la discriminación hacia las personas que consumen drogas, incluida la proveniente de los profesionales de la salud, mediante la celebración de reuniones ordinarias, actividades de mediación entre la comunidad y los prestadores de servicio, debates y un programa de radio en una emisora local titulado "Conversaciones de GIRU". La presencia de un educador de pares en el equipo y la participación constante de las personas que consumen drogas inyectables son las piedras angulares en las intervenciones de GIRUBarcelos, consideradas fundamentales para lograr la eficacia de estas iniciativas.

## Tratamiento de otras cuestiones de política relativas a los grupos de población clave

Junto con los esfuerzos de despenalización, hay otros cambios normativos que pueden permitir a las personas de los grupos de población clave ejercer sus derechos humanos y su derecho a la salud. Algunas políticas actuales limitan el acceso al sistema judicial y a los servicios de salud. A continuación se indican algunas consideraciones esenciales sobre este tema.

**Reconocimiento jurídico de las personas transgénero.** Es probable que, para las personas transgénero, el reconocimiento jurídico de la identidad de género y el nombre preferido sea importante para reducir el estigma, la discriminación y la ignorancia acerca de la variación de la identidad de género. El reconocimiento en los servicios de salud puede mejorar el acceso, la utilización y la prestación de los servicios de atención de la infección por el VIH (11).

### Estudio de caso: Un diálogo nacional respalda el cambio legislativo en Uruguay

En el 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó la Comisión Mundial sobre el VIH y el Derecho con el mandato de formular respuestas y recomendaciones viables basadas en la evidencia para responder al VIH con estrategias que protejan y promuevan los derechos humanos de las personas que tienen VIH y aquellas más vulnerables a contraerlo (<http://www.hivlawcommission.org>). La labor de la Comisión se centra en generar diálogos constructivos entre la sociedad civil y los gobiernos sobre cuestiones relacionadas con el VIH y el derecho, que trascienden la individualización de los problemas y que se proponen elaborar y compartir soluciones prácticas.

En Uruguay, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, los sindicatos, la Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA (CONASIDA), la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario crearon conjuntamente una comisión nacional intersectorial que hizo un llamamiento al diálogo nacional sobre el VIH y los derechos humanos para armonizar y mejorar la legislación nacional relacionada con la respuesta al VIH. Con gran apoyo de la Oficina Regional del PNUD, el UNFPA y el ONUSIDA, esta iniciativa de dos meses de duración brindó a las personas afectadas por el VIH y vulnerables a contraerlo la oportunidad de presentar evidencia sobre cuestiones que se habían silenciado o se desconocían. Las personas y las organizaciones de la sociedad civil presentaron más de una treintena de casos seleccionados de violaciones de los derechos humanos. Los participantes, en particular las organizaciones de la sociedad civil, ofrecieron apoyo técnico para la redacción y la presentación de temas relacionados con el VIH concernientes a la orientación sexual y la identidad de género; la discriminación en los servicios de salud, el empleo y la educación; la prostitución; la brutalidad policial; el acceso al tratamiento; la propiedad intelectual; y los derechos humanos de las personas que tienen VIH.

Este diálogo nacional contribuyó a la formulación continua de una nueva ley integral sobre la infección por el VIH. En el informe final del diálogo, presentado ante el parlamento en mayo del 2014, se describen las brechas legislativas, las leyes que son perjudiciales para la respuesta al VIH y la falta de aplicación de las leyes que promoverían la respuesta. Además, se hacen sugerencias sobre las mejores prácticas y se formulan recomendaciones desde una perspectiva de derechos humanos. La promoción de la causa y la movilización de sociedad civil, en particular de las personas que tienen VIH y los grupos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero, han impulsado este diálogo, junto con los esfuerzos concertados y las asociaciones con organismos de las Naciones Unidas, el gobierno y la comunidad académica.

El mecanismo coordinador de la Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA (CONASIDA) pondrá en práctica y hará el seguimiento de las principales recomendaciones extraídas del diálogo para respaldar el proyecto de ley sobre el VIH. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos creado recientemente en Uruguay, afiliado también al diálogo, se ha comprometido a contribuir, vigilar y preconizar la aplicación de las leyes actualizadas.

**Mejor acceso a la justicia y al apoyo jurídico para los grupos de población clave.** Las políticas que tipifican como delito y castigan el comportamiento de los grupos de población clave impiden a estas personas obtener justicia y servicios jurídicos. Es necesario formular políticas y procedimientos que garanticen que las personas de los grupos de población clave puedan denunciar las violaciones de los derechos como la discriminación, la violencia de género, los problemas con las medidas policiales, las violaciones del consentimiento informado, las violaciones de la confidencialidad médica y la denegación de servicios de atención de salud. Las opciones de denuncia que no entrañan acudir a la policía promoverán la notificación de las violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, las personas de los grupos de población clave pueden capacitarse como asistentes jurídicos; una organización que trabaja con grupos de población clave puede oficiar de denunciante en nombre de terceras personas.

**Mejores políticas sobre el acceso a los servicios y la información de salud.** Lograr que las personas de los grupos de población clave sean conscientes de sus derechos jurídicos y humanos como personas, en especial su derecho a la salud, puede mejorar su acceso a los servicios de salud. Dado que los grupos de población clave suelen ser objeto de explotación, marginación, penalización, estigmatización y discriminación, se necesitan programas que garanticen, en particular, que los grupos de población clave conozcan sus derechos jurídicos y humanos, como las leyes protectoras pertinentes y el lugar y el modo de obtener servicios jurídicos y denunciar violaciones. Los conocimientos sobre la salud, la educación sobre la sexualidad y los programas de apoyo pueden ayudar a mejorar la concientización (18). Si están mejor informados, los grupos de población clave pueden organizarse mejor para defender sus derechos y crear conciencia sobre los derechos, las necesidades y las políticas y los problemas jurídicos que más los afectan (10, 19, 20).

Además, los países pueden examinar las leyes que sancionan a los prestadores de atención de salud por brindar servicios a los grupos de población clave (por ejemplo, las leyes que consideran ilegal que los trabajadores de sensibilización comunitaria distribuyan preservativos o agujas y jeringas estériles).

La **ejecución de las leyes** puede desempeñar un papel importante garantizando que no se infrinjan los derechos humanos de los grupos de población clave. La policía debe recibir capacitación continua sobre las maneras de apoyar —o, al menos, no dificultar— el acceso de los grupos de población clave a los servicios de salud esenciales, por ejemplo, no deteniendo a las personas que salen de centros de farmacoterapia, evitando la confiscación de los medicamentos que llevan, evitando la vigilancia de los centros de reducción de los daños, y dejando de utilizar la posesión de agujas estériles o preservativos como motivo de detención. Los sistemas que promueven las buenas prácticas de vigilancia policial y proporcionan vías seguras para denunciar las violaciones de los derechos humanos ayudarán a conseguir que la policía proteja tanto la salud pública como los derechos humanos de todas las personas. Un paso que pueden dar los prestadores de atención de salud para aumentar la confianza entre los servicios de salud y los grupos de población clave consiste en garantizar la confidencialidad de las historias clínicas.

### Recomendaciones sobre prácticas adecuadas en relación con otras cuestiones normativas

#### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Los países deben orientar los esfuerzos para crear opciones alternativas al encarcelamiento de los consumidores de drogas, los trabajadores sexuales y las personas que mantienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo (12).
- Se recomienda eliminar los requisitos de autorización de terceros, como los requisitos de autorización conyugal para que las mujeres reciban anticonceptivos e información y servicios afines (15).

*Observación complementaria:* Es importante que los países garanticen el compromiso político y que este se vea cristalizado en inversiones apropiadas en estrategias de promoción de la causa y recursos financieros suficientes para los programas y servicios de salud relacionados con el VIH destinados a los grupos de población clave.

#### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- A medida que los países orientan los esfuerzos para elaborar estrategias alternativas al encarcelamiento, pueden definirse metas para reducir el hacinamiento de las prisiones en general (12).

### TRABAJADORES SEXUALES

- Debe eliminarse la práctica policial de tomar la posesión de preservativos como prueba de prostitución y motivo suficiente para detener a trabajadores sexuales (10).
- Debe eliminarse el amplio margen policial para detener y demorar a trabajadores sexuales sin causa, incluido el recurso a la extorsión (10).

### PERSONAS TRANSGÉNERO

- Los países deben orientar los esfuerzos para lograr el reconocimiento jurídico de las personas transgénero (11).

### Estudio de caso: Tratamiento de mantenimiento con metadona en las prisiones de Indonesia

Asociación de Indonesia y Australia de lucha contra el VIH (AIPH), Programa de Cooperación sobre el VIH para Indonesia (HCPI)

Se realizaron pruebas piloto sobre el tratamiento de mantenimiento con metadona administrado a los consumidores de drogas inyectables encarcelados en la prisión de Kerobokan, ubicada en Bali, en el 2005, después de que los funcionarios penitenciarios visitaran prisiones australianas para observar el funcionamiento de los programas. Se detallan a continuación algunos logros del proyecto piloto de la prisión de Kerobokan:

- Se establecieron servicios de reducción integral de los daños (como el tratamiento de mantenimiento con metadona) y se lograron altos niveles de participación de los prisioneros con dependencia de los opioides.
- Se amplió el alcance del tratamiento de mantenimiento con metadona, la educación y la atención; se instauraron servicios de apoyo y tratamiento en otras once prisiones, centros de detención y servicios de libertad condicional; la prisión de Kerobokan proporciona tutoría continua a muchos de estos establecimientos.
- Se lograron altos niveles de integración con otros servicios de salud de la comunidad en Bali, lo que garantiza una transición sin tropiezos entre los programas de mantenimiento penitenciarios y la comunidad (y viceversa), así como el acceso temprano o continuo al tratamiento de la infección por el VIH.

Además, en muchas prisiones ahora se aplican eficientemente las pruebas de detección y el tratamiento del VIH. Más del 90% de los prisioneros de alto riesgo se han sometido a la prueba de detección y una proporción alta de los que obtienen un resultado positivo han comenzado el tratamiento con antirretrovirales.

Como parte de las medidas para integrar esta iniciativa, en el 2013 el Ministerio de Salud y la Dirección General de Correccionales firmaron un memorando de entendimiento en virtud del cual el Ministerio de Salud sufragaría la totalidad del costo de la metadona. El HCPI sigue impartiendo capacitación y aportando financiamiento limitado.

## 5.2 Estigmatización y discriminación

### 5.2.1 Obstáculos

Las personas de los grupos de población clave suelen ser víctimas de estigmatización, discriminación y actitudes negativas relacionadas con su comportamiento —y por partida doble si además tienen VIH— por parte de su familia, la comunidad y los trabajadores de salud. Esta estigmatización es frecuente en muchos establecimientos de salud y entre las autoridades policiales, y puede parecer que, tácitamente, está respaldada por la falta de leyes y políticas nacionales contra la discriminación. Los efectos del estigma relacionado con el VIH y la discriminación contra los grupos de población clave pueden verse en el retraso de las pruebas de detección del VIH, el encubrimiento del estado serológico positivo y la captación deficiente de la atención a la infección por el VIH (21, 22, 23, 24, 25). El estigma puede menoscabar los esfuerzos de los programas nacionales de salud para vincular eficazmente a las personas con la atención de la infección por el VIH y para comprometerlos con el tratamiento y retenerlos en la atención a largo plazo (26, 27).

Dentro del sector de la salud, la estigmatización y la discriminación pueden adoptar muchas formas, tanto a nivel individual como del sistema. La falta de capacitación y programas formativos que doten a los trabajadores de salud del conocimiento sobre las necesidades, los problemas de salud y las estrategias e intervenciones específicas para los grupos de población clave aumenta la marginación, deja a los prestadores poco preparados para atender las necesidades de salud de estos grupos y perpetúa las prácticas estigmatizantes y discriminatorias, aun hasta el punto de rechazar los servicios.

### 5.2.2 Elementos facilitadores fundamentales

Las iniciativas para reducir la estigmatización y la discriminación a nivel nacional, como promover las políticas antidiscriminatorias y protectoras de todos los grupos de población clave, pueden fomentar un entorno propicio, en particular dentro del sistema judicial y de salud (20). Las políticas son más eficaces cuando abordan simultáneamente los factores normativos individuales, institucionales y públicos que dan cabida o permiten la estigmatización y la discriminación (28). Los programas, tanto dentro como fuera del sector de la salud, tienen que instituir políticas y códigos de conducta antidiscriminatorios y de lucha contra la estigmatización. La vigilancia y la supervisión son importantes para conseguir que se ejecuten y se mantengan las normas. Asimismo, es necesario poner a disposición de los grupos de población clave mecanismos que les permitan denunciar de manera anónima los actos de estigmatización o discriminación cuando intentan obtener servicios de salud.

#### **Recomendaciones sobre buenas prácticas para ejecutar y hacer cumplir las políticas protectoras, antidiscriminatorias y en contra de la estigmatización**

##### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Los países deben orientar los esfuerzos a aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias y protectoras, derivadas de las normas de derechos humanos, para eliminar la estigmatización, la discriminación y la violencia contra las personas de los grupos de población clave.
- Las instancias normativas, los parlamentarios y otros dirigentes de salud pública deben colaborar con las organizaciones de la sociedad civil en las iniciativas para controlar la estigmatización, confrontar la discriminación contra los grupos de población clave y cambiar las normas jurídicas y sociales punitivas (3, 10, 11, 12, 13, 19).

#### **Prestación de servicios atentos a las necesidades de los grupos de población clave**

Es importante que los grupos de población clave tengan acceso a servicios de salud aceptables y adaptados a sus necesidades (20). Las intervenciones y los servicios para los grupos de población clave, incluidos los adolescentes, pueden adoptar principios atentos a las necesidades de estos grupos, prestando especial atención a la accesibilidad y a la pericia y las actitudes de los trabajadores de la salud (7).

Algunos métodos para lograr que los servicios atentos a las necesidades de los grupos de población clave son los siguientes:

- los servicios de salud integrados, en los que se ofrezcan simultáneamente intervenciones y capacitación interdisciplinaria de los prestadores, como la dispensación de antirretrovirales en los centros de farmacoterapia;
- la programación de horas de servicio regulares, fiables y acordes a los destinatarios;
- la ubicación estratégica de los servicios donde se congregan o transitan los grupos de población clave;
- la participación de la comunidad de pares en la formulación, la promoción, la prestación y el seguimiento y la evaluación de los servicios;
- la capacitación del personal para que sepan trabajar con diferentes grupos de población clave;
- la adopción de medidas para conseguir que las actividades de aplicación de las leyes no dificulten el acceso de estas personas los servicios de atención de la infección por el VIH (11, 12, 13, 20).

### Estudio de caso: Sensibilización de los trabajadores de salud en Sudáfrica

Consejo Nacional de Sudáfrica sobre el Sida y Departamento de Salud de Sudáfrica, Sudáfrica  
<http://www.health.gov.za/> y <http://www.sanac.org.za>

La discriminación hacia las personas de los grupos de población clave que ejercen los prestadores de atención de salud pública y los establecimientos de salud “hostiles” son obstáculos que dificultan el acceso a los servicios, lo que deriva en resultados más deficientes en materia de salud (29). En Sudáfrica, un proyecto con varios asociados ha elaborado un método integrado para sensibilizar a los prestadores de atención de salud en relación con los problemas que afectan a los grupos de población clave y para facultar a los funcionarios de salud pública para que interactúen apropiadamente (con respecto a su actitud y su pericia clínica) con las personas de los grupos de población clave. Se ha impartido capacitación como preparación para la ejecución de las directrices nacionales operativas sobre los programas de lucha contra el VIH, las ITS y la tuberculosis destinados a los grupos de población clave de Sudáfrica. El programa completo de capacitación imparte cursos presenciales y tutorías. Participaron en un taller de capacitación inicial 30 instructores que fueron vinculados a centros locales de capacitación y establecimientos de salud. A su vez, estos instructores capacitaron a 420 trabajadores de la salud en seis meses.

Donde se impartieron estas sesiones de capacitación, las personas de los grupos de población clave han informado que han mejorado las actitudes de los trabajadores de la salud. Ha aumentado la confianza de las comunidades y también el uso de los establecimientos de salud, donde la capacitación para fomentar la sensibilización se ha vinculado con las actividades de sensibilización entre pares y de prevención llevadas adelante por organizaciones de la sociedad civil. Se ha planificado efectuar otras evaluaciones para obtener información que permita ampliar estas intervenciones a mayor escala.

### Capacitación y sensibilización de los trabajadores de salud

Para crear servicios de salud inclusivos es necesario sensibilizar y educar a los prestadores y otros agentes de atención de salud y los servicios sociales, lo que puede hacerse tanto mediante capacitación anterior al servicio como durante su prestación, a través de apoyo y supervisión en el empleo, y creando una norma institucional que vele por la inclusión de todos y la ausencia de discriminación.

**Actitudes.** Los prestadores de atención de salud que atienden a los adultos o los adolescentes de los grupos de población clave deben estar exentos de prejuicios, brindar apoyo y ser receptivos y respetuosos, y deben comprender los problemas que enfrentan las personas de estos grupos (7, 10, 11, 20). La capacitación, con la participación de representantes y grupos de población clave, puede impartirse para sensibilizar y educar al personal de salud sobre cuestiones específicas de los grupos de población clave, las actitudes y las prácticas no discriminatorias, y el derecho de estos grupos a la salud, la confidencialidad, la atención no coercitiva y el consentimiento informado.

**Competencias.** Es importante que los trabajadores de salud sean capaces de responder a las necesidades específicas de los grupos de población clave y de prestar servicios de calidad, que conozcan las intervenciones, las herramientas y los materiales que pueden conseguirse para suministrar información, que puedan asesorar sobre las estrategias de reducción del riesgo de contraer el VIH y que sepan brindar apoyo para velar por el cumplimiento terapéutico y la retención en la atención (20).

La mejora y el mantenimiento de las actitudes y las competencias de los prestadores es un proceso continuo que consta de múltiples componentes, como las situaciones de capacitación formal, las ayudas para el trabajo, la supervisión de apoyo, el seguimiento de las capacitaciones y la tutoría. Las capacitaciones y los entornos de trabajo que son multidisciplinarios pueden fortalecer la vinculación con los trabajadores de la salud de la comunidad para facilitar las derivaciones y el seguimiento adecuado. En particular donde es escasa la fuerza laboral, es importante que todos los prestadores reciban capacitación específica sobre los adolescentes, incluidos los asesores no especializados, para habilitar la delegación de funciones (7).

Es esencial que las personas de los grupos de población clave tengan acceso a servicios de salud aceptables, que estén guiados por los principios de la ética médica, la evitación del estigma, la ausencia de discriminación y el derecho a la salud (3, 7, 10, 11, 12, 13, 15).

### Recomendaciones sobre buenas prácticas de prestación de servicios atentos a las necesidades de los grupos de población clave

#### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Se recomienda capacitar y sensibilizar apropiadamente y con regularidad a los trabajadores de la salud para fomentar las competencias y la comprensión necesarias que les permitan prestar servicios a los adultos y los adolescentes de los grupos de población clave basándose en el derecho de todas las personas a la salud, la confidencialidad y la ausencia de discriminación.
- Se recomienda poner a disposición de todas las personas, incluidos los adolescentes, métodos anticonceptivos asequibles, y que las leyes y las políticas respalden el acceso a la anticoncepción de los grupos desfavorecidos y marginados (3, 7, 10, 11, 12, 13, 15).

#### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Los servicios para los adolescentes de los grupos de población clave deben ofrecer apoyo psicosocial, mediante asesoramiento psicológico, y apoyo de grupos y redes de pares, para abordar el autoestigma y la discriminación. La prestación adicional de asesoramiento para las familias, incluidos los padres —si corresponde y así lo solicita el adolescente— puede ser importante para brindar apoyo y facilitar el acceso a los servicios, especialmente donde se exige el consentimiento de la madre o el padre (7).
- Los prestadores de atención de salud deben asegurarse de que los adolescentes de los grupos de población clave conozcan sus derechos —a la confidencialidad, la salud, la protección y la autodeterminación— para que puedan defenderlos y buscar el tipo de apoyo al que tienen derecho (7).
- Los servicios deben suministrar información y educación integral apropiada a la edad, centrándose en la reducción de los riesgos basada en los conocimientos prácticos (7).
- Los servicios deben ser espacios seguros que aumenten la protección de los efectos de la estigmatización y la discriminación, donde los adolescentes puedan expresar sus inquietudes con libertad y los prestadores demuestren paciencia, comprensión, aceptación y conocimiento acerca de las elecciones y los servicios destinados al adolescente (7).

### **Estudio de caso: Ampliación de las competencias para atender a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Sudáfrica**

Health4Men, Anova Health Institute  
www.anovahealth.co.za

El proyecto Health4Men atiende las diversas necesidades de salud sexual de los hombres, en particular las de los grupos vulnerables y marginados, como los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. La meta del proyecto es institucionalizar la competencia para brindar atención a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en los consultorios públicos existentes. Este proceso comprende:

- la sensibilización, para cambiar las actitudes;
- la capacitación médica, para ampliar los conocimientos;
- las tutorías, para transformar el conocimiento teórico en conocimiento práctico;
- el apoyo técnico continuo, mediante consultas, capacitación y tutorías, y la entrega de materiales didácticos.

Con el liderazgo del Instituto de Salud Anova, Health4Men ha creado dos centros de excelencia específicos para este grupo de población clave, en Ciudad del Cabo y Johannesburgo, cada uno respaldado por consultorios satélite. Estos centros prestan servicios a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y emprenden actividades de extensión para estimular la demanda de los servicios.

Health4Men ha elaborado contenido y materiales de capacitación innovadores para habilitar al personal de enfermería, los orientadores y los funcionarios médicos para responder a las necesidades especiales de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres de una manera sensible y empática. Conjuntamente con los departamentos provinciales de salud, el proyecto establece al menos un sitio regional de liderazgo en cada provincia para servir de núcleo para el desarrollo de competencias; el personal de enfermería, que funciona como mentor, y los equipos de extensión operan desde estos sitios. Hasta mediados del 2014, habían recibido capacitación más de 3.000 trabajadores de la salud, habían recibido tutoría 584 médicos y 64 consultorios de cuatro provincias fueron declarados médicamente competentes para atender a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. A fines del 2014, el proyecto contaba con más de 120 sitios competentes en seis provincias y, para fines del 2015, con más de 160 sitios en todo el país.

## **5.3 Empoderamiento de la comunidad**

### **5.3.1 Obstáculos**

Los grupos de población clave a menudo tienen escaso o ningún control sobre los factores de riesgo que los exponen a contraer el VIH que se derivan del entorno jurídico, político y social, así como del contexto personal. Por ejemplo, los trabajadores sexuales suelen estar expuestos al VIH y otras ITS, pero quizá no tengan el poder para negociar el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales (30, 31). Esta falta de control se exacerba si las personas desconocen los servicios relacionados con el VIH que tienen a su alcance, los derechos jurídicos y humanos que les asisten, específicamente su derecho a la salud, y lo que deben hacer si se violan sus derechos.

En particular, son pocos los integrantes de la población joven de los grupos clave que reciben información y educación acorde a su vida sexual. En cambio, reciben mensajes conflictivos o confusos acerca del género y la sexualidad, lo que los torna vulnerables a la coacción, el abuso y la explotación, y al embarazo involuntario y las ITS, incluido el VIH (18). La falta de empoderamiento de la comunidad, y también, de sensibilización y de conocimiento en ese ámbito limita la eficacia general de las intervenciones orientadas a reducir el riesgo de contraer la infección por el VIH (10, 20).

### **5.3.2 Elementos facilitadores fundamentales**

La evidencia indica que las políticas y los programas de salud son más eficaces y tienen efectos más positivos sobre los resultados en materia de salud cuando los grupos afectados participan en su formulación (32). El empoderamiento de la comunidad es un principio rector de la formulación de todos los programas y las

actividades contra la infección por el VIH, y constituye un proceso colectivo que permite a los grupos de población clave abordar las limitaciones estructurales que dificultan el acceso a la salud, los derechos humanos y el bienestar; incorporar cambios sociales, económicos y conductuales; y mejorar el acceso a los servicios de salud (10). Además, puede fomentar un mayor alcance y mejorar la eficacia de los servicios destinados a los grupos de población clave (10). Se han aplicado estrategias para dotar de poder de decisión a la comunidad en diversos entornos, por ejemplo, a trabajadores sexuales (figura 5.2).

El empoderamiento de la comunidad es un elemento facilitador fundamental para mejorar las condiciones de vida de los grupos de población clave, crear estrategias para las intervenciones sobre la salud y los derechos, y corregir las violaciones de los derechos humanos de las personas de estos grupos. Los métodos para dotar de poder de decisión a la comunidad pueden adoptar muchas formas, como la participación significativa de estas personas en la formulación de los servicios, la educación a cargo de pares, las iniciativas de educación jurídica y programas de servicios, y el fomento de los grupos, los programas y la prestación de servicios a cargo de los grupos de población clave (10, 20).

Los grupos de población clave son heterogéneos y móviles. Por consiguiente, la eficacia de los programas depende de que estén representados los diversos entornos jurídicos, políticos, sociales y de salud en los que viven las personas de los grupos de población clave y de que sigan siendo sensibles a las diversas culturas (20). La flexibilidad, la capacidad de respuesta y la adaptabilidad que se derivan de estas consideraciones son esenciales para las iniciativas que buscan empoderar a la comunidad. Por otra parte, es esencial que las iniciativas evolucionen con el transcurso del tiempo para satisfacer las necesidades cambiantes de los grupos de población clave.

### Programas dirigidos por organizaciones de los grupos de población clave

Es importante fomentar y brindar apoyo a los servicios, los establecimientos y la investigación que están a cargo de organizaciones de los grupos de población clave. Las organizaciones, los colectivos y las redes dirigidos por grupos de población clave pueden desempeñar funciones esenciales en cuanto a la capacitación del personal de los organismos de salud, policiales y de servicios sociales, lo que puede facilitar la interacción con las comunidades de estos grupos y la administración de los servicios. De hecho, pueden tener puntos fuertes especiales en cuanto a la prestación de servicios comunitarios y de extensión.

#### Estudio de caso: Aumento de los conocimientos sobre la salud en los consumidores jóvenes de drogas inyectables en México

Programa de Política de Drogas (Espolea, A.C), México  
<http://www.espolea.org/>


Espolea, organización a cargo de jóvenes de Ciudad de México, dio inicio en el 2008 a una Política de Drogas y un Programa de Reducción de Daños y, desde entonces, creó canales en línea y presenciales para suministrar información objetiva acerca de las drogas y la reducción de los riesgos para la población joven de 15 a 29 años.

La organización ha encontrado que la información es más eficaz cuando se difunde en los lugares donde los jóvenes consumen drogas, en particular en los festivales de música electrónica, los conciertos de rock y los encuentros culturales. En estos sitios, Espolea instala un puesto que brinda un espacio seguro para que los jóvenes obtengan información acerca de las drogas que quizá estén consumiendo. La organización también imparte talleres en las escuelas y en las comunidades en las que hay gran concentración de jóvenes expuestos a grandes riesgos.

Espolea tiene una estrategia activa de extensión, a través de redes sociales como Facebook y Twitter, pero también mediante bitácoras de internet. Una bitácora, [www.universodelasdrogas.org](http://www.universodelasdrogas.org), sirve de banco de datos sobre las drogas y se ha convertido en el eje de la campaña de reducción de los daños que forma parte del programa. El personal, los colaboradores y los jóvenes son los encargados de redactar la información. Los materiales impresos informan sobre los hechos y aportan recomendaciones acerca de la vida nocturna, los comportamientos sexuales riesgosos, el consumo de alcohol, el VIH y otras ITS.

## Figura 5.2 Elementos clave para empoderar a la comunidad de trabajadores sexuales (20)

Si bien esta figura contiene información específica sobre trabajadores sexuales, estos elementos que permiten empoderar a esta comunidad podrían adaptarse para otros grupos de población clave.



### Participación significativa

Aunque las organizaciones dirigidas por los grupos de población clave no estén tomando la delantera, es fundamental que los representantes de la comunidad tengan una participación significativa en la programación para garantizar la adecuación y la aceptabilidad de los servicios. Esta participación también es importante para establecer relaciones de confianza entre la comunidad y los prestadores de servicios, que quizá estén habituados a definir los parámetros por los cuales se prestan los servicios y a prescribir el modo en que deben llevarse adelante las relaciones o las asociaciones (20). La participación es significativa cuando los grupos de población clave: 1) eligen si quieren participar; 2) eligen el tipo de representación y a sus representantes; 3) eligen el modo de participar en el proceso; y 4) tienen las mismas oportunidades de opinar sobre el modo en que se manejan las asociaciones.

**Las políticas y los programas son más eficaces cuando los grupos afectados participan en su aplicación.**

La participación significativa puede entrañar no solo tener las mismas oportunidades de opinar en los procesos decisorios sino también contribuir en la prestación de los servicios.

Por ejemplo, es posible dar oportunidades, empoderar y capacitar a los adolescentes de los grupos de población clave para que operen como educadores de pares, orientadores, instructores y defensores de la causa (33). La educación a cargo de pares es una estrategia fructífera para mejorar el conocimiento de la población joven sobre el VIH, aumentar su acceso a las pruebas de detección y el asesoramiento correspondiente y mejorar la vinculación con la atención, y tiene mayores probabilidades de lograr cambios de comportamientos que muchas otras intervenciones. Además, puede ayudar a movilizar a la sociedad y las redes sociales (34).

Las asociaciones son cruciales, pero deben crearse y mantenerse de manera tal que los riesgos no dañen a sus participantes. La eficacia de las intervenciones que facilitan la participación se mide no solo a través de los resultados positivos sino también a través del grado de participación de los grupos de población clave y de los procesos y mecanismos de participación (35).

Los grupos y las organizaciones dirigidas por los grupos de población clave deben ser asociados y líderes esenciales en los procesos de creación, planificación, ejecución y evaluación de los servicios de salud.

## Recomendaciones sobre buenas prácticas para empoderar a la comunidad

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Se recomienda que los programas pongan en marcha un conjunto de intervenciones con el propósito de aumentar el empoderamiento de la comunidad de los grupos de población clave (10, 11, 12, 15).
- Se recomienda poner en marcha programas que brinden educación jurídica y servicios jurídicos a los grupos de población clave para que conozcan sus derechos y las leyes pertinentes, de manera que reciban apoyo del sistema judicial cuando se vean agraviados (10, 11, 12, 15).

### HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES

- Los grupos sobre la salud de los hombres y las organizaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres son asociados esenciales cuando se imparte capacitación integral sobre la sexualidad humana y la prestación de servicios, de modo que su participación debe ser activa. Además, pueden facilitar la interacción con los integrantes de comunidades sexualmente diversas, lo que puede generar mayor comprensión sobre su salud emocional y sus necesidades sociales, y sobre el costo de la inacción contra el rechazo a los homosexuales (11).

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

- Es importante empoderar a la comunidad y fomentar su movilización para abordar el estigma y la marginación de las personas que consumen drogas inyectables dentro del sector de la salud. La participación de las personas que consumen drogas inyectables en la planificación y la prestación de los servicios es crucial, en particular la relativa a la educación y la capacitación de pares sobre los modos de inyectarse con menos riesgos, la reducción de los daños y los problemas más amplios con respecto a los derechos y la salud (25, 39).

### TRABAJADORES SEXUALES

- Se recomienda poner en ejecución programas para sensibilizar y educar a los prestadores de atención de salud sobre la discriminación y el derecho de los trabajadores sexuales a la atención de buena calidad y no coercitiva, la confidencialidad y el consentimiento informado (10).
- Se recomienda que los programas pongan en marcha un conjunto de intervenciones para mejorar el empoderamiento de los trabajadores sexuales (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (10).
- Las estrategias para empoderar a la comunidad representan un componente imprescindible de las intervenciones destinadas a los trabajadores sexuales y deben estar dirigidas por ellos mismos.

## PERSONAS TRANSGÉNERO

- Las organizaciones de las personas transgénero son asociados esenciales cuando se imparte capacitación integral sobre la sexualidad humana y la expresión de la identidad de género. Además, pueden facilitar la interacción con integrantes de las comunidades con diversas identidades y expresiones de género, lo que puede generar mayor comprensión acerca de su salud emocional y sus necesidades sociales, y acerca del costo de la inacción contra el rechazo a los transexuales (11).

## ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Se recomienda que los programas de educación sobre la sexualidad destinados a los adolescentes, tanto dentro como fuera de las escuelas, contengan datos científicos exactos e integrales e incluyan información sobre los métodos anticonceptivos, en la que se explique cómo usarlos y dónde conseguirlos (15).

### Estudio de caso: Participación significativa de las personas que consumen drogas inyectables en Nepal

Bridging the Gap: Health and Human Rights for the Key Population, Naya Goreto, Nepal  
[www.nayagoreto.org.np](http://www.nayagoreto.org.np)

Reconociendo la falta de leyes y políticas específicas que respalden a las personas de Nepal que consumen drogas inyectables y la falta de servicios al nivel de la comunidad, Naya Goreto creó un programa sobre salud y derechos humanos de este grupo de población clave denominado *Bridging the Gap: Health and Human Rights for the Key Population*. Este programa procura lograr la participación de los interesados directos a lo largo de todo el espectro, desde parlamentarios a concejeros locales, funcionarios de salud pública y voluntarios de salud, en la promoción de la causa sobre las cuestiones que preocupan a las personas que consumen drogas inyectables.

Naya Goreto hace hincapié en la participación significativa de las personas que consumen drogas inyectables en todos los niveles del programa. Se ha capacitado a más de 200 personas de la comunidad para dirigir las actividades que comprenden desde el análisis de la situación a campañas de promoción de la causa y vigilancia del programa. El programa también ha reunido a diversos interesados directos, como expolíticos, consejeros, miembros del personal de salud pública y la comunidad, para crear un comité que ejerciera presión política en pro de la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas inyectables. Las actividades de empoderamiento fueron las siguientes:

- ejecución de programas de defensa de la causa con grupos pequeños en entornos no estigmatizados, como reuniones en un café local, que permiten una conversación más personal y significativa sobre los distintos temas;
- formación de redes dirigidas por los grupos de población clave, como Lalitpur Drug User Advocacy Network;
- vinculación de las personas que consumen drogas inyectables con los expertos y otros interesados directos pertinentes para facilitarles el acceso a la información adecuada sobre los programas y los presupuestos;
- movilización de personas capacitadas de la comunidad para participar en reuniones de consulta con organismos gubernamentales pertinentes y presión política sobre las entidades en las que recae el deber de garantizar la salud y los derechos humanos de las personas que consumen drogas inyectables.

Naya Goreto ha establecido asociaciones fuertes entre las personas que consumen drogas inyectables, lo que ha creado un sentimiento común de solidaridad para abordar en conjunto las cuestiones que las afectan directamente. Estas cuestiones ahora forman parte del plan de acción anual del gobierno local y las organizaciones de la sociedad civil. Se han obtenido partidas presupuestarias de las entidades del gobierno local para llevar a cabo los programas de concientización sobre las drogas que están a cargo de personas de la comunidad y están dirigidas, también, a la comunidad. Ahora, un miembro de la comunidad integra el Comité Distrital de Coordinación sobre el Sida. En cuanto a la sociedad civil, se ha creado una mayor conciencia positiva en la comunidad, por ejemplo, a través de los medios nacionales, acerca de las cuestiones que afectan a las personas que consumen drogas inyectables.

### Estudio de caso: Defensa la causa, liderazgo y empoderamiento a cargo de los jóvenes de grupos de población clave

Youth LEAD, curso de liderazgo NewGen, Asia y el Pacífico  
<http://youth-lead.org/>

Youth LEAD es una red creada y destinada a los jóvenes de grupos de población clave más afectados por el VIH en 20 países de Asia y el Pacífico. En el 2011, esta red creó el curso de liderazgo NewGen Asia, programa de cinco días de duración conducido por jóvenes y destinado a los jóvenes sobre defensa de la causa, liderazgo y empoderamiento. El curso fue sometido a pruebas piloto en Filipinas; las evaluaciones motivaron modificaciones y la elaboración de materiales didácticos. El siguiente año, se impartió a los instructores una capacitación de siete días, en la que participaron 21 personas de cinco países. Esta capacitación derivó en la ejecución de NewGen y la adaptación de las capacitaciones nacionales de Myanmar, Filipinas e Indonesia.

NewGen se vale de diversas actividades participativas para ayudar a los jóvenes a pensar con sentido crítico sobre la manera en que influye el entorno social, político e institucional en el bienestar de los integrantes de los grupos de población clave. Los participantes aprenden estrategias formales de promoción de la causa y de comunicación y el modo de utilizar los datos a través de la oratoria y la participación en reuniones como representantes de su comunidad.

En términos generales, los participantes opinan que el programa NewGen es muy bueno. Según ellos, la capacitación resulta particularmente útil para incorporar nuevas competencias de liderazgo y defensa de la causa, y la metodología de capacitación participativa les parece placentera. Mediante el trabajo y el aprendizaje conjuntos, los participantes desarrollan un sentido de comunidad. Los graduados del curso han ayudado a establecer nuevas redes comunitarias entre los jóvenes de los grupos de población clave en muchos países, a menudo a través de las redes sociales.

## 5.4 Violencia

### 5.4.1 Obstáculos

Se ha demostrado que la violencia contra las personas de los grupos de población clave es un factor de riesgo de la adquisición del VIH (36). Esta violencia es frecuente y puede adoptar diversas formas: física, sexual y psicológica (37). La violencia es producto tanto del desequilibrio que se observa en la dinámica de poder del género como del prejuicio y la discriminación contra las personas que, para los demás, están fuera de los parámetros convencionales del género y las normas y las identidades sexuales. Además, hay muchos otros factores estructurales que influyen en la vulnerabilidad a la violencia, como las leyes discriminatorias o duras y las prácticas policiales y las normas culturales y sociales que legitiman la estigmatización y la discriminación.

Las mujeres de los grupos de población clave, en particular las jóvenes, entre las que se incluyen aquellas que consumen drogas, las trabajadoras sexuales y las mujeres transgénero, presentan tasas particularmente altas de maltrato físico, abuso sexual y maltrato psicológico (38, 39, 40). Las tasas notificadas de violencia contra los trabajadores del sexo y las mujeres transgénero son altas (41, 42, 43) pero, de todas formas, es muy probable que estén subnotificadas donde se consideran ilegales algunos comportamientos de los grupos de población clave.

Por otra parte, está aumentando la violencia contra los homosexuales en algunos países, dado que se han aplicado más políticas y leyes que prohíben las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y consideran que esta práctica constituye un delito penal (44). Es probable que esta situación aumente el riesgo de transmisión del VIH (45).

### 5.4.2 Elementos facilitadores fundamentales

Los esfuerzos para abordar la violencia contra las personas de los grupos de población clave deben incluir a otros sectores además del sector de la salud. Juntos, deben crear un entorno favorable que promueva el bienestar emocional, sexual y físico, y la seguridad. Los elementos facilitadores fundamentales son aquellos mecanismos que permiten documentar y vigilar la violencia, capacitar a las personas de los grupos de población clave y otros interesados directos para que comprendan los derechos humanos, y fomentar la rendición de cuentas de los agentes del orden en cuanto a la prevención y la respuesta ante la violencia y las transgresiones de los derechos humanos (46).

#### Prevención de la violencia contra los grupos de población clave

Las prácticas de aplicación de las leyes pueden aumentar el riesgo de violencia que enfrentan los grupos de población clave. De hecho, hasta los propios agentes del orden pueden ser agresores. El trabajo con estos agentes puede incluir capacitación sobre los derechos humanos de los grupos de población clave así como promoción de la rendición de cuentas sobre las prácticas policíacas basadas en esos derechos (46). Los esfuerzos para prevenir la violencia pueden aplicarse mediante promoción de la causa en pro de reformar las leyes y las políticas que protegen los derechos y la seguridad de los grupos de población clave, aumentando la conciencia sobre los mecanismos de denuncia y las medidas disciplinarias, realizando talleres de sensibilización destinados a las personas que desempeñan una función central en la comunidad (por ejemplo, los funcionarios de gobierno, la policía, los medios de comunicación, los trabajadores de la salud y los líderes religiosos), mediante la creación de espacios seguros, y creando mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida con la participación de los miembros de los grupos de población clave de la comunidad, el personal de salud y los agentes del orden. La integración de los representantes de la comunidad en estos esfuerzos también ayuda a crear canales de comunicación entre los grupos de población clave, los funcionarios cívicos y la policía (47).

#### Apoyo a las víctimas de violencia

Las víctimas de violencia sexual necesitan un acceso oportuno a la atención médica específica, que consta de anticoncepción de urgencia, profilaxis posterior a la exposición al VIH y otras ITS, vacunación contra la hepatitis B y atención psicosocial y apoyo, así como derivación a la policía y los servicios jurídicos. Es recomendable que la prevención, el tratamiento y la atención de la infección por el VIH incluyan atención clínica y apoyo psicosocial para las víctimas de violencia, de conformidad con las directrices de la OMS de respuesta a la violencia sexual (46). Es probable que las víctimas deban recibir tratamiento de las lesiones físicas y atención de salud mental a más largo plazo. Los servicios de salud también pueden tomar pruebas médico-legales, que pueden facilitar el acceso de la víctima a la justicia. Los servicios de apoyo también pueden ofrecer líneas telefónicas de asistencia urgente atendidas por personas que fueron víctima de violencia sexual y recibieron capacitación para ofrecer apoyo psicosocial así como intervenciones de respuesta a las crisis, en las que participen equipos multidisciplinarios, que establezcan un vínculo entre las víctimas y los diversos servicios y espacios seguros (10).

También es importante vigilar y documentar los incidentes de violencia, tanto como pruebas para la promoción de la causa como para fundamentar la formulación de programas. La documentación de los niveles de violencia que enfrentan los grupos de población clave suele representar el primer paso de la concientización.

## Recomendaciones sobre buenas prácticas para reducir la violencia

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- La violencia contra las personas de los grupos de población clave debe prevenirse y abordarse conjuntamente con las organizaciones dirigidas por los grupos de población clave. Es esencial vigilar y denunciar todos los actos violentos contra las personas de los grupos de población clave, así como establecer mecanismos de resarcimiento para impartir justicia (10, 11, 12, 46).
- Todas las personas de los grupos de población clave que sean víctima de violencia deben tener acceso a servicios de salud y otros servicios de apoyo. En particular, las víctimas de violencia sexual deben disponer de un acceso oportuno a la atención integral de las violaciones, de conformidad con las directrices de la OMS.
- Es fundamental que los agentes del orden, los prestadores de atención de salud y asistentes sociales reciban capacitación para que puedan reconocer y defender los derechos humanos de los grupos de población clave y que rindan cuentas si violan estos derechos, en especial si perpetrar actos de violencia ellos mismos (10, 11, 12, 46).

### PERSONAS RECLUIDAS EN PRISIÓN Y OTROS ENTORNOS CERRADOS

- Las autoridades penitenciarias deben garantizar que la dotación de personal sea suficiente, la vigilancia sea eficaz y se cumplan las sanciones disciplinarias, y deben ofrecer programas de educación, trabajo y recreación para las personas recluidas en prisión.
- Las prisiones y otros entornos cerrados y su personal deben hacer todo lo posible por cambiar la cultura institucional que tolera la violación y otros tipos de violencia sexual. Las prisiones deben adoptar distintos métodos para combatir la violencia sexual, como las políticas y los programas de prevención (por ejemplo, intervenciones de educación de los prisioneros, de clasificación y estructurales, como mejor alumbrado, mejores duchas y mejores arreglos para dormir), la capacitación del personal, las investigaciones, las medidas disciplinarias, los servicios de apoyo a las víctimas (por ejemplo, salud médica y mental) y la documentación de los incidentes (12).

### Estudio de caso: Creación de asociaciones para abordar la violencia y mejorar el alfabetismo jurídico en la India

The Karnataka Health Promotion Trust (KHPT),  
<http://www.khpt.org/>

Abordar la violencia contra los trabajadores sexuales es una cuestión compleja que exige la colaboración entre organizaciones que tienen una misión similar. El Fondo para la Promoción de la Salud de Karnataka (KHPT) viene trabajando los últimos 10 años sobre la prevención de la infección por el VIH de los trabajadores sexuales de Karnataka (India). Los trabajadores sexuales han expresado claramente la necesidad de prevenir y responder a la violencia. KHPT ha sensibilizado a la policía y el poder judicial, y los ha instado a no perpetrar ni tolerar la violencia contra los trabajadores sexuales. En colaboración con KHPT:

- El Departamento de Bienestar de las Mujeres y los Niños del estado de Karnataka habilitó servicios de respuesta a la violencia contra la mujer para las trabajadoras sexuales.
- Las organizaciones de la comunidad trabajaron con los trabajadores sexuales en 30 distritos para alertarlos sobre sus derechos.
- El Foro Jurídico Alternativo y la Facultad Nacional de Derecho de la India crearon e impartieron capacitación sobre alfabetismo jurídico para los trabajadores sexuales.
- La organización no gubernamental Centro para la Promoción de la Causa y el Desarrollo (Center for Advocacy and Research) emprendió campañas de defensa de la causa en los medios de comunicación e instruyó a los trabajadores sexuales como portavoces para que hablaran sobre la violencia que enfrentan, su capacidad de recuperación y las medidas que sirven para prevenir y responder a la violencia.

## Lecturas recomendadas

- *Directrices del ONUSIDA para las asociaciones con la sociedad civil, incluidas las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave*. Ginebra, ONUSIDA, 2012. [http://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/JC2236\\_guidance\\_partnership\\_civilsociety\\_es\\_0.pdf](http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2236_guidance_partnership_civilsociety_es_0.pdf)
- *Chapter 2: Addressing violence against sex workers. En: Implementing comprehensive HIV/ STI programmes with sex workers: practical approaches from collaborative interventions*. Ginebra, OMS, 2013. [http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex\\_worker\\_implementation/en/](http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/)
- *Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services: guidance and recommendations*. Ginebra, OMS, 2014. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748\\_eng.pdf?ua](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748_eng.pdf?ua).
- *Evidence for action technical papers: effectiveness of interventions to address HIV in prisons*. Ginebra, OMS, UNODC, 2007. [http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190\\_eng.pdf?ua=1](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190_eng.pdf?ua=1)
- *Global Commission on HIV and the Law. HIV and the law: risks, rights and health*. Nueva York, PNUD, 2012. <http://www.hivlawcommission.org/index.php/report>
- *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. Ginebra, OMS, 2013. <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/index.html>
- *The human rights costing tool (HRCT): a tool to cost programs to reduce stigma and discrimination and increase access to justice*. Ginebra, ONUSIDA, 2012. [http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/data-and-analysis/tools/The\\_Human\\_Rights\\_Costing\\_Tool\\_v\\_1\\_5\\_May-2012.xlsm](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/data-and-analysis/tools/The_Human_Rights_Costing_Tool_v_1_5_May-2012.xlsm)
- *The user guide for the HIV-related human rights costing tool: costing programmes to reduce stigma and discrimination and increase access to justice in the context of HIV*. Ginebra, ONUSIDA, 2012. [http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/The\\_HRCT\\_User\\_Guide\\_FINAL\\_2012-07-09.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/The_HRCT_User_Guide_FINAL_2012-07-09.pdf)
- *UNAIDS guidance note: key programmes to reduce stigma and discrimination and increase access to justice in national HIV responses*. Ginebra, ONUSIDA, 2012. [http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/Key\\_Human\\_Rights\\_Programmes\\_en\\_May2012.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/Key_Human_Rights_Programmes_en_May2012.pdf)
- *Understanding and acting on critical enablers and development synergies for strategic investment*. Nueva York, PNUD, 2011. [http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2012/201211\\_UNAIDS\\_UNDP\\_Enablers\\_and\\_Synergies\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2012/201211_UNAIDS_UNDP_Enablers_and_Synergies_en.pdf)
- *Guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV*. Ginebra, OMS, 2013. <http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/adolescents/en/>



# PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

# 6

6.1	Panorama general .....	96
6.2	Estrategias fundamentales de prestación de los servicios .....	98
6.2.1	Integración de los servicios .....	98
6.2.2	Descentralización de los servicios .....	100
6.2.3	Delegación de funciones en la prestación de los servicios .....	101
6.2.4	Enfoques basados en la comunidad .....	102
6.3	Factores importantes que considerar cuando se prestan servicios a todos los grupos de población clave .....	105

## 6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### 6.1 Panorama general

El conjunto integral de intervenciones, descrito en los capítulos 3 y 4, está compuesto por intervenciones de salud comunes a todos los grupos de población clave así como de otros servicios para algunos grupos específicos. En su mayoría, estas intervenciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la infección por el VIH son las mismas que las destinadas a la población general (1), pero la ejecución y la prestación de estos servicios para los grupos de población clave suelen plantear problemas y obstáculos complejos, como ya se señaló en el capítulo 5. Es esencial que los programas aborden estos problemas y obstáculos, y ofrezcan servicios sostenibles de atención a la infección por el VIH que propicien el diagnóstico, la vinculación, la retención y el cumplimiento terapéutico de los grupos de población clave. Para potenciar los efectos positivos, estos servicios deben ser 1) **accesibles**, 2) **aceptables**, 3) **asequibles** y 4) **equitativos**. Además, es fundamental darlos a conocer entre las personas de los grupos de población clave.

Este capítulo se centra en los elementos de la prestación de los servicios que son importantes para el conjunto integral de intervenciones de salud destinadas a los grupos de población clave. En el recuadro 6.1 se indican varios instrumentos de la OMS que pueden guiar su aplicación.

#### Recuadro 6.1 Directrices de la OMS sobre métodos de prestación de servicios relacionados con el VIH

*Las Directrices unificadas sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH (1) proporcionan orientaciones amplias acerca de seis aspectos esenciales operativos y de prestación de los servicios:*

- cumplimiento del tratamiento antirretroviral;
- retención a lo largo del proceso continuo de atención;
- prestación de los servicios, que comprende la integración de servicios y la vinculación y la descentralización de la atención y el tratamiento de la infección por el VIH;
- recursos humanos, incluida la delegación de funciones;
- servicios de laboratorio y de diagnóstico;
- sistemas de gestión de compras y suministros.

#### Instrumentos de ejecución para respaldar la formulación de programas contra el VIH destinados a los grupos de población clave

La OMS y otros organismos de las Naciones Unidas han elaborado directrices normativas sobre la prevención, el tratamiento y la atención de la infección por el VIH de los grupos de población clave, que están reunidas en esta publicación. Para respaldar la ejecución de los programas contra el VIH destinados a estos grupos, estos organismos están colaborando para crear instrumentos de ejecución. El primero de estos instrumentos es el que se ocupa de la prevención de la infección por el VIH y otras ITS en los trabajadores sexuales (*Implementing comprehensive HIV/STI programmes*

*with sex workers: practical approaches from collaborative interventions*) (2). Se prevé que otras publicaciones aborden los programas contra el VIH destinados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas que consumen drogas inyectables y las personas transgénero. Además, la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas han creado instrumentos para respaldar la elaboración y la ejecución de intervenciones específicas, como los programas de distribución de agujas y jeringas (3).

### **Directrices regionales de la OMS sobre prestación de servicios para los grupos de población clave**

Las oficinas regionales de la OMS han creado instrumentos centrados en las prioridades y necesidades específicas de su región, como las que se detallan a continuación:

#### **Oficina Regional para África:**

*Preventing HIV in sex work settings in sub-Saharan Africa* (4) (sobre la prevención del VIH en los trabajadores sexuales)

#### **Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental:**

*MENAHRA: The Middle East and North Africa Harm Reduction Association best practices in strengthening civil society's role in delivering harm reduction services* (5) (sobre la reducción de los daños)

#### **Oficina Regional para Europa:**

*How to improve opioid substitution therapy implementation* (6) (sobre el tratamiento de sustitución de opioides)

#### **Oficina Regional para las Américas:**

*Improving access of key populations to comprehensive HIV health services* (7) (sobre el acceso de los grupos de población clave a servicios integrales de atención)

Proyecto para la provisión de atención integral a los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en América Latina y el Caribe (8)

#### **Oficina Regional para Asia Sudoriental:**

*Management of common health problems of drug users* (9) (sobre los problemas de salud de los consumidores de drogas)

*Priority HIV and sexual health interventions in the health sector for men who have sex with men and transgender people in the Asia–Pacific Region* (10) (sobre intervenciones de salud sexual para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las personas transgénero)

#### **Oficina Regional para el Pacífico Occidental:**

*Joint technical brief: HIV, sexually transmitted infections and other health needs among transgender people in Asia and the Pacific* (11) (sobre el VIH, las ITS y otras necesidades de salud de las personas transgénero)

*The time has come: enhancing HIV, STI and other sexual health services for MSM and transgender people in Asia and the Pacific* (12) (material para sensibilizar a los trabajadores de la salud respecto de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las personas transgénero)

*Regional assessment of HIV, STI and other health needs of transgender people in Asia and the Pacific* (13) (sobre el VIH, las ITS y otras necesidades de las personas transgénero)

## 6.2 Estrategias fundamentales de prestación de los servicios

A partir de las pruebas científicas y la experiencia, la OMS recomienda tres estrategias generales que pueden mejorar la prestación de los servicios: 1) la integración, 2) la descentralización y 3) la delegación de funciones. Estas estrategias, por separado o en combinación, pueden mejorar la accesibilidad de la atención. Los enfoques comunitarios y aquellos dirigidos por la comunidad y centrados en ella son un componente esencial de estas estrategias, en particular para los grupos de población clave. Dada la heterogeneidad de estos grupos y de los contextos sociales y epidemiológicos, su aplicación deberá basarse en una evaluación coyuntural y en consulta con los grupos de población clave y los prestadores de servicios.

### 6.2.1 Integración de los servicios

La OMS recomienda integrar los servicios de atención de la infección por el VIH con muchos otros servicios clínicos que sean pertinentes, como los relativos a la tuberculosis, la salud maternoinfantil, la salud sexual y reproductiva y el tratamiento de las drogodependencias (1).

La integración de los servicios propicia la prestación de atención integral y uniforme, y permite a las personas ocuparse de las diversas necesidades de salud al mismo tiempo y en el mismo lugar.

La OMS recomienda integrar los servicios de atención de la infección por el VIH con otros servicios clínicos pertinentes, como los relativos a la tuberculosis, la salud maternoinfantil, la salud sexual y reproductiva y el tratamiento de las drogodependencias.

La integración entraña no solo prestar servicios relacionados en un único entorno sino también establecer sistemas de vinculación para intercambiar información e instaurar vías de derivación entre los distintos entornos y prestadores (1). La colaboración entre los programas en todos los niveles del sistema de salud es fundamental para lograr la aplicación satisfactoria de los servicios relativos al VIH y otros servicios sociales y de salud relacionados.

Algunos aspectos de la coordinación que es preciso tener en cuenta comprenden la movilización y la asignación de recursos; la capacitación, la tutoría y la supervisión del personal de salud; la compra y la gestión de los medicamentos y otros suministros médicos; y el seguimiento y la evaluación. La meta de la planificación programática debe ser crear sistemas de prestación que faciliten más el acceso.

### Recomendaciones y orientaciones

#### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

##### Administración de tratamiento antirretroviral en la atención prenatal, materna e infantil

- En los entornos donde la epidemia es generalizada, se recomienda comenzar a administrar y mantener el tratamiento antirretroviral a las mujeres que reúnan los criterios durante el embarazo y después del parto, así como a los lactantes, en los entornos de atención de salud de la madre, el recién nacido y el niño, y vincularlas y derivarlas a la atención continua de la infección por el VIH y el tratamiento antirretroviral si corresponde (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (1).

##### Administración de tratamiento antirretroviral en los entornos de atención de la tuberculosis y administración de tratamiento contra la tuberculosis en los entornos de atención de la infección por el VIH

- En los entornos donde los enfermos de tuberculosis presentan alta prevalencia de la infección por el VIH ( $\geq 5\%$ ), se recomienda comenzar a administrar el tratamiento antirretroviral a los pacientes seropositivos al VIH que tienen tuberculosis a través de los servicios de atención de la tuberculosis, así como vincularlos a la atención continua de la infección por el VIH y el tratamiento antirretroviral (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (1).
- En los entornos que presentan una carga alta de tuberculosis e infección por el VIH, hay que administrar tratamiento contra la tuberculosis a las personas con VIH a través de la atención de la infección por el VIH si también se les ha diagnosticado tuberculosis (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (1).

## PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

Tratamiento antirretroviral en los entornos que proporcionan tratamiento de sustitución de opioides

- En los entornos donde se proporciona tratamiento de sustitución de opioides, se recomienda comenzar a administrar y mantener el tratamiento antirretroviral a las personas que tienen VIH y que reúnen los criterios para recibirlo (*recomendación firme, calidad muy baja de la evidencia*) (1).

### Estudio de caso: Servicios integrados para trabajadoras sexuales en Zimbabwe

CeSHHAR, Zimbabwe

<http://www.ceshhar.co.zw>

El Centro de la Salud Sexual e Investigación sobre el VIH/sida (CeSHHAR), organización no gubernamental de Zimbabwe, lleva adelante el programa "Hermanas con una voz", que presta servicios integrados a las trabajadoras sexuales en diversos sitios de Zimbabwe en nombre del Consejo Nacional del Sida. La colaboración con los ministerios gubernamentales pertinentes (de sida, salud y bienestar social) y la participación de las trabajadoras sexuales en la ejecución han contribuido enormemente a la eficacia del programa.

Apoyado por una red de educadoras de pares capacitadas sobre movilización participativa y empoderamiento de la comunidad, este programa ofrece pruebas de detección del VIH y asesoramiento conexo, tratamiento sintomático de las ITS, anticonceptivos, educación de salud y asesoramiento jurídico. Además, está comenzando a ofrecer tamizaje del cáncer cervicouterino y capacitando a las enfermeras en técnicas de inspección visual y tratamiento de las lesiones precancerosas con crioterapia.

Las educadoras de pares conducen las sesiones de movilización de la comunidad. En las 36 sesiones, se tratan temas propios de las trabajadoras sexuales (el autoestima, el cambio de comportamientos, la anticoncepción, el VIH y el cáncer cervicouterino), temas relativos a los clientes y las parejas (la comunicación, la confianza en sí mismas, la discordancia serológica, las redes sexuales y las parejas múltiples concurrentes) y temas relativos a la "hermandad entre mujeres" (la defensa de la causa, el estigma, los derechos y el apoyo).

Desde el año 2009, el programa ha pasado de aplicarse en cinco centros a una red integral de 36 centros en todo el país. Antes del 2013, los seis establecimientos fijos y 30 centros de extensión habían atendido en total a más de 14.000 mujeres. Por otra parte, en un centro donde se realizaron dos encuestas poblacionales, la proporción de mujeres seronegativas al VIH que refirió haberse realizado una prueba reciente de detección del VIH ascendió del 35% en el 2011 a más del 70% en el 2013. En ese mismo período, la proporción de mujeres con VIH que recibían tratamiento antirretroviral aumentó del 28% al 45%.

En el siguiente estudio de caso, se brinda un ejemplo de la integración de los servicios, en el cual se prestan servicios de salud específicos para las personas transgénero dentro de un establecimiento de salud general.

### Estudio de caso: Servicios integrales para las personas transgénero a través de consultorios en la comunidad

Transgender Family Program (programa de salud familiar transgénero), Community Health Network, Estados Unidos de América  
<http://www.chnyc.org/>

El programa de salud familiar transgénero (Transgender Family Program) comenzó a funcionar en el 2004 en los consultorios de la red Community Health Network de la ciudad de Nueva York para mejorar el acceso a la prevención de la infección por el VIH y la vinculación a la atención primaria de salud.

Para definir la mejor manera de ofrecer los servicios integrales para las personas transgénero a través de consultorios para la comunidad general, esta red analizó las características de la comunidad, efectuó consultas, habilitó foros y estudió programas similares para aprender de ellos. Es importante señalar que el programa solicitó a los pacientes que formaran una junta asesora que ayudara a guiar la integración y la ejecución de los servicios para la comunidad transgénero.

Los servicios integrados comprenden atención específica para las personas transgénero, pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente, atención médica integral, apoyo al cumplimiento terapéutico, detección y tratamiento de las ITS, intervenciones de prevención y servicios de salud mental y de nutrición. Además, el programa asesora sobre estrategias para reducir los riesgos, coordina grupos de apoyo, ofrece actividades de extensión, talleres educativos bilingües y derivación a servicios jurídicos y sociales. Para contratar al personal y las personas transgénero capacitadas para guiar las actividades, utiliza contactos presenciales, actividades en la comunidad y métodos en línea, como anuncios y publicaciones en redes sociales. Asimismo, el programa alienta a los pacientes a que fomenten la participación de su familia, estrategia que ha resultado importante para promover el acceso y la asistencia al consultorio.

Más de 750 personas transgénero han recibido servicios específicos, cuyos beneficios han sido, entre otros, los siguientes:

- mejor tolerancia, sensibilidad y aceptación a largo plazo de esta población en la sociedad general;
- mejor accesibilidad debido a la ubicación conveniente de los servicios;
- horas de atención flexibles como resultado de una mayor capacidad;
- mayor acceso a una variedad de servicios internos de apoyo.

Además, una evaluación exhaustiva ha revelado una disminución significativa de la prostitución, el intercambio de agujas, las inyecciones de hormonas no reguladas, así como una mayor probabilidad del uso regular de preservativos.

## 6.2.2 Descentralización de los servicios

El objetivo de la descentralización es acercar todos los servicios de atención de la infección por el VIH a los destinatarios. En muchos entornos, el costo del transporte y los prolongados períodos de espera en los hospitales centrales dificultan significativamente el acceso a los servicios y la retención en la atención. En las zonas rurales en particular, la descentralización puede facilitar el acceso, disminuir los costos de transporte y acortar los períodos de espera. Si se planifica y ejecuta cuidadosamente, la descentralización puede proporcionar opciones de atención de salud más seguras, discretas y más accesibles, en especial para los grupos de población clave. Sin embargo, quizá no siempre resulte apropiado o aceptable descentralizar los servicios destinados a estos grupos. En algunos entornos los servicios generales de atención de la infección por el VIH pueden proporcionar un grado mayor de anonimato.

La OMS recomienda descentralizar los servicios de tratamiento antirretroviral específicamente. También puede considerarse la descentralización de una amplia gama de servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, atención y apoyo destinados a los grupos de población clave. Descentralizar la atención y el tratamiento de la infección por el VIH puede fortalecer aún más la participación de la comunidad, puede vincular las intervenciones de la comunidad con los establecimientos de salud y puede mejorar el acceso a los servicios, la búsqueda de atención y la retención en la atención (1).

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Se recomienda considerar las siguientes opciones para descentralizar el comienzo y el mantenimiento del tratamiento antirretroviral:
  - Comenzar el tratamiento antirretroviral en los hospitales y continuar con el mantenimiento en establecimientos de salud periféricos (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*).
  - Comenzar el tratamiento antirretroviral en establecimientos de salud periféricos y continuar con el mantenimiento también en estos establecimientos (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*).
  - Comenzar el tratamiento antirretroviral en establecimientos de salud periféricos y continuar con el mantenimiento al nivel de la comunidad entre las visitas regulares a los consultorios (es decir, fuera de establecimientos de salud, en entornos como sitios de extensión, puestos de salud, servicios en el hogar u organizaciones de la comunidad) (*recomendación firme, calidad moderada de la evidencia*) (1).

### Estudio de caso: Servicios móviles de extensión para trabajadoras sexuales en Sudáfrica

Re-Action Consulting, Sudáfrica  
<http://www.re-action.co.za>

Junto con el Departamento de Salud, Re-Action! está a cargo de un programa quinquenal para disminuir las nuevas infecciones por el VIH en las trabajadoras sexuales y sus clientes en dos distritos rurales de la provincia de Mpumalanga de Sudáfrica. Actualmente, el programa llega a cerca de 4100 trabajadoras sexuales.

Un equipo de enfermería ofrece a través de un consultorio móvil varios servicios gratuitos, como tamizaje de los riesgos de salud y pruebas de detección (prueba de CD4 en el lugar de la atención), pruebas de detección del VIH y asesoramiento, atención y tratamiento, y derivación a otros servicios sociales y de salud. El equipo visita los lugares al menos dos veces por semana en momentos que son cómodos para sus pacientes. Con la ayuda de un calendario de 28 días, las trabajadoras sexuales saben dónde pueden obtener los servicios en caso de urgencia. De ser necesario, la enfermera puede prestar los servicios, por ejemplo, administrar el tratamiento antirretroviral, en el lugar de trabajo de las mujeres.

Las enfermeras que reciben capacitación sobre la forma de iniciar el tratamiento antirretroviral y administrarlo pueden diagnosticar, estadificar e inscribir a las mujeres en los servicios apropiados de tratamiento antirretroviral. Además, les entregan la medicación del Departamento de Salud y las visitan para hacerles el seguimiento y enseñarles acerca del cumplimiento terapéutico. Cuando alguna mujer abandona el tratamiento, los trabajadores de sensibilización comunitaria brindan asistencia y seguimiento. El programa tiene una tasa de abandono muy baja, del 2,3%, cuya mayoría se atribuye a que las mujeres se mudan a otro lugar.

### 6.2.3 Delegación de funciones en la prestación de los servicios

La delegación de funciones puede permitir la atención de más personas con la fuerza laboral existente.

La delegación de funciones consiste en redistribuir de manera racional las tareas entre los trabajadores de la salud. De esta manera, se reasignan las tareas del personal de salud sumamente capacitado a los agentes de menor capacitación y menos formación profesional complementaria (1). Dado que en muchos países escasea el personal de salud, la delegación de funciones puede aumentar la eficacia y la eficiencia del personal, lo

que puede permitir la atención de más personas con la fuerza laboral existente. Las organizaciones dirigidas por la comunidad también pueden ser importantes para llegar a los grupos de población clave, comprometerse con ellos, vincularlos a los servicios y prestarles atención y apoyo continuos.

Los agentes que brindan apoyo de pares pueden prestar servicios valiosos y vincular a la comunidad con los servicios de salud. Como otros trabajadores de la salud, deben recibir capacitación regular, tutoría y supervisión (1), además de un salario suficiente y otros incentivos apropiados (14).

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

- Los profesionales clínicos no médicos, las parteras y las enfermeras que cuenten con la capacitación necesaria pueden dar inicio al tratamiento antirretroviral de primera línea (*recomendación firme, calidad moderada de la evidencia*).
- Los profesionales clínicos no médicos, las parteras y las enfermeras que cuenten con la capacitación necesaria pueden ocuparse del mantenimiento del tratamiento antirretroviral (*recomendación firme, calidad moderada de la evidencia*).
- Los trabajadores de la salud de la comunidad que cuenten con la capacitación necesaria y estén supervisados pueden dispensar tratamiento antirretroviral entre las visitas regulares a los consultorios (*recomendación firme, calidad moderada de la evidencia*) (1).

### Estudio de caso: Distribución de naloxona a la comunidad en la India

Social Awareness Service Organisation (SASO), Manipur, India  
<http://sasoiimphal.org/>

Desde el año 2000, en el estado de Manipur (India), Social Awareness Service Organisation (SASO) ha proporcionado, entre otros servicios, tratamiento gratuito con naloxona para las sobredosis de opioides, a través de centros de extensión (por ejemplo, en salas de consumo supervisado de drogas) y de acogida. Además, mediante reuniones pequeñas, contactos individuales y orientación, esta organización suministra información y educación acerca de las sobredosis de drogas y su tratamiento a todas las personas que consumen drogas inyectables y a los miembros de su familia.

El programa fue ampliado y fortalecido durante los años 2008 y 2009 cuando incluyó a los interesados directos más importantes para facilitar la distribución a la comunidad de la naloxona con el fin de garantizar una cobertura mayor. Los cuestionamientos de índole ética acerca de que personal no médico dispensara farmacoterapia a las personas que consumen drogas inyectables fueron superados cuando se demostró que esta medida salva la vida de las personas. Entre el 2004 y el 2012, se manejaron más de 450 sobredosis en cinco centros, y se salvó la vida a más del 90% de los afectados. Además, más de un tercio de los afectados por sobredosis tienen más acceso a farmacoterapia y otros tipos de atención, como las pruebas de detección del VIH y el VHC y el tratamiento con antirretrovirales.

## 6.2.4 Enfoques basados en la comunidad

Los enfoques de la prestación de los servicios basados en la comunidad pueden aumentar la accesibilidad y la aceptabilidad para los grupos de población clave. Los enfoques que se valen de las actividades de extensión, los servicios móviles, los centros de acogida y los puntos de reunión posibilitan llegar a quienes tienen un acceso limitado a los establecimientos de salud formales o están infraatendidos. Estos enfoques habilitan vinculaciones y derivaciones fundamentales entre la comunidad y los establecimientos de salud, y respaldan la descentralización (véase la sección 6.2.2). Los programas basados en la comunidad también pueden ser aquellos dirigidos y ejecutados por miembros de los grupos de población clave. El personal, que puede estar conformado por pares, que interviene en los enfoques basados en la comunidad debe recibir el apoyo apropiado, tanto en términos de capacitación, supervisión y gestión como de incentivos y remuneración.

**La comunidad**  
desempeña una función  
vital en la respuesta al VIH.

Se ha demostrado que los **servicios dirigidos por la comunidad**, en los cuales los miembros de la comunidad toman la delantera en las actividades de extensión y supervisan un programa de prevención de la infección por el VIH, aportan beneficios significativos en cuanto a los resultados relativos al VIH. También permiten a los miembros de la comunidad abordar los obstáculos estructurales que impiden el ejercicio de sus derechos y los dotan de poder para cambiar las normas sociales, por lo que disminuyen las vulnerabilidades que trascienden la cuestión del VIH.

Los servicios dirigidos por la comunidad son intervenciones formuladas, suministradas y controladas por miembros de la comunidad, que pueden desempeñar muchas funciones, por ejemplo:

- dar acceso adecuado y fiable a los productos básicos (preservativos, lubricantes y agujas y jeringas) y los servicios clínicos a través de las actividades de extensión y las derivaciones;
- responder a la violencia contra los miembros de la comunidad y poner en marcha otras intervenciones estructurales;
- brindar apoyo para que las personas de la sociedad sepan administrar correctamente naloxona si presencian una sobredosis de opioides;
- promover el cambio comportamental y social que fortalezca no solo el conocimiento sino también las competencias y los sistemas para mantener los programas de prevención y retención en la atención y el tratamiento;
- ofrecer medios formales e informales para que los miembros de la comunidad aporten su opinión sobre la calidad de los servicios y se comprometan con los servicios más allá del programa contra el VIH (2).

Las **intervenciones a cargo de pares** o dirigidas por pares constituyen un método importante de prestar los servicios e intercambiar información y competencias que promuevan los comportamientos menos riesgosos entre las personas y las redes de los grupos de población clave. Además de prestar servicios, los pares pueden actuar como modelos y ofrecer un apoyo respetuoso y libre de prejuicios que puede ayudar a disminuir el estigma, lo que facilita el acceso a los servicios y mejora su aceptabilidad.

## Recomendaciones y orientaciones

### TODOS LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

La OMS recomienda que, en los distintos entornos epidémicos de la infección por el VIH, además de las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente iniciados por los prestadores de atención de salud, los trabajadores comunitarios ofrezcan a los grupos de población clave las pruebas de detección y el asesoramiento, así como la vinculación a los servicios de prevención, atención y tratamiento (*recomendación firme, calidad baja de la evidencia*) (1).

### PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS INYECTABLES

En la sección 4.1.2.4 se ofrecen recomendaciones específicas sobre el apoyo de pares y la entrega de naloxona en la comunidad.

### ADOLESCENTES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Los enfoques basados en la comunidad pueden mejorar el cumplimiento terapéutico y la retención en la atención de los adolescentes con VIH (*recomendación condicional, calidad muy baja de la evidencia*) (15) (véase el recuadro 6.2).

## Estudio de caso: Centros de prestación de servicios dirigidos por la comunidad en Pakistán

Naz Male Health Alliance, Pakistán

Naz Male Health Alliance es una organización comunitaria de Pakistán que atiende a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas transgénero. Como parte de su trabajo continuo para empoderar a la comunidad, la organización tiene a su cargo seis centros de prestación de servicios en cinco ciudades, donde están inscritos 47.000 pacientes. Cada centro de prestación alberga un consultorio y un centro de acogida que brinda una atmósfera segura y tranquila a los beneficiarios de ingresos bajos. Los centros están ubicados estratégicamente cerca de las zonas donde hay mayor número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y donde hay mayor concentración de hijras deras (viviendas de transexuales). Los centros de acogida y las actividades de extensión son complementarias: los centros de acogida permiten establecer relaciones más prolongadas con los beneficiarios y las actividades de extensión proporcionan vinculación con el centro de acogida.

Los centros de prestación de servicios para cada comunidad de población clave están separados de los demás con el fin de atender eficazmente sus necesidades diferentes. Cada centro cuenta con personal multidisciplinario compuesto por cerca de 15 personas, entre médicos especialistas en ITS, un psicólogo y educadores de pares. Los equipos están conformados principalmente por miembros de la comunidad; más del 95% del personal está compuesto por hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero.

### Recuadro 6.2 Adolescentes de los grupos de población clave

Los métodos de prestación de los servicios y las consideraciones tratadas en este capítulo para todos los grupos de población clave también son aplicables a los adolescentes de estos grupos, pero es preciso considerar algunos aspectos más específicos. Es esencial que los servicios destinados a los adolescentes de estos grupos de población sean concebidos y prestados de maneras que tengan en cuenta las múltiples vulnerabilidades superpuestas a las que están expuestos estos adolescentes y la diversidad de sus necesidades, determinadas por su edad, su comportamiento específico y las complejidades de su contexto social y jurídico.

Las consideraciones y los métodos específicos que hay que añadir a las prestaciones destinadas a los adolescentes de los grupos de población clave comprenden:<sup>1</sup>

- Reconocer y aprovechar los puntos fuertes, las competencias y las capacidades de los adolescentes de los grupos de población clave, en particular su capacidad para enunciar los servicios que necesitan. Es fundamental hacerlos partícipes de las decisiones acerca de los servicios, reconociendo que su capacidad está en evolución y que tienen derecho a que se tenga en cuenta su opinión. Esta es una consideración importante cuando se abordan cuestiones relativas a la obtención del consentimiento de un progenitor para que reciban los servicios y el tratamiento (véase la sección 5.1.2).
- Priorizar los mejores intereses de la población joven en todas las leyes y políticas encaminadas a proteger sus derechos (Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3) (16).
- Aprovechar al máximo los servicios y la infraestructura existentes para la población joven y añadir elementos que permitan llegar y prestar servicios a los adolescentes de los grupos de población clave, procurando que los servicios sean acordes tanto para ellos como para otros jóvenes.
- Adoptar un enfoque multidisciplinario, procurando que los servicios sean lo más integrales posible para abordar las vulnerabilidades superpuestas.

<sup>1</sup> Véase también la información sobre los jóvenes de los grupos de población clave en el apéndice número 6 publicado en la página web de la OMS.

- Suministrar información adaptada al desarrollo y la educación a los adolescentes de los grupos de población clave, centrándose en la reducción de los riesgos basada en conocimientos prácticos. La información puede difundirse por múltiples medios, como internet, teléfonos móviles y métodos participativos.
- Prestar apoyo psicosocial, mediante orientación, apoyo de grupos y redes de pares, para abordar el autoestigma y la discriminación y otros problemas de salud mental. Quizá sea importante ofrecer orientación también a la familia, como al padre y a la madre —si corresponde y así lo solicita el adolescente— para respaldar y facilitar el acceso a los servicios, especialmente donde es preciso obtener el consentimiento paterno o materno (7).
- Facilitar el acceso a los servicios sociales y los beneficios públicos, como el albergue inmediato y la vivienda a largo plazo, y abordar los problemas de seguridad alimentaria, por ejemplo, mediante evaluaciones nutricionales.
- Apoyar el acceso a actividades de desarrollo vocacional y fortalecimiento económico y alentar a los adolescentes a permanecer en escuela o, si ya la abandonaron, a retomar los estudios, si corresponde.
- Abordar las normas sociales y el estigma en cuanto a la sexualidad, la identidad de género y la orientación sexual impartiendo educación integral sobre la sexualidad en las escuelas, suministrando información propicia a las familias, capacitando a los educadores y prestadores de atención de salud, e instaurando políticas laborales antidiscriminatorias.

### 6.3 Factores importantes que considerar cuando se prestan servicios a todos los grupos de población clave

En resumen, para garantizar el acceso, la aceptabilidad y la asequibilidad, es necesario tener en cuenta muchos elementos específicos en los procesos de formulación y ejecución de programas. Si se tienen en cuenta todos estos elementos, conforme al contexto específico, se lograrán programas que atiendan mejor a los grupos de población clave.

#### ACCESO

##### Generar demanda

Es posible generar demanda en los servicios de diagnóstico y prevención del VIH, mediante campañas dirigidas en los entornos donde residen los grupos de población clave, utilizando estrategias de alcance comunitario, tecnologías de telefonía móvil, redes sociales y medios de comunicación (incluso en línea).

##### Estudio de caso: Estrategias en línea para aumentar la captación de las pruebas de detección del VIH y el asesoramiento correspondiente en Bangkok

Centro de Investigación sobre el Sida de la Cruz Roja en Tailandia, Bangkok, Tailandia  
<http://en.trcarc.org/>

En Bangkok, la clínica de salud masculina presta servicios integrales y adaptados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Una de sus estrategias a fin de aumentar el acceso a los servicios para el diagnóstico del VIH ha sido la creación en el 2011 del primer sitio web bilingüe (tailandés e inglés) destinado a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, en el que se combina la educación con el entretenimiento (<http://adamslove.org>).

La meta de este sitio web es promover que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se realicen la prueba de detección del VIH de manera regular. Para vincular a los visitantes del sitio web con estos servicios, una sección titulada “dónde se puede hacer la prueba del VIH cerca suyo” ofrece información sobre los centros

amigables para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en los que se pueden hacer la prueba en Bangkok y en otras provincias. Otras formas de crear demanda continua de estos servicios son los medios de comunicación y las actividades en los medios orientadas a este grupo, como la publicación regular de secciones en revistas para homosexuales, las intervenciones dirigidas por pares y los encuentros en los que los asistentes pueden interactuar con personas famosas y realizarse la prueba del VIH.

El número de personas que han recibido servicios para el diagnóstico del VIH ha aumentado casi cinco veces, de 967 en el 2008 a 4.371 en el 2012. El sitio web ha atraído a más de 500.000 visitantes en dos años y también tiene su propia página de Facebook, en la que tiene más de 15.000 seguidores. Una cuarta parte de las personas que recurren a la clínica de salud masculina refieren que han recibido los servicios a causa del sitio.

### Abordar los obstáculos por la edad

Es preciso examinar las leyes sobre la edad de consentimiento para determinar su efecto sobre el acceso a los servicios. Los países pueden considerar la posibilidad de revisar las políticas sobre la edad de consentimiento y crear excepciones para los límites impuestos (es decir, figura de menor maduro). Los países también pueden considerar cuál es la mejor manera de evaluar la capacidad de los adolescentes para dar su consentimiento.

### Acercar los servicios a sus destinatarios

Los programas pueden considerar la conveniencia de ofrecer servicios con unidades móviles y en centros de acogida, así como durante el fin de semana o por la noche para facilitar el acceso. Los programas de extensión, como los que se aplican en los puntos de reunión y en visitas a domicilio, también pueden aumentar el acceso

### Descentralizar los servicios

El traspaso de los servicios de instituciones centralizadas a establecimientos de salud periféricos en la comunidad o unidades móviles de extensión puede aumentar el acceso. Por ejemplo, la educación sexual en la escuela, el asesoramiento a cargo de pares y las actividades desarrolladas en la comunidad pueden difundir mensajes sobre el comportamiento, promover el seguimiento de las derivaciones a los servicios, mejorar el cumplimiento terapéutico y aumentar la participación de las personas en su propia atención de salud.

### Estudio de caso: La descentralización facilita el acceso temprano a servicios para el VIH en Viet Nam

Autoridad de control del VIH/sida del Ministerio de Salud de Viet Nam y Oficina de la OMS en Viet Nam

En el 2012, la autoridad de control del VIH/sida del Ministerio de Salud de Viet Nam comenzó a realizar pruebas piloto sobre un proyecto para ampliar el acceso temprano a los servicios de atención del VIH en los grupos de población clave, en particular las personas que consumen drogas inyectables, con el fin de potenciar los beneficios terapéuticos y preventivos del tratamiento antirretroviral permitiendo a las personas comenzar el tratamiento lo antes posible. El proyecto piloto incluía descentralizar los servicios de diagnóstico del VIH de los establecimientos distritales a los puestos de salud comunales de las provincias Dien Bien y Can Tho. El proyecto piloto introdujo algunas innovaciones en Viet Nam, como una forma farmacéutica de antirretrovirales combinados en dosis fija, pruebas de detección del VIH y análisis de CD4 en el lugar de la atención, y seguimiento descentralizado.

El proyecto logró el compromiso activo de asociados de la comunidad, como los educadores de pares, los grupos de autoapoyo y los trabajadores de salud comunitarios, impartiendo capacitación sobre movilización de la comunidad y celebrando reuniones periódicas para analizar las actividades de extensión y los retos que surgían. El personal de los puestos de salud comunitarios recibió capacitación sobre la prestación de servicios para el VIH, como las pruebas rápidas de detección, el asesoramiento antes y después de la prueba, el seguimiento del cumplimiento terapéutico, la atención básica y la dispensación de los medicamentos antirretrovirales.

Este modelo descentralizado basado en la comunidad ha logrado promover el diagnóstico y el tratamiento tempranos. Las personas diagnosticadas en las comunidades presentan una mediana de linfocitos CD4 significativamente mayor cuando comienzan el tratamiento antirretroviral (mediana de 294 linfocitos/mm<sup>3</sup>) que quienes obtienen el diagnóstico en el distrito (mediana de 88 células/mm<sup>3</sup>). Las actividades de extensión comunitaria y de fomento de la confianza se consideran fundamentales para facilitar el acceso temprano a los servicios para el VIH en las personas que consumen drogas inyectables.

### **Integrar los servicios y garantizar las derivaciones y el vínculo con la atención**

La integración de los servicios, incluidos los servicios integrales para el diagnóstico y la atención del VIH y servicios integrales para el VIH y la drogodependencia (por ejemplo, los programas de tratamiento de sustitución de opioides y de distribución de agujas y jeringas), los hace más cómodos y facilita el acceso. Para reducir la pérdida en el seguimiento, los protocolos estándares de trabajo deben especificar la vinculación con la atención y ayudar con el traslado desde los servicios de diagnóstico a los servicios que proporcionan el tratamiento antirretroviral. Los sistemas que intercambian información entre clínicas (por ejemplo, clínicas para la tuberculosis y el VIH), el empleo de trabajadores de sensibilización comunitaria para el seguimiento y el apoyo entre pares pueden facilitar la retención en la atención.

### **Estudio de caso: Promoción de la realización regular de pruebas de detección y apoyo a la vinculación con la atención en España**

Proyecto dels NOMS-Hispanosida (BCN Checkpoint), España  
<http://www.bcnccheckpoint.com/>

BCN Checkpoint es un centro comunitario ubicado en una zona homosexual de Barcelona que ofrece servicios para el diagnóstico del VIH y otras ITS a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Administrado por la organización no gubernamental Proyecto dels NOMS- Hispanosida, BCN Checkpoint ofrece pruebas rápidas del VIH y la sífilis efectuadas por pares de manera gratuita para lograr el diagnóstico temprano, vacunación contra las hepatitis A y B y promoción de la salud sexual. Para promover la realización anual de la prueba del VIH, BCN Checkpoint envía recordatorios por correo electrónico, mensajes de texto y de manera telefónica.

Entre el 2007 y el 2013, el programa realizó más de 22.000 pruebas del VIH, detectando 756 nuevas infecciones durante ese período. Para quienes tienen un resultado positivo, BCN Checkpoint ofrece un programa de información y educación con consejeros capacitados pares que tienen VIH y ofrece derivaciones para el seguimiento en una unidad hospitalaria de tratamiento en un plazo máximo de una semana. Para garantizar la vinculación con la atención, se hace el seguimiento de todos los hombres diagnosticados recientemente mediante un registro. En la actualidad, casi el 90% es derivado directamente a la atención, mientras que un 5% busca atención por su propia cuenta y cerca del 4% están de paso en Barcelona, por lo que obtienen atención donde residen. Menos del 2% se pierde en el proceso de vinculación con la atención.

### **Invertir en los elementos facilitadores fundamentales**

Los países pueden respaldar el acceso de los grupos de población clave a los servicios invirtiendo en los elementos facilitadores fundamentales, como el tratamiento integrado y los programas de educación sobre los derechos, los servicios jurídicos, los programas para reducir la estigmatización y la discriminación, y la capacitación para los trabajadores de la salud y los agentes del orden.

### **Estudio de caso: Uso de redes sociales en Ghana para llegar a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres**

Proyecto SHARPER, FHI360, Ghana

<http://www.fhi360.org/projects/strengthening-hiv-aids-response-partnership-evidenced-based-resultssharp>

En el proyecto SHARPER se hicieron pruebas piloto sobre el uso de las redes sociales por parte de trabajadores de enlace con la comunidad para detectar las redes marginadas de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. El proyecto creó MSM.net en dos ubicaciones mediante el mapeo informal de las redes de la comunidad. Los trabajadores de enlace con la comunidad fueron seleccionados de zonas que no habían sido cubiertas por educadores de pares y recibieron capacitación sobre el VIH, información y servicios de salud. Utilizaron las redes sociales desde teléfonos inteligentes y computadoras portátiles para llegar a este grupo de población. El alcance fue definido como exitoso si el destinatario recibía evaluación de riesgos, información sobre prevención del VIH y una derivación para los servicios diagnósticos del VIH (u otro servicio relacionado con el VIH).

En el 2013, se llegó a más de 15.000 de estos hombres mediante Facebook (45,6%), WhatsApp (13,4%) y otras plataformas de redes sociales. En Accra, el 82% de los hombres a los que llegó esta intervención no había tenido contacto anterior con un educador de pares. En Kumasi, el 66% nunca había recibido ninguna intervención. El trabajador de enlace con la comunidad en Accra identificó ocho burdeles y redes de trabajadores sexuales varones que eran desconocidos para el proyecto y otras organizaciones de este grupo de población.

Las redes sociales resultaron un medio importante para llegar a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a los que generalmente no llegarían los educadores de pares. Los hombres a los que llegaron los trabajadores de enlace con la comunidad por lo general eran mayores, con un mayor nivel de escolaridad, solteros, con un ingreso económico mensual más alto y pertenecían a una red social más grande de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (en Accra) que aquellos vistos por los educadores de pares.

## ACEPTABILIDAD

### Capacitar a los prestadores de atención de salud

Sensibilizar y capacitar a los prestadores de atención de salud (trabajadores comunitarios, trabajadores de sensibilización entre pares, personal de apoyo y gerencia) sobre cuestiones específicas de los grupos de población clave y prácticas no discriminatorias y formas de eliminar la estigmatización mediante la capacitación antes y durante el servicio, material de apoyo, supervisión de apoyo y seguimiento de la capacitación. De ser posible, la capacitación debe incluir a representantes de los grupos de población clave.

### Crear un entorno propicio y seguro

Los espacios seguros (tanto para la atención de salud como para los servicios sociales) y los entornos confidenciales y sin estigmatización pueden promover el acceso de las personas de los grupos de población clave. Por ejemplo, las entradas separadas y bien iluminadas o la ubicación de los servicios en un entorno apropiado pueden disminuir los obstáculos que dificultan el acceso a los servicios.

### Prestar servicios de buena calidad

Los servicios deben ser aceptables y de buena calidad. Una manera de valorar la calidad consiste en evaluar la experiencia de quienes reciben el servicio, mediante indicadores nacionales y mundiales.

### Garantizar el consentimiento informado voluntario

Los programas deben promover el derecho de las personas a tomar decisiones con respecto a su propio tratamiento y aceptar su derecho a rechazar los servicios. Todos los servicios deben ser de carácter voluntario, sin ningún sentimiento de coacción ni requisitos condicionales para obtener servicios o productos básicos, como las pruebas de detección del VIH, los preservativos o las agujas estériles. La información sobre los servicios y el tratamiento debe ser clara y explícita, y estar redactada en un lenguaje apropiado. Además, la información para los adolescentes debe ser adecuada a su etapa específica de desarrollo.

### Preservar la confidencialidad

Se debe prestar atención a proteger la intimidad y la confidencialidad, por ejemplo, cerrando la puerta de la sala de consulta o buscando un lugar privado para conversar. Se debe asegurar de manera explícita a los beneficiarios de los servicios que se preservará la confidencialidad, por ejemplo, se les debe pedir permiso antes de revelar información a otros prestadores de atención de salud. Los programas deben abordar las complejidades de mantener la confidencialidad, en particular en los enfoques basados en la comunidad, de extensión y de pares.

### Estudio de caso: Servicios confidenciales y anónimos en el Líbano

Estudio de caso: Servicios confidenciales y anónimos en el Líbano

Centro de Salud Sexual Marsa, Líbano

<http://www.marsa.me>

El Centro de salud sexual Marsa, localizado en Beirut (Líbano), ofrece servicios de salud sexual y salud reproductiva en un entorno amigable sin ningún tipo de estigmatización o discriminación por la edad, el sexo, el género o la orientación sexual. Está pensado para jóvenes, mujeres solteras sexualmente activas y comunidades marginadas con poco acceso a otros establecimientos de salud sexual, incluidos los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas transgénero.

El carácter anónimo y confidencialidad que ofrece Marsa son fundamentales para atraer a los usuarios. El centro usa un número único de expediente para cada usuario como método de identificación. El usuario decide si quiere proporcionar información que lo identifique para ingresarla en su expediente.

El personal con el que cuentan está integrado por profesionales experimentados y sensibilizados, que deben preservar la confidencialidad. Los usuarios se sienten cómodos para hablar con los prestadores, revelar detalles íntimos sobre su modo de vida y buscar información de los especialistas, puesto que saben que no se revelará su identidad, ni siquiera a otros profesionales del equipo.

### Estudio de caso: Las líneas de ayuda telefónica y en internet garantizan el anonimato de los hombres jóvenes que tienen relaciones sexuales con hombres y que tienen VIH en la Federación de Rusia

Programa Vida Positiva, Fundación menZDRAV y ONG Phoenix PLUS, Rusia Conjuntamente con una organización no gubernamental, la Fundación de menZDRAV ofrece servicios a hombres jóvenes de 18 a 25 años que tienen relaciones sexuales con hombres y tienen VIH en seis regiones de la Federación de Rusia. Muchos hombres jóvenes se resisten a participar en grupos de apoyo por temor a que se revele su orientación sexual o que se revele su estado serológico con respecto al VIH, por lo que el programa Vida Positiva ofrece asesoramiento individual por teléfono, por las redes sociales y por Skype.

En cada una de las seis ciudades, los consejeros de pares ofrecen un servicio de consulta telefónica por un número de teléfono que se promociona. El asesoramiento también se ofrece por Skype, y los hombres jóvenes pueden enviar preguntas a los orientadores por correo electrónico, Facebook, Vkontakte o a través del perfil de un orientador en los sitios web para homosexuales.

Los consejeros ofrecen información sobre sexualidad, actividad sexual sin riesgos, ITS, adhesión al tratamiento antirretroviral, efectos colaterales del TAR y la revelación del estado de VIH positivo a las parejas sexuales. Quienes llaman reciben información acerca de los servicios del proyecto y son invitados a visitar el local del proyecto para recibir asesoramiento o ser derivados a la atención. Los que no quieren asistir al local debido al temor a que los identifiquen pueden ser derivados a alguno de los 20 especialistas médicos de las seis regiones que han recibido capacitación y conocen las necesidades específicas de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que tienen VIH, por lo que ofrecen servicios libres de estigmatización y discriminación.

Hay cerca de 80 consejeros de pares capacitados, incluidos empleados y voluntarios. Todos los consejeros de Vida Positiva participan en una capacitación centralizada y reciben capacitación y supervisión adicional en las sedes regionales del proyecto, así como del personal central del proyecto que viaja a las regiones. En el 2013, los consejeros de Vida Positiva atendieron casi 1.900 consultas telefónicas y 1.350 consultas en línea.

### Fomentar la participación de los miembros de los grupos de población clave

Es muy importante que los miembros de los grupos de población clave participen en la elaboración de los programas, es decir, en la planificación, la ejecución y el seguimiento y la evaluación. Esta participación puede hacer que la comunidad sienta el programa como propio y, por lo tanto, aumenta la eficacia del programa. Las personas de los grupos de población clave también pueden participar como prestadores de servicios y defensores de la causa.

### Estudio de caso: Aumento de la capacidad para prestar servicios comunitarios a las personas transgénero en los Estados Unidos

Centro de Excelencia para la Salud Transgénero, Universidad de California (Estados Unidos)  
<http://transhealth.ucsf.edu>

La misión del Centro de Excelencia para la Salud Transgénero es aumentar el acceso a servicios de atención de salud integrales, eficaces y de afirmación para las personas transgénero y las comunidades de género discordante. El objetivo es mejorar la salud y el bienestar generales de las personas transgénero al elaborar y aplicar programas que respondan a las necesidades determinadas por la comunidad. Los profesores y el personal central, que cuentan con antecedentes y experiencia variados, ofrecen programas elaborados por una junta asesora nacional integrada por 14 líderes identificados como trans de todos los Estados Unidos.

Los proyectos del centro abordan una amplia gama de problemas de salud de las personas transgénero. Una actividad consiste en formular directrices sobre una variedad de cuestiones de atención primaria, como la atención primaria y preventiva, el tratamiento hormonal, la salud mental, la población joven y las intervenciones quirúrgicas. Los protocolos se han publicado en línea (<http://Transhealth.UCSF.edu/protocols>). Además, el proyecto Transitions ayuda a fortalecer la capacidad de las organizaciones de la comunidad para que puedan adaptar, ejecutar y evaluar las intervenciones de prevención de la infección por el VIH basadas en la evidencia para las comunidades transgénero.

### Estudio de caso: Aumento de la capacidad y sesiones de capacitación en Tanzania

Organización Médicos del Mundo de Tanzania  
<http://doctorsoftheworld.org/where-we-work/africa/tanzania/>

La organización Médicos del Mundo de Tanzania ofrece servicios integrales de reducción de los daños, como programas de distribución de agujas y jeringas y derivación al tratamiento de sustitución de opioides, además de actividades para generar ingresos y ayuda jurídica. En términos más amplios, esta organización se ocupa de crear capacidad en organizaciones no gubernamentales y comunitarias para que pongan en marcha servicios de reducción de los daños, especialmente centros de acogida con programas de distribución de agujas y jeringas, entre los que se incluyen los centros dedicados a las mujeres con servicios adicionales para sus hijos. En el 2013, más de 2.000 interesados directos recibieron capacitación sobre estrategias e intervenciones de reducción de los daños.

La organización también ha ayudado a crear comités nacionales y distritales de reducción de los daños integrados por representantes de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Los subcomités a ambos niveles se centran en la movilización de recursos. Algunos elementos importantes de esta labor ha sido el diálogo continuo con las autoridades municipales, distritales y nacionales, y las sesiones de sensibilización para la policía, el personal médico y los periodistas.

## ASEQUIBILIDAD

### Asegurar los recursos monetarios

El compromiso y el financiamiento del gobierno son importantes. Las alianzas público-privadas pueden ayudar a distribuir los costos.

**Reducir al mínimo o eliminar los honorarios**

Si es posible, los servicios deben ofrecerse de forma gratuita o a un precio reducido. El seguro o los subsidios de salud deben cubrir todos los honorarios por los servicios prestados.

**Reducir los costos**

Es posible reducir los costos para el sistema de salud y para el usuario integrando y descentralizando los servicios, utilizando las actividades de extensión comunitaria y los puntos de reunión en las comunidades, y las ubicaciones que resultan cómodas para los usuarios. Es posible reducir los costos para el usuario acortando los períodos de espera en el establecimiento, ofreciendo sistemas de citas flexibles y separando las visitas a los consultorios de las visitas para recoger medicamentos.



# PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA: PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

# 7

7.1	Introducción .....	114
7.1.1	Principios rectores .....	114
7.2	Conocer la situación .....	116
7.3	Planificación y ejecución de la respuesta .....	117
7.4	Seguimiento y evaluación de la respuesta .....	118
7.5	Proceso continuo de planificación y preparación de la respuesta .....	119

## 7 PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA: PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA

### 7.1 Introducción

Para aplicar las recomendaciones incluidas en estas directrices, es preciso utilizar una estrategia que esté basada en la evidencia y sea apropiada para el contexto local. La planificación, la toma de decisiones y el seguimiento son partes de un proceso continuo: una vez que se elabora y ejecuta el plan basado en la evidencia, se le debe dar seguimiento y evaluar los efectos. Los resultados ciclo luego sirven para modificar la estrategia y su ejecución (figura 7.1).

**Figura 7.1 El ciclo de planificación, ejecución y evaluación de los programas**



#### 7.1.1 Principios rectores

Todo proceso eficaz de preparación y ejecución de una respuesta nacional o subnacional al VIH destinada a los grupos de población clave debe seguir estos principios básicos:

- **Un enfoque basado en la ética y los derechos humanos** debe ser el sustento de todas las decisiones. La respuesta planificada al VIH para los grupos de población clave, y el proceso de toma de decisiones en sí, no debe tener discriminación alguna y debe rendir cuentas ante los grupos de población que procura atender, respetando y defendiendo su autonomía y sus derechos. Además, el proceso debe estar guiado por los principios de la justicia y la equidad.
- **Una participación significativa de las comunidades afectadas** es fundamental para que las decisiones tomadas, los planes formulados y los programas elaborados sean aceptables para los integrantes de la comunidad, y equitativos y sensibles a las necesidades de dicha comunidad. Los representantes de los grupos de población clave deben participar en todas las etapas, desde el diseño de la respuesta y su ejecución hasta el seguimiento y la evaluación (1). El empoderamiento comunitario exitoso (véase la sección 5.3) permite desarrollar la capacidad de los integrantes y las organizaciones de la comunidad para que puedan participar en estos procesos de una manera significativa. Las organizaciones dirigidas por

la comunidad desempeñan una función crucial para la prestación de servicios que satisfagan mejor las necesidades de los grupos de población clave.

- **Participación de todas las partes interesadas.** Se requiere una respuesta multisectorial para abordar la infección por el VIH en los grupos de población clave. En consecuencia, en la planificación de esta respuesta se debe incluir a todos los sectores. En el recuadro 7.1 se indican las posibles partes interesadas que deberían ser incluidas en el proceso de planificación.
- **Un enfoque coordinado.** El director del programa nacional contra el VIH y un organismo apropiado como la comisión nacional sobre el VIH/sida deben asumir la responsabilidad de guiar el proceso de planificación general y propiciar la participación de los interesados directos y la comunidad. Para facilitar esta tarea, podría convenir nombrar a una persona que se ocupe específicamente de crear y coordinar los servicios y los temas relacionados con los grupos de población clave dentro de la comisión nacional sobre el VIH/sida (o un organismo superior similar). En países grandes y con contextos variados, la elaboración de un programa nacional exige formular estrategias también a los niveles local y subnacional, aunque con una orientación y coordinación central a nivel nacional.
- **Accesibilidad y transparencia.** La evidencia y la justificación de las decisiones deberían estar al alcance del público, incluida la información sobre la eficacia y el riesgo previsto, y la distribución de los beneficios de salud y de las cargas de los diferentes grupos.
- **Evidencia.** Las políticas, las intervenciones y los enfoques deben basarse en evidencia o experiencia sólidas.
- **Equidad.** Los programas deben apuntar a obtener resultados equitativos en materia de salud para todos los grupos y todos los entornos, así como promover la equidad de género.
- **Eficiencia y sostenibilidad.** Los programas deben tener por objetivo prestar servicios eficaces de una forma más eficiente y lograr la sostenibilidad a largo plazo.

### Recuadro 7.1 Posibles partes interesadas que podrían participar en el proceso de planificación

- Los expertos, gerentes y trabajadores de la salud de programas tanto públicos como privados de los siguientes ámbitos: programas y clínicas de VIH (prueba de detección del VIH y asesoramiento correspondiente, tratamiento antirretroviral y PTMI), servicios de salud sexual y reproductiva, salud maternoinfantil, salud mental, hepatología y servicios contra la tuberculosis, drogodependencia y servicios de reducción de los daños y programas de salud penitenciarios;
- la sociedad civil, incluidas las personas que tienen VIH y los grupos de mujeres y jóvenes, líderes religiosos y las personas con discapacidad;
- los técnicos especialistas en áreas específicas, como los servicios de laboratorio, la farmacología, la farmacoresistencia, el manejo de los efectos secundarios, la cadena de suministro y la salud de la comunidad;
- los asociados gubernamentales, como los representantes de los ministerios pertinentes, por ejemplo, de salud, justicia y ejecución de la ley, asuntos internos, finanzas y planificación, y las autoridades regionales (o provinciales);
- las organizaciones no gubernamentales, como los organismos internacionales, las organizaciones de carácter religioso, otras organizaciones locales no gubernamentales y comunitarias, y las organizaciones de servicio del sector privado;
- expertos en finanzas y presupuesto, como los encargados de los presupuestos programáticos y los economistas de la salud;
- las instituciones académicas, como los expertos en investigación operacional, estrategias de ejecución, ética, capacitación y supervisión;
- asociaciones profesionales de diversos cuadros de los trabajadores de la salud (como los médicos, las enfermeras y los trabajadores comunitarios).

## 7.2 Comprender la situación

La eficacia de las intervenciones incluidas en el paquete básico ha sido comprobada debidamente. La experiencia en diversos países ha demostrado que es posible generalizarlas y aplicarlas en entornos diferentes. Sin embargo, los factores locales sin duda influyen en su eficacia y sus repercusiones. Es fundamental comprender la dinámica de la epidemia local; las características de los grupos afectados; los contextos físicos, sociales y políticos que influyen en el riesgo y la vulnerabilidad; las necesidades de las personas pertenecientes a los grupos de población clave y cualquier otro factor que podría facilitar u obstaculizar las iniciativas para atender estas necesidades; y los sistemas de salud y la infraestructura de la comunidad. Con esta información, es posible formular y poner en marcha un plan basado en la evidencia.

Las personas de los grupos de población clave están expuestas a un riesgo mayor de contraer el VIH que la población general y tienen necesidades de salud específicas. Aunque muchos de estos riesgos y necesidades serán comunes para las personas de los grupos de población clave, aun considerando diferentes entornos, algunos factores serán diferentes según el tipo de población clave y otros serán específicos por el contexto particular. En consecuencia, para que la respuesta local sea apropiada, aceptable y más eficaz, es preciso examinar los riesgos y las necesidades de cada lugar, y consultar a las personas de los grupos de población clave y hacerlas participar activamente en el análisis de la situación.

Asimismo, es importante reconocer la diversidad y los diferentes niveles de riesgo que presenta cada grupo de población clave. Las personas expuestas a un riesgo mayor probablemente sean quienes podrían considerarse integrantes de más de una población clave; por ejemplo, algunos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres también consumen drogas inyectables o son trabajadores sexuales, por lo que están expuestos al riesgo de contraer VIH por varias vías. Las personas de los grupos de población clave también pueden tener otras características que podrían aumentar su riesgo o vulnerabilidad, o generar otras necesidades de salud o bienestar. Por ejemplo, es posible que no tengan vivienda, que tengan algún problema de salud mental o que tengan otras dolencias agudas o crónicas.

Los datos deben guiar la respuesta, pero la falta de datos no es motivo suficiente para interrumpir o no iniciar la respuesta al VIH destinada a los grupos de población clave.

El tamaño y la distribución de los grupos de población clave no es uniforme en todos los lugares. Para determinar la escala necesaria de la respuesta, el equilibrio apropiado entre el tipo de intervención y dónde se la llevará a cabo, es importante determinar el tamaño y la distribución de los grupos de población clave, entre otros factores (véanse el

recuadro 7.2 y la sección 7.3).

Es fundamental que los procesos de recopilación de la información, y la propia información, sirvan para proteger, en lugar de poner en riesgo, la seguridad y la intimidad de las personas de los grupos de población clave. Es esencial respetar los principios de la ética y proteger los derechos humanos de las personas de estos grupos en todo momento. En algunas circunstancias, determinar el tamaño de la población o mapear los grupos de población clave puede poner en peligro de forma fortuita a los miembros de la comunidad o someterlos al estigma al localizar e identificar a estos grupos. Esta información también podría derivar en la detención o el encarcelamiento de las personas de los grupos de población clave cuyo comportamiento se tipifica como delito. Cuando se recopila información, es importante mantener estrictamente el anonimato, la confidencialidad y la seguridad de la información recopilada. Si no es posible proteger la seguridad y los derechos humanos de las personas de los grupos de población clave, conviene evitar la recopilación de algunos datos, como podría ser localizar donde se congregan estas personas.

La composición, las características y las necesidades de los grupos de población clave cambian con el transcurso del tiempo, al igual que diversos factores contextuales y ambientales. La vigilancia y la evaluación continuas permitirán detectar los parámetros cambiantes y perfeccionar o reorientar la respuesta.

Un análisis de la situación casi siempre permite detectar las brechas del conocimiento. Un programa para profundizar la investigación al respecto puede abordar estas brechas.

También es importante, al analizar e interpretar los datos, evaluar su calidad y la presencia de sesgo.

### Recuadro 7.2 Información básica necesaria para la toma de decisiones y la planificación

Información necesaria	Origen de la información (véase también el recuadro 7.4)
Tamaño de los grupos de población clave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estimación del tamaño</li> </ul>
Prevalencia de la infección por el VIH en los grupos de población clave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vigilancia serológica</li> </ul>
Ubicación o distribución geográfica de los grupos de población clave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mapeo</li> </ul>
Características, comportamientos de riesgo y problemas de salud de los grupos de población clave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• encuestas demográficas</li> <li>• encuestas de comportamiento</li> <li>• encuestas de salud general</li> </ul>
Factores estructurales importantes, barreras para implementar una respuesta al VIH y necesidades de los grupos de población clave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• auditoría de la legislación, las políticas y las prácticas vigentes</li> <li>• consulta con miembros de la comunidad, organizaciones dirigidas por la comunidad y otros interesados directos</li> <li>• encuestas de comportamiento</li> </ul>
Accesibilidad, cobertura, calidad, resultados y efectos de la intervención	<ul style="list-style-type: none"> <li>• datos programáticos (administrativos)</li> <li>• registros de notificación de enfermedades</li> <li>• encuestas integradas bioconductuales</li> </ul> <p><i>(Véase en el recuadro 7.3 una descripción más detallada del marco de seguimiento y evaluación de los programas nacionales.)</i></p>

Las directrices sobre evaluación y respuesta rápida pueden ayudar a dirigir las evaluaciones iniciales y continuas con diversos métodos para recoger los datos y efectuar análisis a distintos niveles:

- *Rapid assessment and response adaptation guide on HIV and men who have sex with men.* Ginebra, OMS, 2002. [http://www.who.int/hiv/pub/prev\\_care/en/msmrar.pdf?ua=1](http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/msmrar.pdf?ua=1)
- *The rapid assessment and response guide on injecting drug use (IDU-RAR).* Ginebra, OMS, 1998. [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/en/IDURARguideEnglish.pdf?ua=1](http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/IDURARguideEnglish.pdf?ua=1)
- *The rapid assessment and response guide on psychoactive substance use and sexual risk behaviour (SEX-RAR).* Ginebra, OMS, 2002. [http://www.who.int/entity/mental\\_health/media/en/686.pdf?ua=1](http://www.who.int/entity/mental_health/media/en/686.pdf?ua=1)
- *Rapid assessment and response adaptation guide for work with especially vulnerable young people.* Ginebra, OMS, 2004 [http://www.who.int/hiv/pub/prev\\_care/en/youngpeoplerrar.pdf?ua=1](http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/youngpeoplerrar.pdf?ua=1)

### 7.3 Planificación y ejecución de la respuesta

A continuación se indican algunas de las decisiones que deben tomarse al preparar y poner en marcha una respuesta nacional al VIH destinada a los grupos de población clave.

#### Enfoque de la respuesta

- ¿Qué grupos de población clave y qué subgrupos dentro de los grupos de población clave están más en riesgo?
- ¿Qué legislación, políticas y directrices deben elaborarse o modificarse?

## Ejecución

- ¿Qué intervenciones deben ejecutarse y cómo debe priorizarse su ejecución?
- ¿Dónde y a qué escala deben aplicarse las intervenciones?<sup>1</sup>
- ¿Qué metas y plazos deben establecerse para la ejecución y ampliación a mayor escala de las intervenciones?
- ¿De qué manera y en qué medida deben descentralizarse e integrarse los servicios para ofrecer la mejor cobertura a los grupos de población clave?
- ¿Qué métodos de prestación de servicios son los más apropiados?
- ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de las partes interesadas para ejecutar la respuesta y lograr las metas acordadas?

## Recursos necesarios

- ¿Los costos de ejecución de la respuesta superan los costos de la inactividad?
- ¿Qué recursos humanos, financieros y de otro tipo y qué infraestructura son necesarios para ejecutar la respuesta? ¿Qué recursos están disponibles, serán necesarios esfuerzos adicionales y cómo se obtendrán? ¿Qué tipos de profesionales de la salud o de otros sectores serán necesarios, y cómo serán reclutados y capacitados? ¿De qué manera pueden la delegación de funciones y el reparto de tareas optimizar el trabajo del personal disponible y expandir la prestación de servicios?
- ¿Cómo permitirán disminuir los costos y mejorar la prestación de servicios las economías de escala y la coordinación entre las intervenciones para el VIH y otras intervenciones de salud?

## Seguimiento y evaluación

- ¿Cómo se hará el seguimiento y se evaluará la ejecución de la respuesta?
- ¿Cómo deben fortalecerse los sistemas de información estratégica para el seguimiento y la evaluación?

## Riesgos, resultados y repercusiones

- ¿Qué posibles riesgos y vulnerabilidades de la respuesta planificada se prevén, y qué estrategias mitigarían sus efectos? Los riesgos podrían incluir factores internos, como reducciones presupuestarias, robo de los bienes consumibles, desmotivación de los profesionales de la salud y aparición de farmacoresistencia. Los factores externos podrían ser la pérdida del financiamiento externo, la inestabilidad política y los desastres naturales.

## 7.4 Seguimiento y evaluación de la respuesta

Es necesario contar con un sistema de evaluación y seguimiento para valorar tanto los componentes estructurales como los componentes de salud de la respuesta al VIH destinada a los grupos de población clave. Es fundamental que estos sistemas sean prácticos, no sean excesivamente complicados y que recopilen información que sea actual, útil y fácil de aprovechar.

La OMS y los organismos asociados de las Naciones Unidas han elaborado marcos de seguimiento de la respuesta al VIH en la población general y los grupos de población clave. En los siguientes documentos se describen estos marcos:

**El sistema de seguimiento y evaluación es una parte esencial de la respuesta al VIH destinada a los grupos de población clave.**

- *Tool for setting and monitoring targets for prevention, treatment and care for HIV and other sexually transmitted infections among key populations.* Ginebra, OMS, 2015. <http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/kpp-monitoring-tools/en/>
- *Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users, 2012 revision.* Ginebra, OMS, 2012. [http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets\\_universal\\_access/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/)

<sup>1</sup> Respecto del tratamiento antirretroviral, las directrices unificadas sobre el uso de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH (2013) de la OMS proporcionan información sobre las consideraciones atinentes a la ejecución y la ampliación de los servicios conforme a recomendaciones básicas.S.

- Consolidated HIV M&E guidelines. Ginebra, OMS, 2015.  
[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/164716/1/9789241508759\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/164716/1/9789241508759_eng.pdf)

En cada uno de estos marcos se recomienda un conjunto de indicadores nacionales, que evalúan factores esenciales relacionados con el entorno favorable, miden la disponibilidad, la cobertura y la calidad de intervenciones específicas, y examinan los resultados y las repercusiones (recuadro 7.3). Estos indicadores también pueden usarse cuando se preparan propuestas o se informa sobre el progreso a las organizaciones donantes.

Los siguientes documentos presentan otras directrices sobre el seguimiento y la evaluación, en las que también se describen modos de emprender evaluaciones subnacionales:

- *Operational guidelines for monitoring and evaluation of HIV programmes for sex workers, men who have sex with men and transgender people*. Ginebra, ONUSIDA, 2012.  
[http://unaid.org.cn/en/index/Document\\_view.asp?id=712](http://unaid.org.cn/en/index/Document_view.asp?id=712)
- *Operational guidelines for monitoring and evaluation of HIV programmes for people who use drugs*. Ginebra, ONUSIDA, 2011, versión preliminar. <http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/hiv-aids/operational-guidelines-form-e-of-hiv-programmes-for-people-who-inject-drugs/idu-service-delivery-level-guidelines/view>

El proceso de seguimiento y evaluación debe obtener datos de diversas fuentes, como encuestas conductuales y de vigilancia serológica, datos programáticos y administrativos, así como información recogida mediante la revisión de documentos normativos y de legislación, y la consulta con expertos e interesados directos (recuadro 7.4). Es importante evaluar y tener en cuenta la calidad y las limitaciones de estos datos al emprender el análisis y la interpretación.

## 7.5 Proceso continuo de planificación y elaboración de la respuesta

La definición de metas claras y realizables pero ambiciosas es crucial cuando el propósito es ampliar la escala de las intervenciones para alcanzar los objetivos de la respuesta al VIH. Las metas definen concretamente lo que debe lograr un programa o proyecto nacional en un plazo específico y pueden definirse tanto indicadores específicos sobre esas intervenciones como indicadores transversales sobre los resultados y las repercusiones (recuadro 7.3).

Los **indicadores específicos sobre las intervenciones y los entornos favorables** reflejan la disponibilidad, la cobertura y la calidad de la intervención o el servicio o evalúan los cambios de los factores del entorno, como la modificación de las leyes, en un plazo determinado. Las metas se definen con la intención de lograr disminuciones suficientes del riesgo de contraer el VIH y las ITS que permitan controlar la epidemia y garantizar la prestación suficiente de tratamiento y atención apropiados para las personas con VIH o alguna ITS.

Los **indicadores sobre los resultados y las repercusiones** procuran medir los efectos que han tenido las intervenciones sobre los resultados que inciden en la exposición al riesgo, como los cambios de los comportamientos riesgosos (por ejemplo, el porcentaje de personas que usan preservativos sistemáticamente) o en las repercusiones sobre la evolución de la epidemia de la infección por el VIH o de las ITS (por ejemplo, la disminución de la incidencia de la infección por el VIH o las ITS).

Al igual que los procesos de planificación en general, la definición de las metas debe ser un proceso colaborativo, en el que participen los distintos interesados directos. Quienes las definan deben considerar si son realistas y si será posible recopilar datos en la práctica. Las metas, de acuerdo con las estrategias programáticas, deben estar adaptadas a la epidemia local y a lo que realmente pueda lograr la estrategia con el financiamiento y los recursos obtenibles. Los ejercicios de elaboración de modelos pueden ayudar a prever el modo en que los diferentes tipos de objetivos podrían incidir en la epidemia.

**Evaluación inicial.** La evaluación inicial debe medir la escala de la respuesta actual, evaluando la disponibilidad, la cobertura y la calidad de las intervenciones actuales así como valorando los actuales elementos facilitadores y obstáculos del entorno. Esta información sirve de punto de comparación para llevar a cabo el seguimiento del progreso. Además, es necesario determinar los recursos y la capacidad técnica actuales para calcular lo que se necesita y el modo de ampliar la intervención apropiadamente. A partir de esta información, es posible definir metas realistas y realizables, y especificar el plazo para cumplirlas.

**Cálculo de los costos.** El cálculo de los costos asociados a la ejecución es un paso clave de la planificación. Hay varios instrumentos que permiten calcular los costos y los recursos necesarios. Spectrum, por ejemplo, es un conjunto de modelos y herramientas analíticas que sirve para tomar decisiones, que está compuesto por varias aplicaciones informáticas, entre ellas, AIM (AIDS Impact Model, modelo para calcular las repercusiones del sida) y Goals (Costo y repercusiones de las intervenciones contra el VIH). La mayoría de los países ya tienen preparados archivos AIM como parte de sus cálculos epidemiológicos nacionales, por lo que es posible aplicar ambos módulos rápidamente. Spectrum puede descargarse en línea en <http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/spectrumep2013/>

OneHealth es un programa informático diseñado para fortalecer el análisis de sistemas de salud y la determinación de los costos y para elaborar escenarios financieros a nivel de país, en particular de los países de ingresos bajos y medianos. Este programa proporciona a los planificadores un único marco para planificar, determinar los costos, analizar las repercusiones, definir el presupuesto y el financiamiento de las estrategias para todas las enfermedades graves y los componentes del sistema de salud. OneHealth puede descargarse de forma gratuita (Futures Institute, 2013) en <http://www.futuresinstitute.org/onehealth.aspx>

El ONUSIDA ha creado una herramienta de cálculo de los costos relativos a los derechos humanos en el contexto del VIH (HRCT), instrumento flexible para calcular el costo de las inversiones en los elementos facilitadores fundamentales (como los programas de tratamiento integrado y educación sobre derechos, los servicios jurídicos, los programas para reducir la discriminación y el estigma, y la capacitación para los grupos de población clave y los agentes del orden). Este programa también puede descargarse de forma gratuita junto con un manual del usuario (2,3) en [http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/data-and-analysis/tools/The\\_Human\\_Rights\\_Costing\\_Tool\\_v\\_1\\_5\\_May-2012.xlsm](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/data-and-analysis/tools/The_Human_Rights_Costing_Tool_v_1_5_May-2012.xlsm) y [http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/The\\_HRCT\\_User\\_Guide\\_FINAL\\_2012-07-09.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/The_HRCT_User_Guide_FINAL_2012-07-09.pdf)

### Recuadro 7.3 Indicadores de seguimiento y evaluación de la respuesta

Para comprender el funcionamiento y los efectos de la respuesta, es necesario vigilar los diversos requisitos básicos para cada población clave. Cada uno de estos requisitos puede medirse con varios indicadores.

Estos indicadores se describen detalladamente en las directrices de la OMS sobre las grupos de población clave: *Tool for setting and monitoring targets for prevention, treatment and care for HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men, sex workers and transgender people*, de próxima publicación; y *Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users – 2012 revision*, [http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets\\_universal\\_access/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/)

**La aplicación es eficaz y las repercusiones son positivas cuando las políticas, la legislación y otros factores estructurales son propicios.**

Indicadores **estructurales** (o entorno propicio):

- auditoría de la legislación y las políticas vigentes;
- número de organizaciones dirigidas por grupos de población clave;
- participación significativa de las personas de los grupos de población clave en la formulación de políticas y estrategias;
- servicios de apoyo jurídico a los grupos de población clave;
- servicios de apoyo a las personas de los grupos de población clave que son víctima de violencia;
- capacitación para sensibilizar a los agentes del orden sobre los grupos de población clave;
- capacitación para sensibilizar a los prestadores de atención de salud y de servicios sociales sobre los grupos de población clave.

### Las intervenciones deben ser accesibles para las personas de los grupos de población clave.

Indicadores de la **disponibilidad**:

- número de centros donde se ofrece la intervención;
- número y porcentaje de centros donde está en marcha el programa específico para los grupos de población clave que ofrecen la intervención;
- número y porcentaje de centros de la sociedad general donde está en marcha el programa que ofrece la intervención y que cumplen con las normas de sensibilización sobre los grupos de población clave;
- porcentaje de todos los centros que ofrecen la intervención actualmente, que forman parte de programas para la sociedad general y que cumplen con las normas de sensibilización sobre los grupos de población clave o son programas específicos para estos grupos;
- porcentaje de la muestra de los grupos de población clave que refieren un fácil acceso a la intervención;
- mapeo de los grupos de población clave con relación a donde se ofrecen las intervenciones.

### Las intervenciones deben llegar a quienes las necesitan.

Indicadores de la **cobertura**:

- número y porcentaje de personas de los grupos de población clave que reciben la intervención durante un período de notificación especificado;
- número de elementos de bienes consumibles (como agujas y jeringas o preservativos) por integrante de los grupos de población clave que se han distribuido durante un período de notificación especificado;
- porcentaje de la muestra de los grupos de población clave que refieren que recibieron la intervención durante un período de notificación especificado.

### Las intervenciones deben ejecutarse adecuadamente para ser eficaces.

Indicadores de la **calidad**:

- examen de la política y la práctica programática mediante la lista de verificación para evaluar la calidad de los programas;
- porcentaje del personal que ha recibido capacitación a fin de sensibilizarlo sobre los grupos de población clave;
- porcentaje de personas de los grupos de población clave que refieren que recibieron la intervención y también una actividad o un servicio específico importante (como la entrega de lubricante apto para preservativos);
- porcentaje de ocasiones en que se aplicó la intervención junto con una actividad o un servicio específico importante (véase el indicador anterior).

### Deben lograrse los objetivos propuestos.

Indicadores de los **resultados** y las **repercusiones**:

- prevalencia de comportamientos de riesgo para contraer el VIH en las personas de los grupos de población clave;
- incidencia de la infección en los grupos de población clave;
- prevalencia de la infección en los grupos de población clave;
- incidencia de la mortalidad relacionada con el VIH en los grupos de población clave;
- prevalencia del estigma o la discriminación en los grupos de población clave;
- incidencia de actos de violencia contra las personas de los grupos de población clave.

### Recuadro 7.4 Fuentes de datos

Las **encuestas conductuales y de vigilancia serológica** de los grupos de población clave pueden proporcionar datos sobre la prevalencia e información sobre las experiencias, los riesgos y la utilización de los servicios de las personas de estos grupos. Muchos países ya emprenden encuestas biológico-conductuales de los grupos de población clave con regularidad como parte de la vigilancia continua de la epidemia de la infección por el VIH. La posibilidad de generalizar los resultados de estas encuestas depende de la representatividad de la muestra; es importante tener en cuenta el sesgo de selección relativo al modo en que se convocó a los participantes. Las encuestas conductuales son sensibles al sesgo hacia las respuestas socialmente aconsejables y al sesgo de recuerdo.

**Datos programáticos o administrativos.** La mayoría de los programas registran sistemáticamente al menos alguna información básica cuando se presta un servicio, por ejemplo, el número de personas que recibieron un servicio, información básica acerca del beneficiario y números de los suministros usados o distribuidos.

Para evaluar los servicios prestados a las personas de los grupos de población clave, los datos programáticos deben estar desglosados por grupo. Los programas centrados en determinados grupos quizás puedan proporcionar datos específicos sobre los grupos de población que atienden, pero no es habitual que se obtenga esta información de los programas que prestan servicios a muchos grupos diferentes o a la población general.

**Estudios teóricos y consulta de expertos.** El examen de diversos documentos normativos y legislativos permite detectar la presencia o ausencia de diversas leyes o políticas que pueden afectar a las personas de los grupos de población clave.

**Estimación del tamaño de la población.** El cálculo de datos fidedignos sobre el tamaño de los grupos de población clave puede resultar complejo. Si bien hay varios métodos, cada uno tiene ventajas y limitaciones. Los métodos más utilizados son el censo y la enumeración, las encuestas de la población general, los métodos de captura y recaptura, de multiplicadores y de ampliación de las redes personales. Puede ser de utilidad calcular varias estimaciones mediante diferentes métodos y triangular los resultados. Las definiciones de los grupos de población clave deben estar claras.

## Fuentes de las directrices

- *Tool for setting and monitoring targets for prevention, treatment and care for HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men, sex workers and transgender people.* Ginebra, OMS, de próxima publicación.
- *Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users – 2012 revision.* Ginebra, OMS, 2012. [http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets\\_universal\\_access/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/)
- *Consolidated HIV monitoring and evaluation guidelines.* Ginebra, OMS, en preparación.
- *Interim guidelines on protecting the confidentiality and security of HIV information: proceedings from a workshop 15–17 May 2006, Ginebra (Suiza).* Ginebra, ONUSIDA, 2007. [http://data.unaids.org/pub/manual/2007/confidentiality\\_security\\_interim\\_guidelines\\_15may2007\\_en.pdf](http://data.unaids.org/pub/manual/2007/confidentiality_security_interim_guidelines_15may2007_en.pdf)
- *Guidelines on estimating the size of populations most at risk to HIV.* Ginebra, OMS, 2010. [http://www.who.int/hiv/pub/surveillance/final\\_estimating\\_populations\\_en.pdf](http://www.who.int/hiv/pub/surveillance/final_estimating_populations_en.pdf)
- *HIV in prisons: Situation and needs assessment toolkit.* Viena, UNODC, 2010. [http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/HIV\\_in\\_prisons\\_situation\\_and\\_needs\\_assessment\\_document.pdf](http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/HIV_in_prisons_situation_and_needs_assessment_document.pdf)
- *Rapid assessment and response adaptation guide on HIV and men who have sex with men (MSM-RAR).* Ginebra, OMS, 2002. [http://www.who.int/hiv/pub/prev\\_care/en/msmrar.pdf?ua=1](http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/msmrar.pdf?ua=1)
- *The rapid assessment and response guide on injecting drug use (IDU-RAR).* Ginebra, OMS, 1998. [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/en/IDURARguideEnglish.pdf?ua=1](http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/IDURARguideEnglish.pdf?ua=1)
- *The rapid assessment and response guide on psychoactive substance use and sexual risk behaviour (SEX-RAR).* Ginebra, OMS, 2002. [http://www.who.int/entity/mental\\_health/media/en/686.pdf?ua=1](http://www.who.int/entity/mental_health/media/en/686.pdf?ua=1)
- *Rapid assessment and response adaptation guide for work with especially vulnerable young people.* Ginebra, OMS, 2004. [http://www.who.int/hiv/pub/prev\\_care/en/youngpeoplerrar.pdf?ua=1](http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/youngpeoplerrar.pdf?ua=1)

# REFERENCIAS

## Definiciones de términos importantes

1. *Estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011–2015*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA63/A63\\_R19-sp.pdf?ua=1](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R19-sp.pdf?ua=1), consultado el 25 de febrero del 2014).
2. *World AIDS Day Report 2012*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA, 2012 ([http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/jc2434\\_worldaidsday\\_results\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/jc2434_worldaidsday_results_en.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
3. *Interventions to address HIV in prisons: prevention of sexual transmission*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (Evidence for Action Technical Papers) ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595797\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595797_eng.pdf), consultado el 6 de junio del 2014).
4. *Prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections for sex workers in low and middle-income countries: recommendations for a public health approach*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/77745/1/9789241504744\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/77745/1/9789241504744_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
5. *Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño*. Nueva York, Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989 <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>, consultado el 1 de mayo del 2014).
6. *Carroll A. Testing the waters: LGBT people in the Europe & Eurasia region*. Washington, DC, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2013.
7. *Standards of care for the health of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people*. Minneapolis, MN, USA, la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, 2012 ([http:// www.wpath.org/site\\_page.cfm?pk\\_association\\_webpage\\_menu=1351](http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1351), consultado el 28 de abril del 2014).
8. *HIV prevention in generalized epidemics: optimal interventions for Global Fund applications: recommendations for a public health approach*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http:// whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502467\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502467_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
9. *HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for policymakers and managers*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
10. *Interagency Youth Working Group. Young people most at risk of HIV: a meeting report and discussion paper from the Interagency Youth Working Group, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Inter-Agency Task Team on HIV and Young People del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y FHI*. Research Triangle Park, NC, USA, FHI, 2010.

## CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN

1. *Estrategia OMS contra el VIH/sida para 2011–2015*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http:// apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA63/A63\\_R19-sp.pdf?ua=1](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R19-sp.pdf?ua=1), consultado el 25 de febrero del 2014).
2. *Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014). Guidelines on when to start antiretroviral therapy and on pre- exposure prophylaxis for HIV. Geneva, WHO, 2015. [http:// www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/](http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/)

3. *World AIDS Day Report 2012*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA, 2012 ([http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/jc2434\\_worldaidsday\\_results\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/gr2012/jc2434_worldaidsday_results_en.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
4. Beyrer C et al. Global epidemiology of HIV infection in men who have sex with men. *Lancet*, 2012, 380(9839):367-377 ([http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(12\)60821-6/abstract](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60821-6/abstract), consultado el 25 de febrero del 2014).
5. Hladik F, McElrath MJ. Setting the stage: host invasion by HIV. *Nature Reviews Immunology*, 2008, 8(6):447-457 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2587276/pdf/nihms51727.pdf>, consultado el 01 de mayo del 2014).
6. Royce RA et al. Sexual transmission of HIV. *New England Journal of Medicine*, 1997, 336:1072-1078.
7. Hakim A, et al. HIV prevalence and associated risk factors among MSM: a respondent-driven sampling survey, Abidjan, Côte d'Ivoire. Póster 1021 presentado en la 20.a Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas, del 3 al 6 de marzo del 2013, Atlanta.
8. *Étude sur le VIH et les facteurs de risques associés chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à Abidjan, Côte d'Ivoire*. Abidjan, Côte d'Ivoire Ministère de la Santé et de la Lutte contra le VIH/sida, 2012 (<http://afdroit.com/wp-content/uploads/2013/07/Rapport-vih-msm-finales-Etude-SHARMCI-nov12.pdf>, consultado el 29 de abril del 2014).
9. Johnson C. *Off the map: how HIV/AIDS programming is failing same-sex practicing people in Africa*. Nueva York, Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, 2007.
10. *83 countries where homosexuality is illegal*. Erasing 76 CRIMES, 2014 <http://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal>, consultado el 3 de marzo del 2014).
11. Poteat T et al. HIV risk among MSM in Senegal: a qualitative rapid assessment of the impact of enforcing laws that criminalize same sex practices. *PLoS One*, 2011, 6(12).
12. Stoicescu G, ed. *The global state of harm reduction 2012: towards an integrated response*. Londres, Harm Reduction International, 2012.
13. Mathers BM et al. Global epidemiology of injecting drug use and HIV among people who inject drugs: a systematic review. *Lancet*, 2008, 372(9651):1733-1745. doi:10.1016/S0140-6736(08)61311-2
14. *World drug report 2014*. Viena, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2014.
15. Emmanuel F et al. Second-generation surveillance for HIV/AIDS in Pakistan: results from the 4th round of Integrated Behavior and Biological Survey 2011-2012. *Sexually Transmitted Infections*, 2013, 89:iii23-iii28 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841725/pdf/sextrans-2013-051161.pdf>, consultado el 29 de abril del 2014).
16. *Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2013*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2013 ([http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/unaids\\_globgl\\_report\\_2013\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/unaids_globgl_report_2013_en.pdf), consultado el 10 de junio del 2014).
17. Walmsley, R. *World prison population list, 7th ed*. Londres, King's College London, International Centre for Prison Studies, 2007 (<http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/resources/downloads/world-prison-pop-seventh.pdf>, consultado el 10 de junio del 2014).
18. *Effectiveness of interventions to address HIV in prisons*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
19. Recommendation concerning HIV and AIDS and the world of work, 2010 (No. 200). Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2010 ([http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed\\_protect/-protrav/-ilo\\_aids/documents/normativeinstrument/wcms\\_194088.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-ilo_aids/documents/normativeinstrument/wcms_194088.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
20. *HIV in places of detention: a toolkit for policymakers, programme managers, prison officers and health care providers in prison settings*. Nueva York, Organización de las Naciones Unidas, 2008 (<http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/V0855768.pdf>, consultado el 25 de febrero del 2014).
21. Pintilei L. Harm reduction in prisons of Republic of Moldova. Presentación en ocasión de "HIV/AIDS in Prisons in Ukraine - From Evidence to Action: Prevention and Care, Treatment, and Support", Kiev, 1 y 2 de noviembre del 2005.
22. *Legislating for health and human rights: model law on drug use and HIV/AIDS. Module 5: Prisons*. Toronto, Canadian HIV/AIDS Legal Network, 2006 (<http://www.aidslaw.ca/publications/interfaces/downloadFile.php?ref=872>, consultado el 25 de febrero del 2014).

23. Baral S et al. Burden of HIV among female sex workers in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infectious Diseases*, 2012, 12:538-549.
24. Baral S et al. Worldwide burden of HIV in transgender women: a systematic review and meta-analysis. *Lancet*, 2013, 13:214-220.
25. Bayer AM, et al. 'Just getting by': a cross-sectional study of male sex workers as a key population for HIV/STIs among men who have sex with men in Peru. *Sexually Transmitted Infections*, 2014, 90(3):223-229.
26. Platt L et al. Factors mediating HIV risk among female sex workers in Europe: a systematic review and ecological analysis. *BMJ Open*, 2013, 3(7).
27. Tran BX, et al. HIV infection, risk factors, and preventive services utilization among female sex workers in the Mekong Delta Region of Vietnam. *PLoS One*, 2014, 9(1).
28. *A background review of the global epidemiology among young people from key populations*. Ginebra, Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre los Grupos de Población Clave. Inédito, 2014.
29. Interagency Youth Working Group. *Young people most at risk of HIV: a meeting report and discussion paper from the Interagency Youth Working Group*, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA Inter-Agency Task Team on HIV and Young People, and FHI. Research Triangle Park, NC, EUA, FHI, 2010.
30. Young people and the law in Asia and the Pacific: a review of laws and policies affecting young people's access to sexual and reproductive health and HIV services. Bangkok, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013.
31. *HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for policy-makers and managers*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
32. *Consultation on strategic information and HIV prevention among most-at-risk adolescents: consultation report*. Nueva York, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2009.
33. Schwartlander B, et al. Towards an improved investment approach for an effective response to HIV/ AIDS. *Lancet*, 2011, 377(9782):2031–2041.
34. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), World Bank. *New HIV infections by mode of transmission in West Africa: a multi-country analysis*. Ginebra, ONUSIDA, 2010.
35. Kerrigan D et al. The global HIV epidemics among sex workers. Washington, DC, Banco Mundial, 2013.
36. *HIV in Asia and the Pacific*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2013.
37. Commission on AIDS in Asia. *Redefining AIDS in Asia: crafting an effective response*. Nueva Delhi, Oxford University Press, 2008.
38. Beyrer C et al. The global HIV epidemics among men who have sex with men. Washington, DC, Banco Mundial, 2011.
39. Universal Declaration of Human Rights. Ginebra, Organización de las Naciones Unidas, 1948 (<http://www.un.org/en/documents/udhr/>, consultado el 25 de febrero del 2014).
40. International guidelines on HIV/AIDS and human rights. 2006 consolidated version. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2006 ([http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/jc1252-internguidelines\\_en.pdf](http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub07/jc1252-internguidelines_en.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
41. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, A/RES/21/2200*. Nueva York, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966 (<http://www.un-documents.net/a21r2200.htm>, consultado el 25 de febrero del 2014).
42. *Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex workers*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex\\_worker\\_implementation/en/](http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/), consultado el 23 de mayo del 2014).
43. *Policy guidelines for collaborative TB and HIV services for injecting and other drug users – an integrated approach*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (Evidence for Action Technical Papers) ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596930\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596930_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).

## CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA Y PROCESO DE FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES

1. *WHO handbook for guideline development*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf), consultado el 3 de marzo del 2014).
2. *Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013. ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
3. *Effectiveness of interventions to address HIV in prisons*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (Evidence for Action Technical Papers) ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190\\_eng.pdf?ua=1](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190_eng.pdf?ua=1), consultado el 23 de mayo del 2014).
4. Jürgens R, Ball A, Verster A. *Interventions to reduce HIV transmission related to injecting drug use in prison*. *Lancet Infectious Diseases*, 2009, 9(1):57-66.
5. *Guidance on pre-exposure oral prophylaxis (PrEP) for serodiscordant couples, men and transgender women who have sex with men at high risk of HIV: recommendations for use in the context of demonstration projects*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/hiv/pub/guidance\\_prep/en/](http://www.who.int/hiv/pub/guidance_prep/en/), consultado el 4 de marzo del 2014).
6. Atkins D et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. *British Medical Journal*, 2004, 328:1490.
7. Guyatt GH et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *British Medical Journal*, 2008, 336(7650):924-926.
8. Andrews JC et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation-determinants of a recommendation's direction and strength. *Journal of Clinical Epidemiology*, 2013, 66(7):726-735.
9. Balshem H et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. *Journal of Clinical Epidemiology*, 2011, 64(4):401-406.

## CAPÍTULO 3 CONJUNTO INTEGRAL DE INTERVENCIONES

1. *WHO, UNODC, UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597760\\_eng.pdf?ua=1](http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597760_eng.pdf?ua=1), consultado el 6 de junio del 2014).
2. *WHO, UNODC, UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users – 2012 revision*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets\\_universal\\_access/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/), consultado el 6 de junio del 2014).
3. *Interventions to address HIV in prisons: prevention of sexual transmission*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 ([http://www.who.int/hiv/pub/idu/prisons\\_prevention/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/prisons_prevention/en/), consultado el 6 de junio del 2014).
4. *HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: a comprehensive package of interventions, Policy Brief*. Viena, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013 ([https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV\\_comprehensive\\_package\\_prison\\_2013\\_eBook.pdf](https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf), consultado el 6 de junio del 2014).
5. *HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for policy-makers and managers*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).

## CAPÍTULO 4 INTERVENCIONES DEL SECTOR DE LA SALUD

1. *Use and procurement of additional lubricants for male and female condoms: advisory note.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76580/1/WHO\\_RHR\\_12.33\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/76580/1/WHO_RHR_12.33_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
2. *Position statement on condoms and HIV prevention.* Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2004, actualizado en el 2009 ([http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2009/20090318\\_position\\_paper\\_condoms\\_en.pdf](http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2009/20090318_position_paper_condoms_en.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
3. *Guidelines: prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men and transgender people: recommendations for a public health approach 2011.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/44619/1/9789241501750\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/44619/1/9789241501750_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
4. *Consolidated guidelines on general HIV care and the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014) y *Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV.* Ginebra, OMS, 2015 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014) y *Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV.* Ginebra, OMS, 2015. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565\\_eng.pdf?ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565_eng.pdf?ua=1).
5. Goldenberg SM, et al. Exploring the impact of underage sex work among female sex workers in two Mexico-U.S. border cities. *AIDS Behavior*, 2012, 16(4):969-981.
6. Lyons A et al. Age at first anal sex and HIV/STI vulnerability among gay men in Australia. *Sexually Transmitted Infections*, 2012, 88:252e257.
7. Preda M, et al. Research Report on MARA: conducted as part of the project "HIV Prevention in Most-at-Risk Adolescents". Bucarest, Universidad de Bucarest, Rumania, Facultad de Sociología y Asistencia Social, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Rumania, 2009.
8. *WHO, UNODC, UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users – 2012 revision.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets\\_universal\\_access/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/), consultado el 31 de mayo del 2014).
9. *Interventions to address HIV in prisons: prevention of sexual transmission.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (Evidence for Action Technical Papers) ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595797\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595797_eng.pdf), consultado el 6 de junio del 2014).
10. *Prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections for sex workers in low- and middle-income countries: recommendations for a public health approach.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/77745/1/9789241504744\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/77745/1/9789241504744_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
11. *HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: a comprehensive package of interventions: policy brief.* Viena, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013 ([http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV\\_comprehensive\\_package\\_prison\\_2013\\_eBook.pdf](http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV_comprehensive_package_prison_2013_eBook.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
12. Colfax G et al. Amphetamine-group substances and HIV. *Lancet*, 2010, 376(9739):458- 474 (<http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673610607532.pdf?id=aaaHLPIEPwGhA4BWcDZru>, consultado el 25 de febrero del 2014).
13. Degenhardt L et al. *The global epidemiology of methamphetamine injection: a review of the evidence on use and associations with HIV and other harm.* Sydney, Universidad de Nueva Gales del Sur, Centro Nacional de Investigación sobre Drogas y Alcohol, 2007 ([http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/The\\_global\\_Epidemiology\\_of\\_methamphetamine\\_injection.pdf](http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/The_global_Epidemiology_of_methamphetamine_injection.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
14. *WHO information update: considerations regarding reuse of the female condom.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002 ([http://www.who.int/entity/reproductivehealth/topics/rtis/reuse\\_FC2\\_info\\_update.pdf](http://www.who.int/entity/reproductivehealth/topics/rtis/reuse_FC2_info_update.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).

15. Balthasar H, Jeannin A, Dubois-Arber F. First anal intercourse and condom use among men who have sex with men in Switzerland. *Archives of Sexual Behavior*, 2009, 38(6):1000-1008.
16. Pettifor A et al. Sexual power and HIV risk, South Africa. *Emerging Infectious Disease*, 2004, 10:1996-2004.
17. *Condom programming for HIV prevention: an operations manual for programme managers*. Nueva York, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2005 ([http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2005/condom\\_prog2.pdf](http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2005/condom_prog2.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
18. Peters A, Jansen W, van Driel F. *The female condom: the international denial of a strong potential*. *Reproductive Health Matters*, 2010, 18(35):119-128 ([http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080\(10\)35499-1/fulltext](http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(10)35499-1/fulltext), consultado el 25 de febrero del 2014).
19. *Priority HIV and sexual health interventions in the health sector for men who have sex with men and transgender people in the Asia-Pacific Region*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.
20. *Global AIDS response progress reporting 2012: guidelines construction of core indicators for monitoring the 2011 Political Declaration on HIV/AIDS*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2011.
21. United Nations General Assembly. General Assembly Resolution 65/277 - *Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS*. Nueva York, Naciones Unidas, 2011.
22. United Nations Economic and Social Council. *United Nations Economic and Social Council Resolution E/2009/L.23: Joint United Nations Programme on Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome(UNAIDS); Adopted 24 July 2009*. Nueva York, Naciones Unidas, 2009.
23. *Resolution 53/9: Achieving universal access to prevention, treatment, care and support for drug users and people living with or affected by HIV*. Viena, Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 2010.
24. *4th Meeting of the UNAIDS Programme Coordinating Board Geneva, Switzerland 22-24 June 2009: decisions, recommendations and conclusions*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2009.
25. *Evidence for action: effectiveness of community-based outreach in preventing HIV/AIDS among injecting drug users*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004 ([http://www.who.int/hiv/pub/prev\\_care/evidenceforactionreprint2004.pdf](http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/evidenceforactionreprint2004.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
26. Silva-Santisteban A et al. Understanding the HIV/AIDS epidemic in transgender women of Lima, Peru: results from a sero-epidemiologic study using respondent driven sampling. *AIDS Behavior*, 2012, 16(4):872-881 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983694>, consultado el 28 de febrero del 2014).
27. *Guide to starting and managing needle and syringe programmes*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596275\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596275_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
28. Agrawal N et al. Silicone-induced granuloma after injection for cosmetic purposes: a rare entity of calcitriol-mediated hypercalcemia. *Case Reports in Medicine*, 2013.
29. Ellenbogen R, Rubin L. Injectable fluid silicone therapy. Human morbidity and mortality. *Journal of the American Medical Association*, 1975, 234(3):308-309.
30. Wilson E et al. The use and correlates of illicit silicone or "fillers" in a population-based sample of transwomen, San Francisco, 2013. *Journal of Sexual Medicine*, 2014.
31. Ball A, 1998. Policies and interventions to stem HIV-1 epidemics associated with injecting drug use. En Stimson GV, Des Jarlais DC, Ball A, eds. *Drug injecting and HIV infection*. Londres, UCL Press, 1998.
32. *Tool to set and monitor targets for HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations*. Ginebra, OMS, 2015. <http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/kpp-monitoring-tools/en/>
33. Institute of Medicine of the National Academies. *Preventing HIV infection among injecting drug users in high risk countries: an assessment of the evidence*. Washington, DC, Academia Nacional de Ciencias, 2007 ([http://www.nap.edu/openbook.php?record\\_id=11731](http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11731), consultado el 28 de febrero del 2014).
34. Degenhardt L et al. *HIV prevention for people who inject drugs: why individual, structural, and combination approaches are needed*. *Lancet*, 2010, 376(9737):285-301 (<http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673610607428.pdf>, consultado el 28 de febrero del 2014).
35. Wodak A, Cooney A. Do needle syringe programs reduce HIV infection among injecting drug users: a comprehensive review of the international evidence. *Substance Use & Misuse*, 2006, 41(6-7):777- 813 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16809167>, consultado el 28 de febrero del 2014).

36. *Effectiveness of sterile needle and syringe programming in reducing HIV/AIDS among injecting drug users.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004 (Evidence for Action Technical Papers) ([http://www.who.int/hiv/pub/prev\\_care/effectivenesssterileneedle.pdf](http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/effectivenesssterileneedle.pdf), consultado el 28 de febrero del 2014).
37. *Policy brief: reduction of HIV transmission in prisons.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004 (Evidence for Action on HIV/AIDS and Injecting Drug Use) ([http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO\\_HIV\\_2004.05.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_HIV_2004.05.pdf), consultado el 28 de febrero del 2014).
38. Palmateer N et al. Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews. *Addiction*, 2010, 105:844-859.
39. *Guidance on prevention of viral hepatitis B and C among people who inject drugs.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75357/1/9789241504041\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75357/1/9789241504041_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
40. Hagan H, Pouget ER, Des Jarlais DC. A systematic review and meta-analysis of interventions to prevent hepatitis C virus infection in people who inject drugs. *Journal of Infectious Diseases*, 2011, 204:74-83.
41. Hagan H et al. An interview study of participants in the Tacoma, Washington, syringe exchange. *Addiction*, 1993, 88(12):1691-1697.
42. National Research Council. *Preventing HIV infection among injecting drug users in high risk countries: an assessment of the evidence.* Washington, DC, The National Academies Press, 2006.
43. Schechter MT et al. Do needle exchange programmes increase the spread of HIV among injection drug users?: an investigation of the Vancouver outbreak. *AIDS*, 1999, 13(6):F45-51.
44. Watters JK et al. Syringe and needle exchange as HIV/AIDS prevention for injection drug users. *Journal of the American Medical Association*, 1994, 271(2):115-120.
45. *Policy brief: provision of sterile injecting equipment to reduce HIV transmission.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004 (Evidence for Action on HIV/AIDS and Injecting Drug Use) ([http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO\\_HIV\\_2004.03.pdf?ua=1](http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_HIV_2004.03.pdf?ua=1), consultado el 28 de febrero del 2014).
46. *mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241548069_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
47. *HIV prevention in generalized epidemics: optimal interventions for Global Fund applications: recommendations for a public health approach.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502467\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502467_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
48. Gowing L et al. Substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2008, 2:CD004145. doi: 10.1002/14651858. CD004145.pub3 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425898>, consultado el 28 de febrero del 2014).
49. *Effectiveness of drug dependence treatment in preventing HIV among injecting drug users.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2004 (<http://www.who.int/hiv/pub/idu/e4a-drug/en/>, consultado el 28 de febrero del 2014).
50. *Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009 ([http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/opioid\\_dependence\\_guidelines.pdf](http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
51. Ward J, Mattick RP, Hall W, eds. *Methadone maintenance treatment and other opioid replacement therapies.* Sydney, Harwood Academic Publishers, 1998 (<http://www.drugsandalcohol.ie/3767>, consultado el 28 de febrero del 2014).
52. Heimer R et al. Structural interventions to improve opiate maintenance. *International Journal of Drug Policy*, 2002, 13(2):103-111 (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395902000099>, consultado el 28 de febrero del 2014).
53. Lawrinson P et al. Key findings from the WHO collaborative study on substitution therapy for opioid dependence and HIV/AIDS. *Addiction*, 2008, 103:1484-1492 (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2008.02249.x/abstract>, consultado el 28 de febrero del 2014).
54. Spire B, Lucas GM, Carrieri MP. Adherence to HIV treatment among IDUs and the role of opioid substitution treatment (OST). *International Journal of Drug Policy*, 2007, 18(4):262-270 (<https://www.plhivpreventionresources.org/index.cfm?action=main.abstract&id=1460>, consultado el 28 de febrero del 2014).

55. Hall W. Methadone Maintenance Treatment as a Crime Control Measure. *Crime and Justice Bulletin: Contemporary Issues in Crime and Justice*, 1996, 29 (<http://www.bocsar.nsw.gov.au/agdbasev7wrf/bocsar/documents/pdf/cjb29.pdf>, consultado el 28 de febrero del 2014).
56. Tenore P. Psychotherapeutic benefits of opioid agonist therapy. *Journal of Addictive Diseases*, 2008, 27:49-65 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18956529>, consultado el 28 de febrero del 2014).
57. Hendrée JE et al. The effectiveness of incentives in enhancing treatment attendance and drug abstinence in methadone-maintained pregnant women. *Drug and Alcohol Dependence*, 2001, 61(3):297-306 (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871600001526>, consultado el 28 de febrero del 2014).
58. Herget G. Methadone and buprenorphine added to the WHO list of essential medicines. *HIV/AIDS Policy & Law Review*, 2005, 10(3):23-24 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16544403>, consultado el 28 de febrero del 2014).
59. *Guidelines for identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 ([http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/pregnancy\\_guidelines/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/pregnancy_guidelines/en/), consultado el 11 de marzo del 2014).
60. *Rolling out of opioid substitution treatment (OST) in Tihar prisons*, India: scientific report. Viena, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013.
61. Degenhardt L et al. What has been achieved in HIV prevention, treatment and care for people who inject drugs, 2010-2012? A review of the six highest burden countries. *International Journal of Drug Policy*, 2014, 25:53-60 (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095539591300128X>, consultado el 27 de febrero del 2014).
62. *Evidence for action: effectiveness of drug dependence treatment in preventing HIV among injecting drug users*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005 ([http://www.who.int/hiv/pub/idul/drugdependence\\_final.pdf](http://www.who.int/hiv/pub/idul/drugdependence_final.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
63. Farrell M et al. *Effectiveness of drug dependence treatment in HIV prevention*. *International Journal on Drug Policy*, 2005, 16(1):S67-S75 ([http://www.researchgate.net/publication/228339212\\_Effectiveness\\_of\\_drug\\_dependence\\_treatment\\_in\\_HIV\\_prevention](http://www.researchgate.net/publication/228339212_Effectiveness_of_drug_dependence_treatment_in_HIV_prevention), consultado el 27 de febrero del 2014).
64. Sorensen JL, Copeland AL. *Drug abuse treatment as an HIV prevention strategy: a review*. *Drug and Alcohol Dependence*, 2000, 59(1):17-31 ([http://www.researchgate.net/publication/12608715\\_Drug\\_abuse\\_treatment\\_as\\_an\\_HIV\\_prevention\\_strategy\\_a\\_review/file/9fcfd50c6233394473.pdf](http://www.researchgate.net/publication/12608715_Drug_abuse_treatment_as_an_HIV_prevention_strategy_a_review/file/9fcfd50c6233394473.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
65. *Policy guidelines for collaborative TB and HIV services for injecting and other drug users: an integrated approach*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008 (Evidence for Action Technical Papers) ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596930\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596930_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014) e *Integrating collaborative TB and HIV services within a comprehensive package of care for people who inject drugs.- Consolidated guidelines*. Ginebra, OMS, 2016. ([http://www.who.int/tb/publications/integrating-collaborative-tb-and-hiv\\_services\\_for\\_pwid/en/](http://www.who.int/tb/publications/integrating-collaborative-tb-and-hiv_services_for_pwid/en/)).
66. *UN joint statement: compulsory detention and rehabilitation centres*. Ginebra, Naciones Unidas, 2012 ([http://www.who.int/hiv/topics/idul/joint\\_statement\\_20120308.pdf](http://www.who.int/hiv/topics/idul/joint_statement_20120308.pdf), consultado el 22 de mayo del 2014).
67. Degenhardt L, Hall W. Extent of illicit drug use and dependence, and their contribution to the global burden of disease. *Lancet*, 2012, 379(9810):55-70.
68. *WHO model list of essential medicines*, 18th list, April 2013. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/18th\\_EML\\_Final\\_web\\_8Jul13.pdf](http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/18th_EML_Final_web_8Jul13.pdf), consultado el 28 de febrero del 2014).
69. *Guidelines on the management of opioid overdose in the community setting*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud. Próxima publicación.
70. Sawyer SM et al. Adolescence: a foundation for future health. *Lancet*, 2012, 379(9826):1630-1640.
71. *Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex workers: practical approaches from collaborative interventions*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex\\_worker\\_implementation/en/](http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/), consultado el 23 de mayo del 2014).
72. *Guidance brief: HIV interventions for most-at-risk young people*. Nueva York, Equipo de Tareas Interinstitucional sobre el VIH y los Jóvenes, 2007.

73. Interagency Youth Working Group. *Young people most at risk of HIV: a meeting report and discussion paper from the Interagency Youth Working Group*, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Inter-Agency Task Team on HIV and Young People del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y FHI. Research Triangle Park, NC, EUA, FHI, 2010.
74. *Guidance on oral pre-exposure prophylaxis (PrEP) for serodiscordant couples, men and transgender women who have sex with men at high risk of HIV: recommendations for use in the context of demonstration projects*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75188/1/9789241503884\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75188/1/9789241503884_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014) y *Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV*. Ginebra, OMS, 2015. ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186275/1/9789241509565_eng.pdf)).
75. Grant RM et al. Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. *New England Journal of Medicine*, 2010, 363(27):2587-2599.
76. Choopanya K. Antiretroviral prophylaxis for HIV infection in injecting drug users in Bangkok, Thailand (the Bangkok Tenofovir Study): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. *Lancet*, 2013, 381(9883):2083-2090.
77. Vanichseni S et al. *HIV-associated risk behaviour among injecting drug users participating in an HIV pre-exposure prophylaxis trial in Bangkok, Thailand*. Póster presentado en la 7.ª Conferencia IAS sobre Patogenia, Tratamiento y Prevención del VIH, Kuala Lumpur, Malasia, del 30 de junio al 3 de julio del 2013. MOLBPE27.
78. Thai Drug Users Network, Thai AIDS Treatment Action Group, Treatment Action Group. *U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sponsored HIV preexposure prophylaxis (PrEP) trial among Thai injection drug users marred by lack of response to community concerns*. Bangkok, Thai Treatment Action Group, 26 de junio del 2013 (<http://www.treatmentactiongroup.org/hiv/Bangkok-prep-statement>, consultado el 29 de abril del 2014).
79. *Guidelines on post-exposure prophylaxis for HIV and the use of co-trimoxazole prophylaxis for HIV-related infections among adults, adolescents and children*. Ginebra, OMS, 2014 [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145719/1/9789241508193\\_eng.pdf?ua=1&ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145719/1/9789241508193_eng.pdf?ua=1&ua=1).
80. *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
81. Auvert B et al. Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for reduction of HIV infection risk: the ANRS 1265 Trial. *PLoS Med*, 2005, 2(11):e298.
82. Bailey R et al. Male circumcision for HIV prevention in young men in Kisumu, Kenya: a randomised controlled trial. *Lancet*, 2007, 369:643-656.
83. Gray R et al. Male circumcision for HIV prevention in men in Rakai, Uganda: a randomised trial. *Lancet*, 2007, 369:657-666.
84. *Technical Consultation on Male Circumcision and HIV Prevention: research implications for policy and programming*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 ([http://libdoc.who.int/publications/2007/9789241595988\\_eng.pdf](http://libdoc.who.int/publications/2007/9789241595988_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
85. Gray R et al. The effectiveness of male circumcision for HIV prevention and effects on risk behaviors in a posttrial follow-up study. *AIDS*, 2012, 26(5):609-615. 610.1097/QAD.1090b1013e3283504a32 83503f.
86. *HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for policy-makers and managers*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013.
87. Lum PJ, Ochoa, KC, Moss, AR. Hepatitis B virus immunization among young injection drug users in San Francisco, Calif: the UFO Study. *American Journal of Public Health*, 2003, 93(6):919-923 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447870/>, consultado el 27 de febrero del 2014).
88. *Service delivery approaches to HIV testing and counselling (HTC): a strategic HTC policy framework*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75206/1/9789241593877\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75206/1/9789241593877_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
89. Hall, AJ et al. Hepatitis B vaccination: protection for how long and against what? *British Medical Journal*, 1993, 307(6899):276-277 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1678572/pdf/bmj00032-0006.pdf>, consultado el 27 de febrero del 2014).

90. *Joint statement on scaling up voluntary community-based HIV testing and counselling for key populations in Asia and the Pacific*. Bangkok, Red de Personas con VIH/Sida de Asia y el Pacífico, Red Asiática de Personas que Consumen Drogas, Coalición de Redes Regionales de VIH/Sida de Asia y el Pacífico, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Organización Mundial de la Salud, Red de Trabajadores del sexo de Asia y el Pacífico, Coalición de Salud Sexual Masculina de Asia y el Pacífico, y Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA del Presidente de los Estados Unidos, 2013 ([http://www.wpro.who.int/hiv/Joint\\_Statement\\_on\\_scaling\\_up\\_community\\_based\\_testing\\_in\\_AP.pdf](http://www.wpro.who.int/hiv/Joint_Statement_on_scaling_up_community_based_testing_in_AP.pdf), consultado el 22 de mayo del 2014).
91. *Guidance on provider-initiated HIV testing and counselling in health facilities*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595568\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241595568_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014) y *Consolidated guidelines on HIV testing services*. Ginebra, OMS, 2015. [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926\\_eng.pdf?ua=1&ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179870/1/9789241508926_eng.pdf?ua=1&ua=1) y *Supplement guidelines on HIV self-testing and partner notification*. Ginebra, OMS, 2016. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251655/1/9789241549868-eng.pdf?ua=1>.
92. *Guidance on couples HIV testing and counselling including antiretroviral therapy for treatment and prevention in serodiscordant couples: recommendations for a public health approach*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241501972\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241501972_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
93. *HIV testing and counselling in prisons and other closed settings, technical paper*. Nueva York, Naciones Unidas, 2009 ([http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Final\\_UNODC\\_WHO\\_UNAIDS\\_technical\\_paper\\_2009\\_TC\\_prison\\_ebook.pdf](http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Final_UNODC_WHO_UNAIDS_technical_paper_2009_TC_prison_ebook.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
94. *Guideline on HIV disclosure counselling for children up to 12 years of age*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http://www.who.int/hiv/pub/hiv\\_disclosure/en/index.html](http://www.who.int/hiv/pub/hiv_disclosure/en/index.html), consultado el 22 de mayo del 2014).
95. *Handbook for improving HIV testing and counselling services: field-test version*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.
96. *Report on the first international symposium on self-testing for HIV: the legal, ethical, gender, human rights and public health implications of HIV self-testing scale-up*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85267/1/9789241505628\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85267/1/9789241505628_eng.pdf), consultado el 4 de junio del 2014).
97. *A short technical update on self-testing for HIV*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2014 ([http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/JC2603\\_self-testing\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2014/JC2603_self-testing_en.pdf), consultado el 4 de junio del 2014).
98. *March 2014 supplement to the 2013 consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 ([http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/TAR2013/TARs2013supplement\\_march2014/en/](http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/TAR2013/TARs2013supplement_march2014/en/), consultado el 22 de mayo del 2014).
99. Braunstein SL et al. HIV diagnosis, linkage to HIV care, and HIV risk behaviors among newly diagnosed HIV-positive female sex workers in Kigali, Rwanda. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*, 2011, 57(4):e70-76.
100. Chakrapani V et al. Barriers to antiretroviral treatment access for injecting drug users living with HIV in Chennai, South India. *AIDS Care*, 2014, 26(7):835-841.
101. Buckingham E, Schrage E, Cournos F. Why the treatment of mental disorders is an important component of HIV prevention among people who inject drugs. *Advances in Preventive Medicine*, 2013.
102. Wouters E et al. Impact of community-based support services on antiretroviral treatment programme delivery and outcomes in resource-limited countries: a synthetic review. *BMC Health Services Research*, 2012, 12:194.
103. Milloy MJ, Montaner J, Wood E. Barriers to HIV treatment among people use injection drugs: implications for "treatment as prevention". *Current Opinion in HIV/AIDS*, 2012, 7(4):332-338.
104. Shastri S et al. The journey to antiretroviral therapy in Karnataka, India: who was lost on the road? *Journal of the International AIDS Society*, 2013, 16(1):18502.
105. Mtetwa S et al. You are wasting our drugs: health service barriers to HIV treatment for sex workers in Zimbabwe. *BMC Public Health*, 2013, 13(698).

106. Govindasamy D et al. Linkage to HIV care from a mobile testing unit in South Africa by different CD4 count strata. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*, 2011, 58(3):344-352.
107. Roberson DW, White BL. Factors influencing adherence to antiretroviral therapy for HIV infected female inmates. *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care*, 2009, 20(1):50-61.
108. Small W et al. The impact of incarceration upon adherence to HIV treatment among HIV-positive injection drug users: a qualitative study. *AIDS Care*, 2009, 21(6):708-714.
109. Shalihi N et al. Namibian prisoners describe barriers to HIV antiretroviral therapy adherence. *AIDS Care*, 2014, 26(8).
110. Catz SL et al. Prevention needs of HIV-positive men and women awaiting release from prison. *AIDS Behaviour*, 2011, 16(1):108-120.
111. Fontana L, Beckerman A. Recently released with HIV/AIDS: primary care treatment needs and experiences. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 2007, 18(3):699-714.
112. Wohl DA et al. Intensive case management before and after prison release is no more effective than comprehensive pre-release discharge planning in linking HIV-infected prisoners to care: a randomized trial. *AIDS Behavior*, 2011, 15(2) 356-364.
113. Nunn A, Cornwall A, et al. Linking HIV-positive jail inmates to treatment, care, and social services after release: results from a qualitative assessment of the COMPASS program. *Journal of Urban Health*, 2010; 87(6):954-968.
114. Zaller ND et al. Linkage to treatment and supportive services among HIV-positive ex-offenders in Project Bridge. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 2008, 19(2):522-531.
115. Wolfe D, Carrieri MP, Shepard D. Treatment and care for injecting drug users with HIV infection: a review of barriers and ways forward. *Lancet*, 2010, 376(9738):355-366.
116. *IMAI one-day orientation on adolescents living with HIV: participants manual and facilitator guide*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.
117. *Adolescent HIV care and treatment: a training curriculum for health workers*. Nueva York, International Center for AIDS Care and Treatment Programs, 2012.
118. *Toolkit for transition of care and other services for adolescents living with HIV*. Arlington, VA, EUA, AIDSTAR-One, 2013.
119. *Guidelines for the identification and management of substance use and substance use disorders in pregnancy*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/107130/1/9789241548731\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/107130/1/9789241548731_eng.pdf), consultado el 9 de junio del 2014).
120. *Treatment of tuberculosis: guidelines for national programmes, 4th ed*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547833_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
121. Benhamou Y et al. Liver fibrosis progression in human immunodeficiency virus and hepatitis C virus coinfecting patients. *Hepatology*, 1999, 30:1054-1058.
122. *Medical eligibility criteria for contraceptive use – 4th ed*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563888\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563888_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
123. *HIV, sexually transmitted infections and other health needs among transgender people in Asia and the Pacific: joint regional technical brief*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 (<http://www.wpro.who.int/hiv/documents/tgtechnicalbriefs/en/>, consultado el 22 de mayo del 2014).
124. *Global tuberculosis report 2013*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/91355/1/9789241564656\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/91355/1/9789241564656_eng.pdf), consultado el 28 de febrero del 2014).
125. *WHO policy on TB infection control in health-care facilities, congregate settings and households*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009.
126. Mathers BM et al. Reference Group to the UN on HIV and Injecting Drug Use. Global epidemiology of injecting drug use and HIV among people who inject drugs: a systematic review. *Lancet*, 2008, 372(9651):1733-1745 (<http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673608613112/abstract?isEOP=true>, consultado el 25 de febrero del 2014).

127. Van den Hof S et al. Converging risk factors but no association between HIV infection and multidrug-resistant tuberculosis in Kazakhstan. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 2013, 17(4):526-531.
128. Akksilp S et al. Multi-drug resistant TB and HIV in Thailand: overlapping, but not independently associated risk factors. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 2009, 40(6):1264.
129. Sterling et al. A multi-state outbreak of tuberculosis among members of a highly mobile social network: implications for tuberculosis elimination. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 2000, 11(9):1066–1073 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11092720>, consultado el 6 de junio del 2014).
130. Palmero D et al. Multidrug-resistant tuberculosis outbreak among transvestite sex workers, Buenos Aires, Argentina. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 2005, 9(10):1168-1170 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16229230>, consultado el 6 de junio del 2014).
131. Lönnroth K et al. Drivers of tuberculosis epidemics: the role of risk factors and social determinants. *Social Science & Medicine*, 2009, 68(12):2240-2246. doi: 10.1016/j.socscimed.2009.03.041. Epub: 23 de abril del 2009.
132. Levy MH, Reyes H, Coninx R. Overwhelming consumption in prisons: human rights and tuberculosis control. *Health and Human Rights*, 1999, 4:166-191.
133. Dara M et al. *Guidelines for control of tuberculosis in prisons*. Washington, DC, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2009 ([http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PNADP462.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADP462.pdf), consultado el 6 de junio del 2014).
134. Conover C et al. Outbreak of multidrug-resistant tuberculosis at a methadone treatment program *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 2001, 5:59-64.
135. Tan de Bibiana J et al. Tuberculosis and homelessness in Montreal: a retrospective cohort study. *BMC Public Health*, 2011, 11:833. doi: 10.1186/1471-2458-11-833.
136. *WHO policy on TB infection control in health-care facilities, congregate settings and households*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009 ([http://www.who.int/tb/publications/2009/infection\\_control/en/](http://www.who.int/tb/publications/2009/infection_control/en/), consultado el 6 de junio del 2014).
137. *Guidelines for intensified tuberculosis case finding and isoniazid preventive therapy for people living with HIV in resource constrained settings*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241500708\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241500708_eng.pdf), consultado el 28 de febrero del 2014).
138. *WHO Policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/tb/publications/2012/tb\\_hiv\\_policy\\_9789241503006/en/](http://www.who.int/tb/publications/2012/tb_hiv_policy_9789241503006/en/), consultado el 22 de mayo del 2014).
139. *Antiretroviral treatment as prevention (TasP) of HIV and TB: 2012 update*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO\\_HIV\\_2012.12\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_HIV_2012.12_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
140. Rangaka MX et al. Isoniazid plus antiretroviral therapy to prevent tuberculosis: a randomised double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*, 2014 ([http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(14\)60162-8/abstract](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60162-8/abstract), consultado el 6 de junio del 2014).
141. *Automated real-time nucleic acid amplification technology for rapid and simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin resistance: Xpert MTB/RIF system for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children: policy update*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112472/1/9789241506335\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112472/1/9789241506335_eng.pdf), consultado el 28 de febrero del 2014).
142. McCance-Katz E et al. *Drug and Alcohol Dependence*, 2011, 118(2-3):326-334.
143. Protocol 4. *Management of tuberculosis and HIV coinfection, 2013 revision*. Copenhagen, Oficina Regional de la OMS para Europa, 2013.
144. Friedland G. Infectious disease comorbidities adversely affecting substance users with HIV: hepatitis C and tuberculosis. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*, 2010, 55:S37-S42.
145. Nelson PK et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. *Lancet*, 2011, 378(9791):571-583.
146. Larney S et al. Incidence and prevalence of hepatitis C in prisons and other closed settings: results of a systematic review and meta-analysis. *Hepatology*, 2013, 58(4):1215-1224.

147. Weinbaum C et al. Prevention and control of infections with hepatitis viruses in correctional settings. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 2003, 52(RR-1):1-34.
148. Semaille C et al. Prevalence of human immunodeficiency virus and hepatitis C virus among French prison inmates in 2010: a challenge for public health policy. *Euro Surveill*, 2013, 18(28) pii:20524.
149. Adjei AA et al. Prevalence of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus and syphilis among prison inmates and officers at Nsawam and Accra, Ghana. *Journal of Medical Microbiology*, 2006, 55(Pt 5):593-597.
150. Barros LA et al. Epidemiology of the viral hepatitis B and C in female prisoners of Metropolitan Regional Prison Complex in the State of Goiás, Central Brazil. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 2013, 46(1):24-29.
151. Deng LP et al. Impact of human immunodeficiency virus infection on the course of hepatitis C virus infection: a meta- analysis. *World Journal of Gastroenterology*, 2009, 15:996-1003.
152. Des Jarlais, DC, Fisher, DG, Perlman, D. Providing hepatitis B vaccination to injection drug users: referral to health clinics vs. on-site vaccination at a syringe exchange program. *American Journal of Public Health*, 2001, 91(11):1791-1792 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446878/>, consultado el 27 de febrero del 2014).
153. Des Jarlais DC, Semaan S. Interventions to reduce the sexual risk behaviour of injecting drug users *International Journal on Drug Policy*, 2005, 16(1):S58-S66 (<http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/drupal/article/PIIS0955395905000794/abstract>, consultado el 27 de febrero del 2014).
154. Rockstroh J et al. *Increases in acute hepatitis C (VHC) incidence across Europe: which regions and patient groups are affected?* Trabajo presentado en el 11er Congreso Internacional sobre Farmacoterapias contra la Infección por el VIH (HIV11), Glasgow, del 11 al 15 de noviembre del 2012, resumen O242.
155. *Immunization, vaccines and biologicals. IVB document centre*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 (<http://www.who.int/immunization/documents/en/>, consultado el 22 de mayo del 2014).
156. *WHO vaccine-preventable diseases: monitoring system. 2013 global summary*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://apps.who.int/immunization\\_monitoring/globalsummary/](http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/), consultado el 22 de mayo del 2014).
157. Pineda JA et al. HIV coinfection shortens the survival of patients with hepatitis C virus-related decompensated cirrhosis. *Hepatology*, 2005, 41:779-789.
158. *Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection*. Geneva, WHO, 2014 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/111747/1/9789241548755\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/111747/1/9789241548755_eng.pdf), consultado el 2 de junio del 2014).
159. Walsh N et al. The silent epidemic: responding to viral hepatitis among people who inject drugs. In: Cook C, ed. *Global state of harm reduction 2010*. Londres, International Harm Reduction Association, 2011 ([http://www.ihra.net/files/2010/06/15/Chapter\\_3.1Web\\_.pdf](http://www.ihra.net/files/2010/06/15/Chapter_3.1Web_.pdf), consultado el 28 de febrero del 2014).
160. Kuo I et al. Hepatitis B virus infection and vaccination among young injection and non-injection drug users: missed opportunities to prevent infection. *Drug and Alcohol Dependence*, 2004, 73(1):69-78 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687961>, consultado el 27 de febrero del 2014).
161. Topp L et al. A randomised controlled trial of financial incentives to increase hepatitis B vaccination completion among people who inject drugs in Australia. *Preventive Medicine*, 2013, 57(4):297-303.
162. Joska JA et al. Severe mental illness and retention in anti-retroviral care: a retrospective study. *AIDS Behavior*, 2014:1-9.
163. *Global health estimates 2013 summary tables: DALYs, YLLs and YLDs by cause, age and sex by WHO regional group and World Bank income classification, 2000-2012 (provisional estimates)*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014.
164. Ivers LC et al. HIV/AIDS, under nutrition, and food insecurity. *Clinical Infectious Diseases*, 2009, 49:1096-1102 (<http://cid.oxfordjournals.org/content/49/7/1096.full.pdf>, consultado el 27 de febrero del 2014).
165. Fleming DT, Wasserheit JN. From epidemiological synergy to public health policy and practice: the contribution of other sexually transmitted diseases to sexual transmission of HIV infection. *Sexually Transmitted Infections*, 1999, 75(1):3 (<http://sti.bmj.com/content/75/1/3.long>, consultado el 27 de febrero del 2014).

166. *Sexually transmitted and other reproductive tract infections*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005 (<http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241592656.pdf>, consultado el 27 de febrero del 2014).
167. Donoghoe MC. Sex, HIV and the injecting drug user. *Addiction*, 1992, 87:405-416 (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.1992.tb01941.x/abstract>, consultado el 27 de febrero del 2014).
168. Polis CB, Curtis KM. Use of hormonal contraceptives and HIV acquisition in women: a systematic review of the epidemiological evidence. *Lancet Infectious Diseases*, 2013, 13(9):797-808 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23871397>, consultado el 27 de febrero del 2014).
169. La Vigne NG et al. Preventing violence and sexual assault in jail: a situational crime prevention approach. *Justice Policy Center Brief*, 2011.
170. Yap L et al. The decline in sexual assaults in men's prisons in New South Wales: a systems approach. *Journal of Interpersonal Violence*, 2011, 26(15):3157-3181.
171. Ravi A, Blankenship KM, Altice FL. The association between history of violence and HIV risk: a cross-sectional study of HIV-negative incarcerated women in Connecticut. *Women's Health Issues*, 2007, 17(4):210-216.
172. Kerbs JJ, Jolley JM. Inmate-on-inmate victimization among older male prisoners. *Crime and Delinquency*, 2007, 31(5):385-393.
173. *Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services Guidance and recommendations*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 ([http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family\\_planning/human-rights-contraception/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/), consultado el 22 de mayo del 2014).
174. *Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, 2nd ed*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe\\_abortion/9789241548434/en/](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/en/), consultado el 22 de mayo del 2014).
175. De Vuyst H et al. HIV, human papillomavirus, and cervical neoplasia and cancer in the era of highly active antiretroviral therapy. *European Journal of Cancer Prevention*, 2008, 17:545-554.
176. Denny L et al. Human papillomavirus infection and cervical disease in human immunodeficiency virus-1-infected women. *Obstetrics and Gynecology*, 2008, 111:1380-1387.
177. Firnhaber C et al. Association between cervical dysplasia and human papillomavirus in HIV seropositive women from Johannesburg South Africa. *Cancer Causes & Control*, 2010, 21:433-443.
178. *WHO guidelines for screening and treatment of precancerous lesions for cervical cancer prevention*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94830/1/9789241548694\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94830/1/9789241548694_eng.pdf), consultado el 27 de febrero del 2014).
179. *Comprehensive cervical cancer prevention and control - a healthier future for girls and women: WHO guidance note*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 (<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9789241505147/en/index.html>, consultado el 7 de marzo del 2014).
180. Grulich AE et al. Incidence of cancers in people with HIV/AIDS compared with immunosuppressed transplant recipients: a meta-analysis. *Lancet*, 2007, 370(9581):59-67.

## CAPÍTULO 5 ELEMENTOS FACILITADORES FUNDAMENTALES

1. *Improving access of key populations to comprehensive HIV health services: towards a Caribbean consensus*. Washington, DC, Organización Panamericana de la Salud, 2011 ([http://www.paho.org/hq/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=23644&Itemid](http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=23644&Itemid), consultado el 22 de mayo del 2014).
2. *Understanding and acting on critical enablers and development synergies for strategic investment*. Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011 ([http://www.undp.org/content/dam/undp/library/hiv/aids/English/UNAIDS\\_UNDP\\_Enablers\\_and\\_Synergies\\_ENG.pdf](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/hiv/aids/English/UNAIDS_UNDP_Enablers_and_Synergies_ENG.pdf), consultado el 2 de julio del 2014).
3. *UNAIDS guidance note on HIV and sex work*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, 2012 ([http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306\\_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work\\_en.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf), consultado el 29 de mayo del 2014).

4. *Tool for setting and monitoring targets for prevention, treatment and care for HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men, sex workers and transgender people.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014.
5. *Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic.* Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, 2013.
6. *HIV and prisons in sub-Saharan Africa: opportunities for action.* Viena, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2007 ([http://www.unodc.org/documents/hiv-ids/Africa%20HIV\\_Prison\\_Paper\\_Oct-23-07-en.pdf](http://www.unodc.org/documents/hiv-ids/Africa%20HIV_Prison_Paper_Oct-23-07-en.pdf), consultado el 22 de mayo del 2014).
7. *HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for policy-makers and managers.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
8. Global Commission on HIV and the Law. *Risks, rights and health.* Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012.
9. *Addressing sex work, MSM and transgender people in the context of the HIV epidemic: information note.* Ginebra, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 2014.
10. *Prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections for sex workers in low- and middle-income countries: recommendations for a public health approach.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/77745/1/9789241504744\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/77745/1/9789241504744_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
11. *Prevention and treatment of HIV and other sexually transmitted infections among men who have sex with men and transgender people.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 ([http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/msm\\_guidelines2011/en/](http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/msm_guidelines2011/en/), consultado el 2 de mayo del 2014).
12. *Effectiveness of interventions to address HIV in prisons.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 (Evidence for Action Technical Papers) ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190\\_eng.pdf?ua=1](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190_eng.pdf?ua=1), consultado el 23 de mayo del 2014).
13. *Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users – 2012 revision.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2012 ([http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets\\_universal\\_access/en/](http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/), consultado el 22 de mayo del 2014).
14. *UN Joint Statement Compulsory detention and rehabilitation centres.* Ginebra, Organización de las Naciones Unidas, 2012 ([http://www.who.int/hiv/topics/idu/joint\\_statement\\_20120308.pdf](http://www.who.int/hiv/topics/idu/joint_statement_20120308.pdf), consultado el 22 de mayo del 2014).
15. *Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services: guidance and recommendations.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 ([http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748\\_eng.pdf?ua](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102539/1/9789241506748_eng.pdf?ua), consultado el 22 de mayo del 2014).
16. Rosmarin A, Eastwood N. *A quiet revolution: drug decriminalisation policies in practice across the globe.* Londres, Release, 2012.
17. Hughes CE, Stevens A. What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? *British Journal of Criminology*, 2010, 50(6):999-1022.
18. *Giving young people the information, skills and knowledge they need. Comprehensive Sexuality Education.* Nueva York, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2013 (<http://www.unfpa.org/public/home/adolescents/pid/6483>, consultado el 11 de marzo del 2014).
19. *Guidance note: key programmes to reduce stigma and discrimination and increase access to Justice in national HIV responses.* Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2012 ([http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/Key\\_Human\\_Rights\\_Programmes\\_en\\_May2012.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/Key_Human_Rights_Programmes_en_May2012.pdf), consultado el 22 de mayo del 2014).
20. *Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex workers: practical approaches from collaborative interventions.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex\\_worker\\_implementation/en/](http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/), consultado el 23 de mayo del 2014).
21. Brou H et al. When do HIV-infected women disclose their HIV status to their male partner and why? A study in a PMTCT programme, Abidjan. *PloS Medicine*, 2007, 4(12):e342.

22. Bwirire LD et al. Reasons for loss to follow-up among mothers registered in a prevention-of- mother-to-child transmission program in Rural Malawi. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 2008, 102(12):1195–1200.
23. *HIV-related stigma: late testing, late treatment: a cross analysis of findings from the People Living with HIV Stigma Index in Estonia, Moldova, Poland, Turkey, and Ukraine*. Copenhagen, HIV in Europe, 2011.
24. Karim QA et al. The influence of AIDS stigma and discrimination and social cohesion on HIV testing and willingness to disclose HIV in rural KwaZulu-Natal, South Africa. *Global Public Health*, 2008, 3(4):351-365.
25. Stangl A et al. A systematic review of interventions to reduce HIV-related stigma and discrimination from 2002 to 2013: have far have we come? *Journal of the International AIDS Society*, 2013.
26. Poteat T, German D, Kerrigan D. Managing uncertainty: a grounded theory of stigma in transgender health care encounters. *Social Science & Medicine*, 2013, 84:22-29.
27. Roberts TK, Fantz C. Barriers to quality health care for the transgender population. *Clinical Biochemistry*, 2014.
28. Katz IT et al. Impact of HIV-related stigma and serostatus disclosure on HIV treatment adherence: systematic review, meta-synthesis, and conceptual framework. *Journal of the International AIDS Society*, 2014, 16(3 Suppl 2).
29. *Policy brief: key populations, key solutions: a gap analysis and recommendations for key populations and HIV in South Africa*. Pretoria, Consejo Nacional de Sudáfrica sobre el Sida, 2011 ([http://www.sanac.org.za/resources/doc\\_download/40-sanac-key-population-policy-brief](http://www.sanac.org.za/resources/doc_download/40-sanac-key-population-policy-brief), consultado el 3 de junio del 2014).
30. Baral S et al. Burden of HIV among female sex workers in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Infectious Diseases*, 2012, 12(7), 538-549.
31. Harcourt D et al. The many faces of sex work. *Sexually Transmitted Infections*, 2005, 81(3):201-206.
32. Potts E. *Accountability and the right to the highest standard of health*. Colchester, University of Essex Human Rights Centre, 2008.
33. *Peer education toolkit*. Nueva York, Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2006 (<http://www.unfpa.org/public/publications/pid/360>, consultado el 22 de mayo del 2014).
34. UNAIDS Inter-Agency Task Team on HIV and Young People. *Global guidance briefs on community based: HIV interventions for young people*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ sida, 2008 (<https://www.unfpa.org/webdav/site/global/groups/youth/public/EN-GlobalGuidance-kit.pdf>, consultado el 22 de mayo del 2014).
35. *GIYPA guidebook: supporting organisations and networks to scale up the meaningful involvement of young people living with HIV*. Ámsterdam, Global Network for and by People Living with HIV, 2012.
36. Gardsbane D. *Gender-based violence and HIV*. Arlington, VA, EUA, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2010.
37. *World report on violence and health*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002 ([http://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/world\\_report/en/](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/), consultado el 23 de mayo del 2014).
38. Pack AP et al. Intimate partner violence against female sex workers in Mombasa, Kenya. *Culture, Health & Sexuality*, 2013, 1-14.
39. Wechsberg WM, et al. *Drugs, sex, gender-based violence, and the intersection of the HIV/AIDS epidemic with vulnerable women in South Africa*. Research Triangle Park, NC, EUA, RTI Press, 2010.
40. *Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 (<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/>, consultado el 22 de mayo del 2014).
41. Deering et al. Prevalence and correlates of violence against sex workers. *American Journal of Public Health*. Por publicarse en el 2014.
42. Schwitters A et al. *Prevalence of rape and gender based violence among female sex workers- Kampala, Uganda*. Inédito.
43. Supervie V, Halima Y, Blower, S. Assessing the impact of mass rape on the incidence of HIV in conflict-affected countries. *AIDS*, 2010, 24:2841-2847.

44. *Young men who have sex with men: health, access & HIV. Data from the 2012 global men's health & rights (GMHR) survey.* Oakland, CA, Foro Mundial sobre HSH y VIH (MSMSGF), 2013 ([http://www.msmsgf.org/files/msmsgf/Publications/MSMGF\\_YMSM\\_PolicyBrief.pdf](http://www.msmsgf.org/files/msmsgf/Publications/MSMGF_YMSM_PolicyBrief.pdf), consultado el 22 de mayo del 2014).
45. Hladik W et al. HIV infection among men who have sex with men in Kampala, Uganda—a respondent driven sampling survey. *PLoS One*, 2012, 7(5):e38143. doi:10.1371/journal.pone.0038143.
46. *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 (<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/>, consultado el 22 de mayo del 2014).
47. *Addressing sex work, MSM and transgender people in the context of the HIV epidemic: information note.* Ginebra, Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 2014.

## CAPÍTULO 6 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

1. *Consolidated guidelines on general HIV care and the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/85321/1/9789241505727_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
2. *Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex workers.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex\\_worker\\_implementation/en/](http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/), consultado el 23 de mayo del 2014).
3. *Guide to starting and managing needle and syringe programmes.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007 ([http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596275\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596275_eng.pdf), consultado el 14 de junio del 2014).
4. *Preventing HIV in sex work settings in sub-Saharan Africa.* Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011 (<http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/acquired-immune-deficiency-syndrome/features/2880-preventing-hiv-in-sex-work-settings-in-sub-saharan-africa.html>, consultado el 4 de junio del 2014).
5. *MENAHRA: The Middle East and North Africa Harm Reduction Association best practices in strengthening civil society's role in delivering harm reduction services.* Cairo, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 2012 ([http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB\\_2012\\_879.pdf](http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2012_879.pdf), consultado el 4 de junio del 2014).
6. *How to improve opioid substitution therapy implementation.* Copenhague, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa, 2014 (<http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hiv/aids/publications/2014/how-to-improve-opioid-substitution-therapy-implementation>, consultado el 4 de junio del 2014).
7. *Improving access of key populations to comprehensive HIV health services.* Washington, DC, Organización Panamericana de la Salud, 2011 ([http://www.paho.org/hq/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=20106&Itemid=](http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=20106&Itemid=), consultado el 4 de junio del 2014).
8. *Blueprint for the provision of comprehensive care to gay men and other men who have sex with men (MSM) in Latin America and the Caribbean.* Washington, DC, Organización Panamericana de la Salud, 2010 (<http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Blueprint%20MSM%20Final%20ENGLISH.pdf>, consultado el 4 de junio del 2014).
9. *Management of common health problems of drug users.* Nueva Delhi, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Asia Sudoriental, 2009 (<http://www.searo.who.int/entity/hiv/documents/9789290222927/en/>, consultado el 4 de junio del 2014).
10. *Priority HIV and sexual health interventions in the health sector for men who have sex with men and transgender people in the Asia-Pacific Region.* Nueva Delhi, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Asia Sudoriental, 2010 (<http://www.searo.who.int/entity/hiv/documents/9789290614630/en/>, consultado el 4 de junio del 2014).

11. *Joint technical brief: HIV, sexually transmitted infections and other health needs among transgender people in Asia and the Pacific*. Manila, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 2013 (<http://www.wpro.who.int/hiv/documents/tgtechnicalbriefs/en/>, consultado el 4 de junio del 2014).
12. *The time has come: enhancing HIV, STI and other sexual health services for MSM and transgender people in Asia and the Pacific*. Bangkok, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Centro Regional de Asia y el Pacífico, 2013 (<http://www.wpro.who.int/hiv/documents/timehascome/en/>, consultado el 4 de junio del 2014).
13. *Regional Assessment of HIV, STI and other health needs of transgender people in Asia and the Pacific*. Manila, Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 2013 (<http://www.wpro.who.int/hiv/documents/regionalassessmentTG/en/>, consultado el 4 de junio del 2014).
14. *Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex workers: practical approaches from collaborative interventions*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex\\_worker\\_implementation/en/](http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/), consultado el 23 de mayo del 2014).
15. *HIV and adolescents: guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV: recommendations for a public health approach and considerations for policy-makers and managers*. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013 ([http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168\\_eng.pdf](http://www.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168_eng.pdf), consultado el 25 de febrero del 2014).
16. United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. Ginebra, Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989 (<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>, consultado el 1 de mayo del 2014).

## CAPÍTULO 7 ELABORACIÓN DE LA RESPUESTA: EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA

1. Jürgens, R. *"Nothing about us without us" – greater, meaningful involvement of people who use illegal drugs: a public health, ethical, and human rights imperative*. Ontario, Canadian HIV/AIDS Legal Network, 2005.
2. *The human rights costing tool (HRCT): a tool to cost programs to reduce stigma and discrimination and increase access to justice*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ SIDA, 2012 ([http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/data-and-analysis/tools/The\\_Human\\_Rights\\_Costing\\_Tool\\_v\\_1\\_5\\_May-2012.xlsm](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/data-and-analysis/tools/The_Human_Rights_Costing_Tool_v_1_5_May-2012.xlsm), consultado el 23 de mayo del 2014).
3. *The user guide for the HIV-related human rights costing tool: costing programmes to reduce stigma and discrimination and increase access to justice in the context of HIV*. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2012 ([www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/The\\_HRCT\\_User\\_Guide\\_FINAL\\_2012-07-09.pdf](http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2012/The_HRCT_User_Guide_FINAL_2012-07-09.pdf), consultado el 23 de mayo del 2014).





**Para solicitar más información:**

Organización Panamericana de la Salud  
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C.  
20037, Estados Unidos de América

[www.paho.org/vih](http://www.paho.org/vih)

