

# **INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL**

---

**Maria Eugenia Casado**  
**Instituto Chileno de Medicina**  
**Reproductiva**  
**2004**

# **INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL**

---



# Infecciones de transmisión sexual

---




Las Infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo la infección por el virus *VIH* del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), afectan a millones de personas cada año.

# Características de las ITS I

---

- Son enfermedades infectocontagiosas
- Se transmiten directamente
  - a través de relaciones sexuales
  - por vía transplacentaria
  - por intercambio sanguíneo durante el parto
  - por la leche materna
  - por transfusiones sanguíneas
  - por uso de material corto-punzante contaminado

# CASOS ACUMULADOS DE SIDA POR CATEGORIA DE EXPOSICION DECLARADA CHILE, 1984-2000.



# Características de las ITS

---


II



- Afectan de preferencia a población joven (entre 18 a 50 años) que es la que está sexualmente más activa
- La promiscuidad sexual, y la drogadicción endovenosa son factores de riesgo
- Las personas afectadas por una ITS son más vulnerables a contraer el VIH/SIDA

# NOTIFICACIONES DE ITS POR GRUPO ETAREO.

VIGILANCIA CENTINELA DE ITS, 2000



Hombres



Mujeres

# Características de las ITS III

---

- Son producidas por bacterias, virus, espiroquetas, protozoos, hongos y parásitos
- No existen vacunas ni inmunidad natural y se pueden contraer varias veces en la vida

# *Algunos Agentes*



# Infecciones de transmisión sexual

---

- Algunos períodos son más vulnerables a ITS/VIH por razones conductuales y biológicas
- Es importante educar a las/os jóvenes en la adolescencia y también a las mujeres y sus parejas durante el embarazo y el período postparto en la prevención de ITS/VIH
- Los proveedores deben pensar en las ITS y tratar de pesquisarlas

# Patología determinada por las ITS en las mujeres

---

- Vulvitis, vaginitis, cervicitis, uretritis, vaginosis bacteriana, verrugas genitales
- Proceso inflamatorio pelviano
- Infertilidad
- Embarazo ectópico
- SIDA
- Muerte

# Patología determinada por las ITS en el embarazo

---

- Corioamnionitis, rotura prematura de membranas
- Aborto espontáneo
- Endometritis postparto
- Muerte

# Patología determinada por las ITS en los niños

---

- Infecciones congénitas y perinatales como conjuntivitis, neumonía, hepatitis, sepsis y SIDA
- Secuelas como ceguera, compromiso neurológico y malformaciones congénitas
- Muerte

# Patología determinada por las ITS en los hombres

---

- Uretritis, epididimitis, proctitis, úlceras genitales
- Hepatitis, artritis aguda, enterocolitis
- SIDA
- Muerte

# Diagnóstico de las ITS

---

- Pueden ser asintomáticas y los proveedores de salud deben detectar conductas de riesgo.
- Según el diagnóstico sindrómico, se pesquisan, clasifican y tratan de acuerdo a sus síntomas, aún sin conocer su etiología.


# Síndromes más comunes en ITS

---

- Secreción uretral (hombres)
- Úlcera genital (hombres y mujeres)
- Flujo vaginal (mujeres)
- Dolor abdominal bajo (mujeres)

# Secreción Uretral

---



# Ulcera Genital



# Flujo vaginal



# ***OTROS SIGNOS***

---



# Úlcera genital

---

- Vesículas, múltiples, pequeñas, dolorosas: *Herpes*
- Úlcera abierta dolorosa o no, asociada o no a adenitis inguinal: *Sífilis* o *Chancro blando*.

# Flujo vaginal

---

La mujer tiene un alto riesgo cuando existen dos o más de las siguientes condiciones:

- Edad menor de 21 años
- No tener marido ni pareja estable
- Haber tenido más de un compañero sexual en el último mes
- Tener compañero sexual estable, pero por menos de tres meses

# Flujo vaginal

---

Examen y tratamiento en la mujer de riesgo menor:

- Pus mucoso : ***Gonorrea y Clamidia***
- Secreción excesiva: ***Tricomonas y Vaginosis bacteriana***
- Flujo grumoso: ***Cándida***

# Flujo vaginal

---

Examen y tratamiento en la mujer de riesgo alto:

- Secreción excesiva: ***Gonorrea, Clamidia, Tricomonas y Vaginosis bacteriana***
- Flujo grumoso: ***Gonorrea, Clamidia y Cándida***

# Proceso inflamatorio pélvico (PIP)

---

Se considera de alto riesgo cuando hay:

- Ausencia o retraso del período menstrual
- Embarazo en curso
- Parto o aborto reciente
- Blumberg (+)
- Masa pélvica
- Sangrado vaginal

# **Proceso inflamatorio pélvico (PIP)**

---

Se considera de riesgo moderado cuando no existen las condiciones anteriores pero hay:

- Temperatura de 38°C o más
- Flujo vaginal
- Dolor durante el examen pélvico

# Proceso inflamatorio pélvico (PIP)

---

Examen y Tratamiento:

- **Si hay alto riesgo, requiere hospitalización**
- Si hay riesgo moderado:
  - Se puede tratar en forma ambulatoria
  - En usuarias de DIU, este debe extraerse 2 a 4 días después de iniciados los antibióticos

# Método de diagnóstico sindrómico

---

## Anamnesis:

- Identificar conducta sexual de riesgo
- Investigar síntomas relacionados
- Otorgar privacidad
- Obtener confianza

## Examen:

- Examen físico buscando signos de ITS
- Exámenes de laboratorio, si es posible, para verificar la etiología

# Método de diagnóstico sindrómico

---

## Tratamiento:

- Los medicamentos dependen de los síntomas y lesiones encontrados.

## Orientación:

- Para que la persona se trate, evite una reinfección y sepa que deben tratarse los contactos sexuales.

# Conclusión :

---

El ideal es prevenir

- Es necesario que las personas conozcan los factores de riesgo de contagio de las ITS, con el fin de evitarlos.
- Existen períodos más vulnerables: La adolescencia, el embarazo y el postparto requieren especial consejería de los proveedores.

# Conclusión:

---

Si ya se infectó

- Usted debería saber reconocer, los síntomas y signos de las ITS y el SIDA, con el fin de realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno, así como la prevención de su diseminación.