

## MANEJO DE PROBLEMAS MÁS FRECUENTES Y DE SITUACIONES ESPECIALES QUE SE PRESENTAN DURANTE LA LACTANCIA

### PROBLEMAS FRECUENTES

Los problemas que se presentan durante la lactancia deben ser tratados con la prontitud y la competencia técnica necesarias. De lo contrario, pueden transformarse en patología de la madre o del lactante o constituirse en la causa de una suplementación precoz o un destete innecesario. Los servicios de salud deben estar preparados para tratarlos con la urgencia que requieren, especialmente en el puerperio temprano donde son frecuentes y pueden interferir antes de que la lactancia esté establecida.

Los problemas más frecuentes y la manera de abordarlos se describen a continuación. Ninguno de ellos representa una contraindicación para continuar la lactancia, si la madre así lo desea.

### PROBLEMAS DE LA MADRE

#### *Inseguridad, temor, angustia*

Las madres pueden experimentar estos sentimientos por muchas razones afectivas, socioeconómicas o culturales, incluyendo la falta de información acerca de la lactancia, la sobrecarga de trabajo y la falta de apoyo de la pareja o del grupo familiar.

Generalmente se resuelven con apoyo, consejería y educación. Es necesario adecuar los contenidos según la etapa del proceso que está viviendo la madre, hasta que adquiera la autonomía y seguridad suficientes, lo que puede demorar varios meses en algunas mujeres.

#### *Dolor*

El dolor debe ser abordado rápidamente, con soluciones prácticas, consejería y apoyo. Primero debe realizarse un examen físico de las mamas, descartando patología y tratándola si es que existe. Además, hay que revisar la técnica de amamantar ya que, en la mayoría de los casos, el dolor es debido a una técnica inadecuada. Lo más frecuente es que exista tracción del pezón por parte del lactante, o compresión de la boca de éste sobre el pezón y no sobre toda laaréola.

#### *Grietas, fisuras*

Cuando hay grietas, la madre puede evitar la succión por temor al dolor, lo que puede llevar a retención láctea y eventualmente a una mastitis. Hay que observar la técnica de amamantamiento para corregir las deficiencias. Cuando la mujer está en una posición inadecuada, el lactante trata de sujetar el pecho, mordiéndolo y traccionando el pezón, lo que produce dolor y traumatismo.

Debe enseñarse la técnica correcta, como se describió en el tema sobre manejo de la lactancia, buscando la posición que no provoque dolor. Se puede sugerir a la madre que alterne los pechos de un episodio de succión al siguiente, para que haya un intervalo mayor entre la succión de un mismo pezón.

Algunos casos se resuelven sólo con corregir la técnica, otros requieren ser tratados médicamente.

#### *Micosis*

Cuando hay mucho dolor o ardor y no existen heridas concordantes (grietas, laceraciones extensas), debe pensarse en una micosis. A la inspección, el pezón se ve aparentemente indemne, de color rosado

claro y no presenta dolor espontáneo, sino durante la succión. El tratamiento consiste en la erradicación de la micosis tratando a la madre y al lactante. Se recomienda lo siguiente:

- \* Suspender el chupete, si el lactante lo usa.
- \* Asear los pezones con una solución de bicarbonato de sodio en agua hervida (una cucharadita por una taza de agua) antes y después de amamantar.
- \* Usar una crema antimicótica para el pezón.
- \* Tratar al lactante con un antimicótico oral.
- \* Verificar otras zonas de micosis y tratarlas (micosis glútea del lactante, leucorrea de la madre, etc.).
- \* Si recibe suplemento, lavar los chupetes con agua y bicarbonato y, en lo posible, hervirlos.
- \* Explicar a la madre los mecanismos de contagio.

### ***Mastitis aguda puerperal***

Es una de las complicaciones más frecuentes, puede producir mucho dolor y ser causa de hospitalización de la madre y/o destete. Es importante reconocerla precozmente para evitar su progresión hacia un absceso.

Cuando la mama presenta solo signos inflamatorios (dolor, calor, rubor) sin tumor palpable, se trata con calor local, vaciamiento frecuente de la mama, y antiinflamatorios por vía oral y no se recomienda suspender la lactancia .

Cuando hay colección de pus o absceso mamario, es necesario intervenir quirúrgicamente a la madre en un centro hospitalario. El tratamiento consiste en:

- \* Vaciamiento y drenaje del absceso.
- \* Antibióticos y antiinflamatorios.
- \* Curaciones con la frecuencia necesaria.
- \* Suspender la succión en el lado afectado mientras exista pus y luego reanudar la lactancia con episodios de succión frecuentes.

### ***Pezones umbilicados***

Es necesario tratarlos en el período pregestacional, idealmente en la niña. Corregirlos después del parto es muy difícil y representan un obstáculo serio para la succión y para que se establezca una lactancia satisfactoria.

## **PROBLEMAS DE LOS NIÑOS**

### ***Deposiciones muy frecuentes***

Las deposiciones de los lactantes son muy frecuentes en el primer mes, de aparición brusca y explosiva, muy líquidas, de color amarillo oro, con grumos y a veces con mucosidades. Suelen defecar durante la succión (reflejo gastrocólico). Por esto, con bastante frecuencia, las madres consultan por diarrea del lactante.

Debe asegurarse a la madre que, mientras el niño/a reciba sólo pecho, la posibilidad de una diarrea es prácticamente inexistente. En lo posible, hay que observar las deposiciones y explicarle las diferencias entre la deposición normal de pecho y la de mamadera. Así puede evitarse que ella consulte en un servicio de urgencia o que administre antidiarreicos por su cuenta.

Es posible que se presenten diarreas virales (rotavirus) en niños amamantados exclusivamente, las que sólo requieren tratamiento sintomático.

### ***Deposiciones muy poco frecuentes***

Durante el segundo mes, los niños presentan un período que podría llamarse de constipación fisiológica. Disminuye la frecuencia de deposiciones, no defecan durante 2 a 5 días y luego presentan una gran cantidad de deposición normal (blanda, pastosa). Esto ocurre en niños sanos, que se alimentan bien, con un examen físico normal (abdomen blando, depresible, indoloro). Podría estar relacionado con la mayor velocidad de crecimiento de los lactantes en el segundo mes de vida y a una utilización máxima de los nutrientes, por lo cual presentarían una menor cantidad de deposiciones.

Este fenómeno debe explicarse a la madre con anticipación, para que no se alarme y no recurra a medios mecánicos o a medicamentos para provocar la defecación.

### ***Cólicos***

Los cólicos intestinales, de aparición frecuente en los primeros tres o cuatro meses de vida, son uno de los grandes enemigos de la lactancia exclusiva. El lactante que sufre de cólicos es generalmente llorón (por los cólicos), ávido, y muchas veces llora bruscamente mientras está succionando y suelta el pezón. Esto es interpretado por la madre, e incluso a veces por los profesionales, como hambre o succión insatisfactoria.

Al examen físico, puede presentar meteorismo, sobre todo si se ha alimentado recientemente. Un signo importante es que está subiendo bien de peso. A veces los cólicos van acompañados por regurgitación frecuente.

Algunas medidas simples permiten corregir este problema en la mayoría de los casos. Estas son:

- \* Corregir la técnica de lactancia, con el fin de que el niño/a ponga la boca sobre toda la aréola, disminuyendo así la aerofagia. Si usa chupete, hay que suspenderlo por la misma razón.
- \* Enseñar a la madre la siguiente técnica para expulsar gases:
  - Darle pecho al niño/a por un período corto (5 a 10 minutos) y retirarlo, sin que traccione el pezón. Esto se consigue bajando con un dedo el mentón o introduciendo el dedo meñique en la boca del lactante.
  - Ayudarlo a expulsar gases con un masaje en su espalda. Esto es muy importante, ya que en los primeros minutos de succión está muy ávido y se meteoriza con gran facilidad.
  - Colocarle nuevamente al pecho todo el rato que quiera (del mismo pecho o el otro) y, al final de la succión, ayudarlo nuevamente en la expulsión de gases.

Si los cólicos persisten, se puede agregar un antiespasmódico o un regulador de la motilidad gástrica, por el tiempo que sea necesario.

## **LACTANCIA EN SITUACIONES ESPECIALES**

Hay ciertas situaciones que pueden hacer más difícil la lactancia, aunque la mujer quiera amamantar. Estas situaciones requieren apoyo y consejería especial, como se describe a continuación.

### ***La Mujer que Trabaja Fuera del Hogar***

La mujer que trabaja fuera de su hogar debe ser informada, ojalá durante el embarazo, de que es posible trabajar y llevar adelante una lactancia exitosa. Así puede tomar la decisión de amamantar e informarse con anticipación acerca de las leyes laborales que favorecen la lactancia y la permanencia de los niños cerca de sus madres durante el horario de trabajo.

Favorecen la lactancia las disposiciones que prolongan el período en que la madre puede

ausentarse del trabajo para continuar la crianza y las que permiten la cercanía de la madre y el lactante durante la jornada laboral. Algunos países cuentan con leyes que protegen a la madre nodriza y/o al hijo menor de un año, como es el caso de Chile, donde la mujer tiene un período de 12 semanas de reposo postnatal, durante el cual conserva su salario.

Si la mujer ha tomado la decisión de amamantar, debe iniciar y continuar su lactancia como se describió en el capítulo anterior. Acercándose el período en que debe reingresar a su trabajo, los proveedores de salud deben conversar con ella acerca de su tipo de trabajo, la cercanía del lugar de trabajo a su hogar, el horario de permanencia en el trabajo, el tiempo que demora en trasladarse a él, la persona que cuidará al lactante, etc. Esto permite considerar distintas alternativas para que la madre pueda escoger la más adecuada a su realidad:

\* Algunas mujeres prefieren y pueden permanecer en el hogar por un tiempo más largo, haciendo uso de días de vacaciones y/o feriados legales.

\* Otras mujeres pueden tener la posibilidad de llevar a su hijo/a al trabajo, si dispone de sala cuna o de facilidades para tenerle cerca, lo que algunos empleadores aceptan cuando la lactancia no interfiere con la función que realiza la madre.

\* Para algunas madres será conveniente y posible ausentarse del trabajo para ir a su hogar, o la persona que cuida al lactante puede llevarle al lugar de trabajo una o dos veces al día.

\* Cuando las soluciones anteriores no son posibles, una buena alternativa es dar la leche materna en biberón. Para esto, la mujer puede aprender a extraer, conservar y calentar su leche. Existen clínicas de apoyo a la lactancia donde se enseña el procedimiento y cualquier profesional de salud puede familiarizarse con él, ya que es muy simple.

Se requieren dos o tres botellas con sus respectivos chupetes y un lugar fresco para guardarlas (refrigerador, hielera). El proceso consiste en:

1. Hervir las botellas y chupetes para esterilizarlos.
2. Lavarse muy bien las manos con agua y jabón.
3. Asear las mamas con agua y jabón.
4. Extraer la leche en un lugar limpio y tranquilo que puede ser su habitación. (Ver técnica de extracción de leche, descrita en el capítulo sobre manejo de lactancia).
5. Depositar la leche directamente en las botellas ya esterilizadas.
6. Rotular las botellas con un lápiz de cera (lápiz de ojos, labial, etc.), colocándoles la fecha y guardarlas. Si se almacenan en un lugar fresco y seco, la leche dura 12 horas. Si se refrigeran, puede durar hasta 5 días y más si se congela. Debe sacarse del congelador varias horas antes de usarla y descongelarla naturalmente, sin apurar con calor.
7. Para calentarlas, hay que hervir agua en una cacerola, retirarla del fuego una vez hervida y sumergir la botella durante unos minutos. El agua caliente debe cubrir sólo la mitad de la leche que hay en la botella. La leche materna no se debe calentar o descongelar en hornos microondas. La persona a cargo del niño/a debe aprender el procedimiento.
8. Dar la mamadera de leche al niño/a y desechar lo que sobre.

Hay que recordar que la leche humana no está estéril sino limpia y su ingestión no causa problemas al niño si está bien procesada. La madre debe extraer la leche de sus pechos varias veces al día para conservar la lactancia y no sufrir de congestión mamaria. Idealmente, los alimentos sustitutos adicionales que se den al niño, deben ser sólidos y administrados con cuchara, no con chupete.

**Madre de Gemelos**

La madre de gemelos debe ser animada a amamantar y se le debe explicar la relación que hay entre succión y producción de leche. Si tiene dos niños que succionan, tendrá más leche y necesitará dar suplementos sólo si hay alteración de la velocidad de crecimiento de los lactantes. Se le deben enseñar posiciones en que pueda amamantar a los dos niños a la vez, ya que es muy angustioso para ella alimentar a uno y sentir llorar al otro (Ver Posiciones para Amamantar).

**Lactante hospitalizado**

Según su gravedad, la madre debe solicitar que le asignen un horario para amamantarlo, o que le permitan permanecer con él. En los otros horarios, la madre debiera extraer su leche, con el fin de mantener el estímulo y no sufrir congestión mamaria. Lo mismo debe hacer la mujer que no tiene acceso a su hijo/a, si quiere mantener la lactancia mientras dura la hospitalización. Después del alta del niño/a, debe amamantar con succión frecuente para recuperar una lactancia exclusiva y satisfactoria.

**Madre Hospitalizada**

Si la condición de la madre lo permite, el niño/a debe hospitalizarse con ella y continuar lactando. Si no es así, hay que otorgar a la madre las facilidades para extraer su leche y no presentar retención láctea. Una vez que la madre pueda estar con su hijo/a, debe amamantar con succión frecuente para recuperar una lactancia exclusiva y satisfactoria.

**Madre Adicta al Tabaco**

El hábito de fumar afecta negativamente la salud de la madre y del que está por nacer. Puede provocar síntomas de aborto o de parto prematuro y llevar a la muerte fetal. También puede provocar el nacimiento de niños prematuros o de bajo peso y una lactancia corta.

**Madre Adicta al Alcohol/Drogas**

Esta madre no debiera amamantar por su condición física y psíquica y porque estas sustancias pasan al lactante. Debe ser tratada y se debe prestar atención especial al seguimiento del niño, ya que es posible que sea descuidado por la madre.

**Contraindicaciones**

Hay muy pocas condiciones que se consideran contraindicación absoluta de la lactancia (infección materna por VIH si el niño no está contagiado, galactosemia y orina de jarabe de Arce). Se consideran contraindicaciones temporales el herpes simple con lesión oral del niño o lesión mamaria de la madre, la varicela, sífilis, tuberculosis activa de la madre y el absceso mamario. Se debe recomendar la suspensión de la lactancia en cualquier otra enfermedad si la madre está grave.

