

NUTRICIÓN DE MUJERES SANAS EN EL PERÍODO POSPARTO

María Eugenia Casado

INTRODUCCIÓN

Para analizar la nutrición durante la lactancia es necesario mirar lo que sucede durante el embarazo. Junto con gestarse una nueva vida, el organismo de la mujer se prepara para alimentarla una vez nacida. Esta preparación incluye el crecimiento y desarrollo de las mamas y la acumulación de nutrientes y energía. Aún las mujeres mal nutridas acumulan estas reservas, incluso a expensas del crecimiento del feto.

Los riesgos nutricionales del embarazo y la lactancia dependen de la alimentación de la mujer en estos períodos y de la nutrición en etapas anteriores. Por otra parte, hay mecanismos fisiológicos que permiten la acumulación de nuevas reservas durante el embarazo si la mujer se alimenta adecuadamente, con las que se prepara para una lactancia satisfactoria. También hay mecanismos adaptativos que le permiten disminuir el gasto nutricional.

LA PREPARACIÓN PREVIA

Debemos recordar que:

* La nutrición en la infancia y adolescencia es muy importante desde el punto de vista de las reservas con que cuenta la mujer para el embarazo y la lactancia. Por ejemplo, el mayor depósito de calcio en el hueso se produce durante los años que siguen a la menarquia. Las mujeres que han tenido una adecuada ingesta cálcica en la adolescencia tienen menos riesgo de presentar osteoporosis después de la

menopausia por la pérdida de calcio durante el embarazo y la lactancia. También las reservas de hierro protegen contra la posibilidad de desarrollar anemia.

* El intervalo adecuado entre los embarazos es otro factor importante, ya que las gestaciones muy seguidas impiden que la mujer recupere sus reservas entre una y otra. Por ejemplo, hay un período de varios meses después del destete en que se recupera el depósito de calcio en el hueso a los niveles que hay antes del embarazo y la lactancia. Si este intervalo no se mantiene, el próximo embarazo representa un riesgo importante para el esqueleto.

Además, en los países subdesarrollados, la sobrevivencia de los niños es mejor si la lactancia es larga y si la madre puede dedicarles mayor atención. Por estas razones, se sugiere que los nacimientos se espacien dos o más años o más de seis meses después del destete, especialmente si la mujer no está bien nutrida.

INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN EN LA LACTANCIA

Diferentes estudios han correlacionado el estado nutricional o variables dependientes del estado nutricional con la lactancia:

* El estado nutricional materno al inicio del embarazo (medido por el índice peso/talla) influye en el volumen de leche producido y en el contenido de grasa, que son mayores en las mujeres mejor nutridas.

* En mujeres que amamantan con frecuencia similar, el estado nutricional de la mujer embarazada y el incremento de peso durante el embarazo influyen en la duración de la lactancia.

* El estado nutricional de la embarazada y el incremento de peso durante el embarazo influyen en el peso de los niños al nacer. A su vez, los niños de mayor peso tienen más probabilidades de tener una lactancia prolongada.

* La ingesta de la madre influye en el contenido de aminoácidos, ciertos ácidos grasos y vitaminas hidrosolubles en la leche, pero no en el contenido total de proteínas y calcio.

GASTO ENERGÉTICO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Se ha estimado que el gasto de energía total en el embarazo es de 80 mil Kcal cuando la mujer es eutrófica y mantiene una actividad normal. Este gasto puede bajar hasta 60 mil Kcal si disminuye la actividad física. La mitad de esta energía se ocupa en la formación y mantención del feto y en el aumento del metabolismo basal de la mujer por el mayor trabajo cardíaco y respiratorio. La otra mitad son reservas grasas que se estiman en 36.000 Kcal.

Un incremento de peso de 12.5 Kg durante el embarazo es adecuado para una mujer normal, recomendándose que esta alza sea mayor en las desnutridas y menor en las obesas. Este aumento de peso corresponde a placenta y anexos, útero, feto, volumen sanguíneo, mamas y grasa acumulada (4 Kg aproximadamente), que proporcionará la energía necesaria durante los primeros meses de lactancia.

Se estima que el organismo de una mujer normal recupera su composición original después de unos 6 meses del parto, si es que utiliza esta reserva grasa durante la lactancia. El costo energético de la mujer para producir leche es de alrededor de 700 Kcal por día en el primer semestre y 500 Kcal por día en el segundo semestre (FAO/OMS/ONU 1985). Alrededor de 200 calorías por día provienen de la reserva y las otras deben provenir de la dieta de la mujer.

RECOMENDACIONES

El tema de la nutrición durante el embarazo y la lactancia es complejo. Lo más probable es que haya diferencias entre individuos y poblaciones, lo que dificulta el cálculo del requerimiento nutricional de cada mujer. Por esto, los organismos de salud hacen recomendaciones generales para poblaciones de características semejantes. Estas recomendaciones cubren las necesidades de dichos grupos, dejando un margen de seguridad.

Lo importante es tener conciencia de la vulnerabilidad nutricional de la mujer durante estas etapas y adecuar las recomendaciones al estado nutricional basal de la mujer y a su nivel de actividad física. Se debe considerar lo siguiente:

* *Calorías:* Se recomienda una ingesta calórica de alrededor de 2500 Kcal por día desde el segundo trimestre del embarazo y de alrededor de 2750 Kcal por día durante la lactancia para sustentar los procesos descritos (FAO/OMS/ONU 1981 y 1985). Esta recomendación debe adaptarse al estado nutricional de la mujer y a su actividad física. En general, significa la adición de alrededor de 300 Kcal a la dieta de la mujer embarazada, las que se pueden reducir a 200 Kcal en las mujeres eutróficas con poca actividad física.

Hay que evaluar la disponibilidad de recursos alimentarios, optimizando el uso de los alimentos más abundantes y económicos, para aportar las calorías adicionales (pan, cereales). Por ejemplo, se pueden obtener ingiriendo 1/2 Kg de pan y 1/2 litro de leche extra por día.

* *Proteínas:* En mujeres bien nutridas, el requerimiento adicional durante el embarazo es de 10 g por día. Se considera que una ingesta total de alrededor de 65 a 70 g por día es adecuada durante la lactancia. Las mujeres desnutridas requieren un aporte mayor, por lo que hay que educarlas para que ingieran

proteínas en alimentos de menor costo económico que aquellos de origen animal (porotos, soya, etc.).

* *Líquidos*: Las nodrizas deben ingerir abundante líquido, lo que tienden a olvidar en el ajetreo diario. Una recomendación práctica es que beba un vaso de líquido (agua, leche, infusiones, sopas, etc.) cada vez que amamanta.

Además de las calorías y las proteínas, hay otros nutrientes que deben ingerirse durante el embarazo y la lactancia, ya que pueden afectar la salud de la madre o el desarrollo del niño/a. Por ejemplo:

* *Fierro*: El requerimiento de fierro es elevado. El depósito de fierro puede ser de 500 mg en el embarazo (en hemoglobina y depósitos fetales, masa muscular y reservas de la madre). Se recomienda una ingesta diaria de 30 mg durante el embarazo y de 15 mg o más durante la lactancia. Es importante adicionar fierro en dosis terapéuticas a las embarazadas y nodrizas con anemia ferropriva (si la hemoglobina es menor de 11 o 12 g/100 mL), recomendar alimentos ricos en vitamina C y evitar el té y el café por la influencia que tienen en la absorción del fierro.

* *Calcio*: Se estima que el 30% del calcio fetal proviene del esqueleto de la madre y el 70% de su ingesta. Durante el embarazo se recomienda una ingesta de 1200 mg por día, la que sube a 1500 mg por día en el período de lactancia, dado el alto contenido de calcio de la leche. Un estudio realizado por ICMER mostró que hay una pérdida mínima de masa ósea si la nodriza consume esta cantidad de calcio diariamente, y que esta pérdida se recupera rápidamente al suspender la lactancia. Por esto, también debe mantenerse una elevada ingesta de calcio después del destete ya en este período se forma nueva masa ósea.

* *Vitaminas*: En las mujeres vegetarianas es necesario agregar complejo vitamínico B y ácido fólico.

Estas recomendaciones se resumen en lo que se ha llamado ración modelo para la mujer embarazada y la nodriza. También la sabiduría popular ha recomendado desde la antigüedad alimentos especiales durante el embarazo y la lactancia. En algunas culturas se regalan ciertos alimentos rituales a la mujer nodriza, que generalmente son ricos en proteínas, nutrientes y calorías.

En Chile, los requerimientos adicionales están generalmente proporcionados por la leche del programa nacional de alimentación complementaria y por la alimentación habitual de la mujer. Un aspecto práctico es que algunos alimentos son más nutritivos juntos que separados como la combinación de legumbres, cereales y vitamina C (por ejemplo, porotos con tallarines y una fruta cítrica) o la combinación de leche más cereales y frutas. Finalmente, cabe recordar que la nodriza debe evitar los alimentos meteorizantes si inducen cólicos en el lactante.

BALANCE NUTRICIONAL

En el balance entre el gasto de energía y nutrientes, la ingesta y el estado nutricional de la nodriza influyen varios factores. Uno de estos es la reserva grasa acumulada durante el embarazo, que le permite disponer de calorías adicionales. Otro es la ingesta de alimentos ricos en energía, proteínas, calcio y hierro que le asegura una protección contra el daño que puede experimentar por la mayor demanda.

Existen además algunos mecanismos adaptativos. En ciertas circunstancias biológicas aumenta la eficiencia del organismo, es decir, para iguales funciones disminuye la energía requerida por el individuo. La amenorrea que acompaña a la lactancia exclusiva constituye un ahorro de energía, de nutrientes y de hierro.

Un estudio realizado por ICIMER en madres que estaban en lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses posparto mostró que experimentaron pocas variaciones en su estado nutricional en esta etapa. Lo más significativo fue una reducción del peso corporal de alrededor de 3 Kg y una reducción importante de los pliegues cutáneos. Se estimó una pérdida del 9% de la masa grasa y de sólo el 3% de la masa magra. Las mujeres que iniciaron la lactancia con un índice peso/talla más alto o las que tenían sobrepeso al término del embarazo, experimentaron una pérdida mayor que las demás. Cabe hacer notar que se trataba de mujeres con un buen estado nutricional basal, que mantuvieron una ingesta de alrededor de 2750 Kcal por día, de acuerdo a la recomendación mencionada.

LA NODRIZA DESNUTRIDA

Las mujeres mal nutridas pueden tener una lactancia prolongada, con niños creciendo en mejores condiciones que los destetados precozmente. Ellas producen leche que es similar en muchos aspectos a la de mujeres normales. Esto beneficia sin duda a los niños, evitando las enfermedades nutricionales severas que se presentan después del destete (un caso extremo es lo que se ha llamado Kwashiorkor en Africa).

El aumento del gasto nutricional en las mujeres con cobertura nutricional insuficiente durante la lactancia se hace a costa de sus propios nutrientes. Esto puede producir depleción tisular, deterioro que se intensifica a medida que avanza la lactancia. Sin embargo, este impacto no es siempre evidente, lo que sugiere que podría haber también otros mecanismos adaptativos, además de los mencionados.

La adaptación al déficit nutricional de la mujer actuaría más bien disminuyendo el volumen de la leche que alterando la calidad. Al producir un volumen de leche menor, llega un momento en que esta no es suficiente para los requerimientos nutricionales del lactante, los que van en aumento. Por eso, otro mecanismo compensatorio sería una

lactancia más corta en lo que influirían los niveles más bajos de prolactina que se han descrito en las nodrizas desnutridas.

Es importante considerar cuando es realmente eficiente una intervención nutricional destinada a proteger a la nodriza, al niño/a y a la lactancia. La mujer desnutrida requiere nutrientes adicionales en el embarazo y durante la lactancia, más allá del aporte recomendado para las mujeres normales.

Un estudio realizado en Gambia demostró que la suplementación durante la lactancia no alteró de modo significativo la duración de la lactancia. Se consiguió una prolongación cuando la intervención nutricional se hizo durante el embarazo, prolongación que fue mayor cuando se acompañó de educación a la madre.

LA NODRIZA CON SOBREPESO U OBESA

Pese a que existe un alto número de mujeres con sobrepeso al término del embarazo (alrededor de 52% al año 2003), las mujeres obesas no han sido suficientemente estudiadas durante el período de lactancia. Sí se sabe que una lactancia materna prolongada contribuye eficazmente a la recuperación del peso pregestacional. Siendo la obesidad una patología muy compleja, requiere muchas veces de un manejo multidisciplinario, capaz de abordar tanto los aspectos nutricionales como los psicológicos y de actividad física.

En Chile a nivel de la red pública de salud existen el programa EGO (estrategia global contra la obesidad) y el PASAF (programa de alimentación saludable y actividad física) en los cuales se aborda esta patología con una mirada integral. El programa incluye consejería individual, talleres grupales, atención nutricional y algunos exámenes. La nodriza cuenta además con 2 controles nutricionales, programados al tercer y sexto mes posparto, con el objetivo de cautelar la recuperación del peso materno a los niveles pregestacionales.

LA NODRIZA VEGETARIANA

La nodriza vegetariana debe ser analizada, para determinar su ingesta alimentaria y su ortodoxia y sopesar que intervención requiere. Si es vegetariana estricta (excluye todo producto de origen animal) deberá recibir aporte de vitaminas del complejo B y ácido fólico desde el embarazo y durante toda la lactancia.

CONCLUSIÓN

La nutrición adecuada durante la niñez y la adolescencia, el espaciamiento de los embarazos y la educación nutricional durante todo el ciclo vital, son factores protectores del riesgo nutricional de la mujer embarazada o nodriza.

En el posparto la nodriza tiene requerimientos especiales de nutrientes, los que deben aportarse en la dieta. La nutrición adecuada disminuye el riesgo nutricional por déficit o exceso y previene patologías tales como desnutrición, anemia, osteoporosis y obesidad con sus correspondientes complicaciones.

La lactancia materna debe ser promovida por los beneficios nutricionales para los niños/ y sus madres

Las y los proveedores de salud pueden jugar un papel importante en la prevención de la desnutrición, anemia, riesgo de osteoporosis, sobrepeso y otras patologías. Desde sus distintas disciplinas y a lo largo de las diferentes etapas, especialmente durante la niñez y la adolescencia, pueden realizar educación nutricional a la mujer acerca de los requerimientos y las razones de las recomendaciones alimentarias. También pueden dar apoyo terapéutico tanto a las

madres desnutridas como a las obesas, ayudándolas a identificar alimentos accesibles y que contengan los nutrientes necesarios para sus respectivos requerimientos.

Con las medidas nutricionales adecuadas se protege también la salud de los niños, ya que el peso al nacer y la duración de la lactancia son dos factores fundamentales en el pronóstico de los recién nacidos.

GLOSARIO DE TERMINOS USADOS EN NUTRICIÓN

ALIMENTOS: Productos naturales o elaborados que contienen una mezcla de sustancias nutritivas o nutrientes y que presentan diferente forma, color, sabor, aroma y textura y que, al ser ingeridos, digeridos y asimilados por el organismo humano permiten obtener los nutrientes bases: proteínas, lípidos o grasa, hidratos de carbono o azúcares, vitaminas, minerales y agua.

ALIMENTACIÓN: Incorporación de un alimento del medio ambiente al organismo, es decir, comer. Es un proceso consciente y voluntario, influenciado por factores sociales y económicos, por hábitos y costumbres y por la disponibilidad geográfica. Por lo tanto, es modificable y susceptible de cambiar a través de la educación.

ALIMENTO ENERGÉTICO: Alimento rico en calorías aportadas básicamente por hidratos de carbono y/o grasas, que proporciona energía indispensable para moverse y fuerza para trabajar.

ALIMENTO CONSTRUCTOR: Alimento rico principalmente en proteínas y minerales. Proporciona elementos para crecer, formar huesos y dientes, reparar tejidos y desarrollarse.

ALIMENTO REGULADOR: Alimento rico en vitaminas y minerales. Sirve para mantener la salud y el equilibrio, regular los procesos biológicos del organismo y protegerlo de las enfermedades.

NUTRICIÓN: Ciencia que se preocupa de los alimentos, su acción, interacción y balance en relación con la salud y la enfermedad.

REQUERIMIENTO: Cantidad de nutrientes que asegura un buen funcionamiento orgánico y la integridad del individuo. Varía de una persona a otra.

RECOMENDACIÓN: Cifra que cubre los requerimientos de un grupo de individuos, que viven en determinadas condiciones ambientales, dejando un margen de seguridad. Debe ser ajustada para cada persona.

KILOCALORÍAS: Medida en que se expresa el valor calórico de los alimentos. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado la temperatura de un litro de agua.

MALNUTRICIÓN: Alteración del estado nutritivo, que abarca los estados por déficit y por exceso.

DESNUTRICIÓN: Estado deficitario por reducción de ingesta de calorías y de nutrientes.

ESTADO CARENCIAL: Alteración del estado nutritivo que se relaciona con la falta de una determinada sustancia nutritiva.

INANICIÓN: Desnutrición extrema de causa alimentaria.

CAQUEXIA: Desnutrición extrema causada por enfermedades.

ANEMIA NUTRICIONAL: Reducción de la concentración de hemoglobina bajo los valores normales, debido a un insuficiente aporte dietario de nutrientes eritropoyéticos esenciales como hierro, ácido fólico y vitamina B12.

OSTEOPOROSIS: Trastorno óseo metabólico caracterizado por una progresiva reducción de la masa ósea.

ESTADOS POR EXCESO: Alteración del estado nutritivo por aporte excesivo de calorías y nutrientes, como obesidad, cuadros por excesos de algunas vitaminas y elementos minerales.