

# **VIDA SEXUAL EN EL POSTPARTO**

**Psicóloga Soledad Sánchez; Matrona María Eugenia Casado**  
**Instituto Chileno de Medicina Reproductiva<sup>1</sup>**

## **INTRODUCCION**

El postparto puede ser un período difícil en relación a la sexualidad, que requiere de ajustes en la pareja y de mucha comprensión mutua. Esta etapa puede favorecer tanto el enriquecimiento de la vida sexual como el desarrollo de problemas. Sin embargo, muchas veces las parejas tratan de reiniciar la vida sexual como si no hubiera pasado nada, desconociendo los cambios, el "desfase" que se produce entre ellos, y la necesidad de buscar una nueva forma de relación o un nuevo equilibrio. Por esta razón es necesario dedicar un tiempo a este tema y apoyar a la pareja con orientaciones básicas<sup>2</sup>.

Es importante tener presente que la forma, el momento y las condiciones en que se reinicia la vida sexual es variable de una pareja a otra. Por eso los proveedores/as de salud necesitan conocer la situación de cada mujer y pareja para ofrecer una orientación apropiada.

La vida sexual se reinicia después de un período de abstinencia durante el embarazo, originado en el temor del hombre a provocar daño al feto o en una indicación médica. Durante el puerperio también se requiere un período variable de abstinencia (normalmente entre 15 y 30 días), para asegurar la adecuada recuperación de los órganos reproductivos y prevenir infecciones. Después de este tiempo, la mayoría de los hombres, y también algunas mujeres, quieren reiniciar tempranamente las relaciones sexuales. Sin embargo, muchas mujeres están en una situación diferente y quieren postergar la actividad sexual.

## **LAS DIFICULTADES**

En el postparto temprano es frecuente que las mujeres experimenten una disminución del deseo sexual causada por múltiples factores, en combinaciones diferentes y con importancia variable para cada mujer:

- \* Cansancio, a veces depresión y estrés.
- \* Falta de sueño.
- \* Atención focalizada en el recién nacido/a.
- \* Cambios hormonales.
- \* Temor al dolor.
- \* Temor al desempeño sexual.
- \* Sentimiento de que el cuerpo es poco atractivo.

<sup>1</sup>Texto de "Salud Reproductiva en el Período Post-parto: Manual para el entrenamiento del personal de los servicios de salud". Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), 1996.

<sup>2</sup>Agradecemos a la psicóloga Irma Palma sus sugerencias para este tema.



El temor al dolor a veces está relacionado con la experiencia de dolor durante el parto, y la sensación de haber sido examinada muchas veces durante el postparto temprano. Además circulan mitos que refuerzan las expectativas de tener dolor durante las primeras relaciones postparto. En algunos casos efectivamente se presenta dolor (dispareunia) durante las primeras relaciones sexuales, como consecuencia de la episiotomía, y/o por la falta de lubricación de la vagina (por el bajo nivel de los estrógenos).

El temor al desempeño sexual se refiere a las dudas que tienen algunas mujeres respecto a si podrán excitarse como antes, si su vagina habrá cambiado o recibirá la penetración igual que antes, si lograrán el orgasmo (cuando lo obtenían antes del parto), si su pareja podrá obtener la misma satisfacción, etc. Ellas sienten que su cuerpo ha tenido una transformación tan intensa que se preguntan si la vida sexual será semejante a la que precedió al embarazo.

Un aspecto de esta transformación corporal es que las mujeres generalmente encuentran que su cuerpo está poco atractivo, se sienten gordas, "seltas", con las mamas llenas de leche y doloridas, etc. Les cuesta creer que igual pueden ser atractivas para su pareja. Al respecto, las mujeres tienen que hacer un proceso de aceptación que les toma un tiempo.

Otros factores que pueden interferir el reinicio de las relaciones sexuales son el temor a tener complicaciones médicas, que es bastante frecuente, y más adelante el temor a un nuevo embarazo.

Aun existiendo deseo sexual por parte de la mujer, hay otras dificultades como las interrupciones cuando el bebé demanda atención, o la falta de privacidad que tienen muchas parejas de escasos recursos, por el hacinamiento en que viven. Así, a muchas mujeres "se les hace cuesta arriba" el reiniciar las relaciones sexuales, ya sea por razones personales o por la situación y algunas lo perciben como una "tarea" más que como algo agradable para ellas.

Entre las mujeres que desean reanudar las relaciones sexuales tempranamente, algunas tienen dificultades para reconocerlo porque temen ser vistas como "demasiado interesadas". Es importante que las y los proveedores de salud no hagan juicios al respecto, y que primen las preferencias de la mujer.

## **LAS ACTITUDES DE LOS HOMBRES**

Por su parte, los hombres tienen a veces temor a que su pareja haya cambiado sexualmente, y a que su desinterés sexual sea algo más permanente. Muchos hombres comprenden la situación de la mujer en esta etapa y tienen la disposición de apoyarla, aun cuando a veces no sepan cómo hacerlo. Hemos observado que los hombres que participan en el parto generalmente son más comprensivos con la mujer, probablemente porque se dan cuenta de la intensidad física y emocional de la experiencia. Sin embargo, se produce una situación difícil cuando el hombre no entiende las dificultades y presiona a la mujer, llegando en casos extremos

a la amenaza de "buscarse a otra".

## **¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PROVEEDORES DE SALUD?**

Los proveedores de salud pueden tener un papel importante de apoyo, orientación y prevención en esta área. Es muy positivo que aborden estos temas con la mujer y la pareja, y les informen sobre lo que pueden esperar en este período. Esto es, que hablen sobre las dificultades y los temores que son normales, y sobre todo, que aclaren que se trata de algo transitorio.

Los profesionales de salud deben abordar este tema con las mujeres y sus parejas lo antes posible, incluso durante el primer control. Es positivo reiniciar la vida sexual lo antes posible, en esta forma gradual y no exigente. Cuando la mujer posterga mucho las relaciones sexuales crece la tensión en la pareja y ella puede llegar a sentirse muy angustiada y, eventualmente, desarrollar una disfunción sexual.

Si la mujer o pareja no aborda el tema espontáneamente probablemente no significa que no le importe, sino que le resulta difícil preguntar sobre "cosas tan íntimas". Por eso es importante que las y los proveedores de salud tomen la iniciativa de preguntar y orientar al respecto.

### **La primera etapa**

Hay que transmitir a la pareja la idea de que tienen que saber esperar, que probablemente no van a volver a su sexualidad habitual a los quince días. Y sugerir, al mismo tiempo, que pueden tomar este período como una oportunidad de enriquecer su relación buscando nuevas formas de acercamiento. En la sexualidad, igual que para todas las dimensiones del período postparto, se debe alentar a la pareja a conversar sobre sus necesidades, deseos y dificultades.

Para la mujer es importante que la/el proveedor de salud le transmita la confianza de que su cuerpo se va a ir recuperando paulatinamente y que, aunque tal vez no llegará a ser el de antes, ella sí volverá a sentirse cómoda consigo misma en unos meses.

### **Promoviendo una vida sexual sana**

También nos parece importante promover que ella empiece a tener actividad sexual por su propio deseo y como algo placentero, y no por una sensación de deber o por imposición de su pareja. Hay dos elementos clave que favorecen una buena vida sexual en el postparto:

- \* lograr condiciones que permitan y estimulen el deseo sexual
- \* abordar la sexualidad en forma gradual, progresiva.

Entre las condiciones que favorecen el deseo sexual están que la mujer descance lo más posible, y que la pareja tenga momentos de intimidad emocional y sexual. Es decir, que tengan momentos para los dos, para conversar, para encontrarse.

También es positivo que, en lo posible, tengan momentos de soledad y tranquilidad para acercarse sexualmente. Aquí la ternura es un elemento fundamental para la mujer, así como las caricias y la búsqueda de estímulos sexuales placenteros para ambos.

El abordaje gradual de la sexualidad está muy relacionado con lo anterior, y se refiere principalmente a un reencuentro sexual no exigente, más centrado en buscar lo que resulta placentero en vez de tratar de restablecer de inmediato la actividad sexual acostumbrada. Esto significa, por ejemplo, tener encuentros sexuales sin penetración o sin orgasmo. Si la mujer está muy asustada o su deseo sexual está inhibido por distintas razones, se puede incluso prescribir la actividad sexual no penetrativa por algún tiempo. También es útil asegurarse de que la mujer o pareja conoce el papel del clítoris en el placer sexual y el orgasmo femenino.

En un sentido más amplio, se puede invitar a la pareja a redescubrirse mutuamente, ya que son los mismos pero han cambiado, por lo tanto pueden preguntarse por "lo que les gusta ahora". En nuestra experiencia estas recomendaciones son bien acogidas por las parejas, y les resultan útiles.

De esta manera se ayuda a prevenir el desarrollo de un círculo vicioso en que el temor al dolor produce una inhibición del deseo sexual y de la lubricación vaginal, y por tanto aumenta la posibilidad de que la relación sexual resulte dolorosa. Explicando la importancia del diálogo, la paciencia y la exploración de alternativas en lo sexual se puede favorecer una evolución positiva.

### **Algunos aspectos prácticos**

Entre las medidas más concretas están: prescribir momentos de descanso para la mujer durante el día; resolver el temor al embarazo con el inicio de un método anticonceptivo adecuado; y recomendar el uso de lubricantes inertes (sin medicamentos ni hormonas, por ejemplo, vaselina u otro a base de agua) cuando la lubricación espontánea de la mujer no es suficiente.

También, durante el postparto temprano, hay que preocuparse de la adecuada cicatrización de la episiotomía. Si el proceso no se desarrolla en forma adecuada es importante derivar a la mujer al especialista para una corrección oportuna. Hay que tener presente que este aspecto puede influir posteriormente en la calidad de la vida sexual de la mujer.

### **En etapas posteriores**

Es difícil establecer cuánto tiempo que requiere el proceso de reiniciar la actividad sexual normal porque hay muchos factores involucrados, y responde a ritmos muy personales. En general, se espera que este período de ajuste dure alrededor de tres o cuatro meses. Si al cabo de ese tiempo la pareja no ha reiniciado la actividad sexual, y si la mujer está preocupada por eso, sería conveniente derivarla a una orientación más específica, por ejemplo en una organización de mujeres o a un

orientador/a. No se trata necesariamente de una terapia sexual, sino de que reciba el apoyo y la información necesaria.

No hemos encontrado estudios respecto a este tema, pero nuestra impresión clínica es que cuando las mujeres han tenido previamente una vida sexual satisfactoria, suelen tener menos dificultades en esta etapa. En cambio, si su experiencia anterior no es buena, a veces usan el postparto y la lactancia como excusas para no tener relaciones sexuales. Si este es el caso, las recomendaciones que ofrecemos aquí también pueden ser de utilidad.

Después de un tiempo, incluso si se han reiniciado las relaciones sexuales, puede que la mujer no tenga el mismo interés sexual que antes del embarazo. La lactancia puede tener un efecto inhibitor del deseo sexual, ya que los niveles hormonales se mantienen bajos, y la mujer está cansada y duerme poco. Por otro lado, la experiencia de ternura y cercanía con la hija o hijo hace que algunas mujeres se sientan plenas en el aspecto físico, y que no necesiten del contacto sexual igual que sus parejas. La sexualidad penetrativa aparece como algo demasiado brusco o burdo para algunas mujeres durante esta etapa. Para otras, los pechos llenos de leche pueden resultar incómodos, o les disgusta que su pareja los acaricie.

Cuando esto significa un problema para la pareja, hay promover el diálogo y la expresión franca de las necesidades de cada uno, especialmente la necesidad de ternura y caricias de la mujer. Aquí también es conveniente explicar a la pareja la importancia del juego sexual y las caricias, alentándolos a buscar formas intermedias de acercamiento sexual que les resulten satisfactorias.

## **CONCLUSION**

El período postparto es una etapa de cambios en la vida sexual. Muchas mujeres y parejas presentan dificultades para reiniciar la actividad sexual por razones biológicas y psicológicas. Es importante que las/los proveedores de salud le dediquen tiempo a este tema porque pueden prestar gran ayuda.

Cuando se ofrece a las mujeres y parejas la posibilidad de conversar sobre estos temas en forma no prejuiciada y respetuosa, generalmente la aprovechan y valoran mucho, porque realmente tienen muy pocas oportunidades de plantear sus inquietudes y recibir orientación. Esto es válido tanto para el período postparto como para otras etapas de la vida reproductiva