


ANTICONCEPCIÓN PARA MUJERES DESPUÉS DE LOS 35 AÑOS

**Dra. Soledad Díaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
2017**



ICMER

CONTENIDO DE ESTA PRESENTACIÓN

- **Cambios fisiológicos en la peri-menopausia.**
- **Fertilidad después de los 35 años.**
- **Factores de riesgo para el uso de anticonceptivos.**
- **Criterios Médicos para la Elección de Métodos Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud.**
- **Orientación y evaluación de las potenciales usuarias.**
- **Discontinuación de la anticoncepción.**

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA PERIMENOPAUSIA

- **La peri-menopausia es una etapa de transición, que se extiende desde el fin de los ciclos menstruales normales hasta el término del período reproductivo.**
- **Se inicia entre los 35 y los 40 años, siendo 50 años la edad promedio de la menopausia en Chile.**
- **La menopausia corresponde a la última menstruación y se diagnostica en forma retrospectiva cuando la mujer ha pasado un año sin menstruaciones.**

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA PERIMENOPAUSIA

- **La reserva ovárica disminuye, lo que se traduce en disminución progresiva de la fertilidad.**
- **Hay cambios en el patrón de sangrado y sintomatología derivada del hiperestrogenismo y luego del hipoestrogenismo.**
- **Uno de los síntomas más precoces es la irregularidad de las menstruaciones, la que puede acompañarse de síntomas debidos al exceso o a la carencia de estrógenos.**

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA PERIMENOPAUSIA

- **En el inicio de este período puede ocurrir un aumento de FSH con aumento de reclutamiento folicular e insuficiencia lútea, lo que produce un aumento en la producción de estrógenos que se traduce en síntomas típicos como son mastalgia y metrorragia. Se puede producir un acortamiento del ciclo debido a la disminución de la fase folicular.**
- **En una etapa posterior, con el agotamiento de la reserva ovárica, el aumento de FSH se acompaña de disminución de los estrógenos, lo que produce síntomas vasomotores, anímicos y articulares y signos como atrofia urogenital.**

FERTILIDAD DESPUES DE LOS 35 AÑOS

En este período disminuye la fertilidad. Una mujer de 40 años sexualmente activa tiene una probabilidad de embarazarse de alrededor de **8% cada mes, mientras que una mujer de 20 años tiene una probabilidad del **20 al 25%**.**

En Chile, se ha postergado la edad del primer embarazo y **más del 17% de los partos que ocurren en Chile son en mujeres de 35 años y más por lo que constituyen un grupo de especial importancia.**

NACIDOS VIVOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE

Año	Total	Edad de la madre (años)			
		<15	15-19	20-34	≥35
2007	240.569	955	38.650	162.754	38.165
2011	247.358	923	36.102	168.972	41.312
2014	250.997	852	29.454	177.999	42.692

MINSAL. DEIS. 2014

FERTILIDAD DESPUES DE LOS 35 AÑOS

- El embarazo en mujeres mayores se asocia a un mayor riesgo de aborto espontáneo, morbilidad materna, anomalías congénitas y morbilidad perinatal.
- Aunque la probabilidad de embarazo esté disminuida, el riesgo que representa un embarazo para la salud materna y fetal es mayor.



FACTORES DE RIESGO PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

- En mujeres sanas la edad no es un factor de riesgo para el uso de los distintos métodos anticonceptivos.
- El mayor riesgo está dado por:
 - La incidencia de factores de riesgo y patologías que aumentan con la edad (enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer y enfermedades metabólicas como diabetes y obesidad).
 - Un eventual embarazo si se usan métodos de baja eficacia anticonceptiva.

FACTORES DE RIESGO PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS

- Las condiciones descritas hacen necesario el uso de métodos anticonceptivos eficaces y seguros cuya elección requiere, con mayor énfasis que en edades anteriores, un balance entre el beneficio de evitar un embarazo y el riesgo de salud que puede significar el uso de un determinado método anticonceptivo.



ASPECTOS BIOMÉDICOS A CONSIDERAR PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE 35 AÑOS O MÁS



RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

- **Criterios médicos de elegibilidad (CME) para el uso de los métodos anticonceptivos**
- **Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas (RPS) para el uso de los métodos anticonceptivos**

Estas recomendaciones representan el consenso de las agencias que trabajan en salud reproductiva.




CATEGORÍAS USADAS EN LOS CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS

Si una condición se clasifica en:

- ***Categoría 1:*** No hay limitaciones para el uso del método.
- ***Categoría 2:*** Las ventajas de usar el método superan los posibles riesgos.
- ***Categoría 3:*** Los posibles riesgos superan las ventajas de usar el método.
- ***Categoría 4:*** El uso del método representa un riesgo inaceptable.

USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL

- La edad no es un factor de riesgo en mujeres sanas.
- El mayor riesgo para el uso de anticoncepción hormonal esta dado por el tabaquismo y la incidencia de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, cáncer y enfermedades metabólicas que aumentan con la edad.



USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA

Categorías 3 y 4 de los Criterios de Elegibilidad *

- Enfermedades cardiovasculares
- Cáncer de mama
- Diabetes con complicaciones o de más de 20 años de evolución
- Hipertensión
- Tabaquismo
- Enfermedades hepáticas
- Migraña

* Dependiendo de la severidad de la condición.

Se han seleccionado las patologías y factores de riesgo más frecuentes a esta edad.



Número estimado de eventos cardiovasculares por 100.000 años-mujer según uso de ACO en mujeres sin factores de riesgo

Patología	20-24 años		40-44 años	
	no usuaria	usuaria	no usuaria	usuaria
ETV	3.2	9.7	5.9	17.8
Isquemia Cereb.	0.8	1.5	1.6	4.0
Hemorragia Cereb.	1.3	1.3	4.6	9.3
Infarto Miocar.	<0.1	<0.1	2.1	5.3



Farley et al. Contraception 1998;57:21
Adaptado de Meirik O. 2000

Edad 20-24 años: Número estimado de eventos cardiovasculares por 100.000 años-mujer según uso de ACO y cigarrillo

	No fumadora		Fumadora
	no usuaria	usuaria	usuaria
ETV	3.2	9.7	9.7
Isquemia Cer.	0.8	1.5	3.0
Hemorragia Cer.	1.3	1.3	3.8
Infarto Miocar.	<0.1	<0.1	0.3



Farley et al Contraception 1998;57:211-30
Adaptado de Meirik O. 2000

Edad 40-44 años: Número estimado de eventos cardiovasculares por 100.000 años-mujer según uso de ACO y cigarrillo

	No fumadora		Fumadora
	no usuaria	usuaria	usuaria
ETV	5.9	17.8	17.8
Isquemia Cer.	1.6	4.0	8.0
Hemorragia Cer.	4.6	9.3	23.2
Infarto Miocar.	2.1	5.3	42.6



Farley et al. Contraception 1998;57:211-30
Adaptado de Meirik O. 2000

Razón de riesgo (IC) para ETV asociada al uso de anticonceptivos orales combinados (30 mcg EE) según progestina

Levonorgestrel	1 (referencia)
Desogestrel	2.4 (1.3-4.6) ^a
Gestodeno	3.1 (1.6-5.9) ^a
Drosperinona	1.9 (1.5-3,0) ^{b,c,d,e}
Ciproterona*	1.9 (1.6-2.3) ^{b,c}

IC: Intervalo de confianza 95%

*** Tratamiento de hiperandrogenismo con efecto anticonceptivo**

^a WHO, *Lancet* 1996; 346:1582; ^b Van Hylckama y cols, *BMJ* 2009,339:b2921;

^c Lidegaard y col, *BMJ* 2009,339:b2890; ^d Jick SS, Hernandez RK *BMJ*

2011;340:d2151; ^e Parkin L y cols *BMJ* 2011;340:d2139

USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA

- Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares a partir de los 40 años: es preferible usar pastillas combinadas con levonorgestrel, porque tiene menor riesgo de tromboembolismo que otros progestágenos.
- Riesgo relativo de cáncer de mama es **1.24** en usuarias de ACO actuales o en los últimos 10 años: las mujeres deben manejar esta información al hacer la elección de un método ya que la incidencia es mayor en esta etapa.



BENEFICIOS PARA LA SALUD Y USO DE ACO EN MUJERES DE 35 AÑOS O MÁS

Reducción del riesgo de:

- **Síntomas de la peri-menopausia**
- **Cáncer ovárico**
- **Cáncer del endometrio**
- **Cáncer colorectal**
- **Osteoporosis**
- **Síndrome premenstrual**
- **Anemia**
- **Infecciones pélvicas**



Peralta O, Díaz S. Anticoncepción hormonal combinada. En Ginecología, 4ta Edición. (ed.) A. Pérez Sánchez. Editorial Mediterráneo Ltda. Santiago, Chile. Pp. 809-826. 2014.

ANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS Y RIESGO DE CANCER DE OVARIO Y ENDOMETRIO

CANCER	USO	RIESGO RELATIVO
Ovario*	Todo	0.7
	5 años	0.5
	10 años	0.2
Endometrio*	1 año	0.8
	4 años	0.5

**La protección se mantiene por >10 años después del uso*



Adaptado de WHO Technical Report Series. Oral Contraceptives and Neoplasia, 1992 y Lancet 347:1713, 1996

USO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS

Se considera que la información disponible para los anticonceptivos combinados orales se puede aplicar a la anticoncepción combinada administrada en inyectables mensuales, anillos vaginales y parches transdérmicos.



USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL CON PROGESTÁGENO SOLO


Categoría 4

- Cáncer de mama actual

Categoría 3

- Enfermedad tromboembólica
- Antecedente de cáncer de mama
- Sangrados vaginales inexplicados
- Aparición de una enfermedad cardiovascular o de un síndrome jaquecoso con signos neurológicos focales durante el uso del método.

Se han seleccionado las patologías y factores de riesgo más frecuentes a esta edad.



USO DE INYECTABLES CON PROGESTÁGENO SOLO

Entregan mayor dosis de progestágeno

- Descartar condiciones consideradas en Categoría 3 específicamente para estos inyectable (patología cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular (presión arterial elevada de más de 159/99 mm Hg y consumo de cigarrillos) y diabetes complicada o de más de 20 años de evolución.
- Considerar que tienen un efecto negativo sobre la masa ósea.
- Evaluar la irregularidad menstrual (mayor probabilidad de enmascarar una patología ginecológica).




USO DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA

- La anticoncepción de emergencia es siempre una opción ante una relación sexual no protegida.
- Puede ser particularmente útil en esta etapa si se ha discontinuado el uso de otros métodos, pensando que ya no eran necesarios.
- No tiene contraindicaciones.



USO DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

- La T con Cobre 380 A tiene una vida útil de más de 10 años y se puede dejar hasta un año después que se diagnostique la menopausia. No tiene efectos sistémicos y es una buena opción para la mayoría de las mujeres en la peri-menopausia.
- El uso de un DIU con levonorgestrel es también altamente eficaz y puede ser un tratamiento efectivo para la menorragia. Se deben aplicar los criterios de elección comunes a los métodos de progestágeno solo.



USO DE MÉTODOS DE BARRERA

- Pueden ser una alternativa adecuada por la falta de efectos sistémicos.
- Sólo el condón masculino ofrece protección contra ITS/VIH y se debe entregar información sobre este método.
- El condón femenino y el diafragma tienen menor eficacia anticonceptiva lo que puede ser compensado por la menor fertilidad en este período.




USO DE MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

Después de los 35 años, la identificación del período fértil puede ser más difícil por la irregularidad de los ciclos menstruales y del patrón de secreción de moco cervical, lo que puede exigir períodos de abstinencia más largos.



ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA (AQV)

- Muchas mujeres han completado ya su fertilidad y no desean otro embarazo.
- La AQV o esterilización femenina puede ser una muy buena opción, ya que no influye en las patologías sistémicas pero hay que considerar algunas condiciones que aumentan el riesgo quirúrgico.
- La AQV masculina o vasectomía es una buena opción, especialmente si la mujer tiene riesgo quirúrgico.







SEGURIDAD Y EFICACIA

La eficacia del anticonceptivo y la consistencia de uso son aspectos importantes de la seguridad, en especial, donde y cuando el aborto inducido es de riesgo o cuando hay un alto riesgo obstétrico.

Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos

Más efectivo



Implantes

DIU

**Esterilización
femenina**

Vasectomía

*Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año*



Inyectables



Píldoras, anillos, parches



**Método de la Amenorrea de
Lactancia- (MELA)**



Condón masculino



Diafragma



Condón femenino



Métodos de abstinencia periódica



Espermicidas

Menos efectivo

Adaptado de WHO 2006

ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO

Aspectos pertinentes en estas edades:

- Riesgos y beneficios específicos de los métodos anticonceptivos.
- Efectos secundarios del método elegido, que pueden ser más frecuentes.
- Situación de vida de la mujer que puede influir en la opción de un método definitivo (AQV, doble protección para prevenir ITS).

EVALUACIÓN ANTES DE INICIAR EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO

- Historia médica: es el instrumento más importante en la detección de factores de riesgo y condiciones de salud que afectan la elección de un método.
- Control de presión arterial: es indispensable en el caso de métodos hormonales.

El examen pélvico, el examen de mamas, el examen de Papanicolaou y la mamografía son procedimientos importantes en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, especialmente en usuarias mayores de 35 años.

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN

- En la mayoría de las mujeres el cese de la función reproductiva ocurre alrededor de los 50 años pero existe un grupo que persiste fértil sobre esta edad, estimándose que el 96% de las mujeres ha llegado a la menopausia a la edad de 55 años.
- En mujeres peri-menopáusicas pueden ocurrir síntomas vasomotores que no son un indicador válido de falla reproductiva.
- Se debe realizar un análisis caso a caso para poder ofrecer la mejor orientación.

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN NO HORMONAL

- En mujeres mayores de 50 años, suspender el método en el momento del diagnóstico de la menopausia después de un año de amenorrea.
- En mujeres cerca de los 50 años que no reúnen la condición anterior, no se considera necesario extraer el DIU aunque se haya cumplido el plazo para el retiro.

Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years.
J Fam Plann Reprod Health Care 2005;31: 51-63

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN NO HORMONAL

- En mujeres menores de 50 años, suspender el método en después de dos años de amenorrea ya que persiste el riesgo de ovulación en el primer año de amenorrea, lo que ha sido estimado por la OMS en 2 a 10% en mujeres menores de 45 años.
- Es importante destacar que la terapia de reemplazo hormonal no tiene efecto anticonceptivo.

Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years. *J Fam Plann Reprod Health Care* 2005;31: 51-63; Bhatena RK, Guillebaud J. Contraception for the older woman: an update. *Climacteric* 2006;9:264–276, Baldwin, M., Jensen, J., Contraception during the perimenopause. *Maturitas* 76 (2013): 235- 242; Gebbie A y cols. V. Incidence of ovulation in perimenopausal women before and during hormone replacement therapy. *Contraception* 1995; 52:221-22.

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA

- La amenorrea no es un indicador confiable de falla ovárica y, además, la anticoncepción puede enmascarar los síntomas menopáusicos o pueden presentarse en el intervalo libre de anticoncepción.
- En el intervalo libre en usuarias de ACO, se observa una importante dispersión de los valores de FSH que están ubicados en rango pre y post menopáusicos. Un valor aislado de FSH es un mal predictor de falla ovárica en usuarias de anticoncepción hormonal combinada.



Castracane V y cols. When is it safe to switch from oral contraceptives to hormonal replacement therapy. Contraception 1995;52:371-376; Klein, J., Sauer M., Assessing fertility in women of advanced reproductive age. Am J Obstet Gynecol 2001; 185:758; Creinin MD. Laboratory criteria for menopause in women using oral contraceptives. Volumen 66, 1: 101-104

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA

En mujeres usuarias de un método hormonal combinado:

Suspender el uso de este método por 6 o más semanas:

- Medir el nivel plasmático de hormona folículo estimulante.
- Si el valor está sobre 30 UI/l en 2 o más mediciones separadas al menos por 2 meses, asociado a amenorrea, correspondería a falla ovárica.
- Se podría suspender la anticoncepción luego de 1 año si es mayor de 50 o de 2 si es menor de 50 años.


Indicar un método de barrera en el intervalo en estos casos.



Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years.
J Fam Plann Reprod Health Care 2005;31: 51-63.

SUSPENSIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN HORMONAL CON PROGESTÁGENO SOLO

- La determinación de FSH es útil en mujeres usuarias de anticoncepción con píldoras de progestina sola, (con excepción del desogestrel) DMPA, implantes y DIU con LNG.
- En estos casos, que pueden asociarse con amenorrea, se sugiere 2 mediciones de FSH, separadas por 1-2 meses. Si el valor está sobre 30 UI/l, suspender anticoncepción luego de 1 o 2 años según si es mayor o menor de 50 años.



Beksinska M y cols. Detection of raised FSH levels among older women using depot medroxy acetate and norethisterone enanthate. *Contraception* 68 (2003) 339-343; Juliato CT y cols. Usefulness of FSH measurements for determining menopause in long-term users of depot medroxyprogesterone acetate over 40 years of age. *Contraception* (2007) 282-286; Guidance FFPRHC for contraception for women aged over 40 years. *J Fam Plann Reprod Health Care* 2005;31: 51-63

CONCLUSIONES




La mujer necesita anticonceptivos eficaces y seguros después de los 35 años ya que su fertilidad está disminuida pero no abolida.

Si la mujer es sana, su edad no es una razón para limitar sus opciones anticonceptivas.

De acuerdo a los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS, la presencia de patología o factores de riesgo para el uso de ciertos métodos requiere evaluación cuidadosa.

PARA EL USO SEGURO DE ANTICONCEPCIÓN DESPUÉS DE LOS 35 AÑOS SE DEBEN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE:

- **Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile** www.minsal.cl
- **Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS** www.who.int.reproductive-health



Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl