



MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

Dra. Soledad Díaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
2016



ICMER

ASPECTOS GENERALES



MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

Hay una diferencia importante entre:

- Los métodos basados en síntomas que determinan el período fértil usando evidencia observable y reconocible por cada mujer y
- Los métodos basados en el calendario que hacen un cálculo de probabilidades basado en datos estadísticos y no en la condición individual del ciclo.

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

Se basan en:


- **El reconocimiento de los signos y síntomas asociados a los períodos fisiológicos de fertilidad e infertilidad**
- **El uso de los períodos infértiles para la actividad sexual**

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS Y CONDUCTUALES

- **El período fértil es episódico:**
 - **La ovulación se produce una vez en cada ciclo menstrual.**
 - **La sobrevivencia del óvulo es de 12-24 horas.**
 - **La sobrevivencia de los espermatozoides es de +/- 5 días.**
 - **La fecundación sólo se puede lograr si el coito antecede a la ovulación por no más de cinco días o si coincide con la ovulación (puede ocurrir en cualquiera de los días comprendidos desde el 1° al 6° día después del coito).**

PERIODO FÉRTIL



Periodo fértil: días -5 a 0 con respecto a la ovulación

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS Y CONDUCTUALES

- **Las mujeres y/o las parejas tienen la capacidad de reconocer el período fértil.**
- **Las parejas tienen la capacidad y motivación para modificar la conducta sexual.**

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

MECANISMO DE ACCIÓN

- **No hay fertilización**
- **Se produce una barrera de tiempo entre el espermatozoide y el óvulo**

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

EFICACIA ANTICONCEPTIVA

Tasas de embarazo por 100 mujeres más bajas observadas en el primer año de uso ^a

- Método del calendario: **9**
- Método de los días estándar: **5**
- Método del moco cervical: **2**
- Método sinto-térmico: **0-2**
- Método de los 2 días: **4**
- Si sólo se tienen relaciones en el periodo posovulatorio: **1**

Tasa de embarazo por 100 mujeres durante el primer año de uso típico ^b: **25**

^a Basado en el número de embarazos observado en 100 usuarias que usan el método en forma correcta y consistente durante un año. ^b Basado en el número de embarazos observado en 100 usuarias que usan el método en forma típica.. Adaptado de Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud, 2005.

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

EFICACIA ANTICONCEPTIVA

- La eficacia anticonceptiva de estos métodos depende en gran medida de la capacidad de la pareja para mantener la abstinencia en el período fértil.
- Las altas tasas de embarazo observadas durante el uso típico consideran en forma conjunta los embarazos por falla del método y por relaciones en el período de abstinencia requerido (fallas de los/as usuarios/as).
- En los ciclos en que la pareja tuvo relaciones en el período fértil, la tasa de embarazo es semejante al de parejas que tienen relaciones sexuales en el período fértil sin usar protección anticonceptiva.

EFICACIA DEL MÉTODO DE LA OVULACIÓN EN EL ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE LA OMS

GRUPO	EMBARAZOS	CICLOS	TASA ANUAL (por 100 mujeres)
Todas	130	7484	20.4
Uso Correcto	16	6683	3.1
Uso Incorrecto	114	801	86.4*

Datos de 725 mujeres

Adaptado de Trussel & Grummer-Strawn. Fam Plann Persp 22:65, 1990

** Similar a la tasa observada en mujeres que no usan anticoncepción*

EFICACIA DEL MÉTODO SINTOTÉRMICO SEGUN LA CONDUCTA EN EL PERÍODO FÉRTIL


	CONDUCTA	
	Abstinencia	Uso de Barreras
Ciclos	3208	4196
Embarazos		
Total	7	8
Uso correcto	0	0
Tasa de embarazos*	2.6	2.3

* *Calculada por Índice de Pearl, usando como denominador el total de los meses de exposición*


Adaptado de Estudio Europeo Multicéntrico. Adv Contracept 9:269:283, 1993

Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos


Más efectivo




Implantes



DIU



**Esterilización
femenina**




Vasectomía

*Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año*



Inyectables



Píldoras, anillos, parches



**Método de la Amenorrea de
Lactancia- (MELA)**



Condón masculino



Diafragma



Condón femenino



Métodos de abstinencia periódica



Espermicidas

Menos efectivo

*Aproximadamente
30 embarazos por
cada 100 mujeres
en un año*

Adaptado de WHO 2006

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

VENTAJAS

Entre las características que las parejas pueden percibir como positivas están:

- **Son efectivos si se usan correcta y consistentemente**
- **No requieren drogas ni artefactos**
- **No tienen efectos secundarios físicos**
- **Contribuyen al conocimiento de los procesos biológicos**
- **Promueven el diálogo de la pareja**
- **La responsabilidad es compartida**
- **Son económicos**
- **Son aceptados por la Iglesia Católica**

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

DESVENTAJAS




Entre las características que las parejas pueden percibir como negativas están:

- Requieren abstinencia sexual**
- Las fallas en la abstinencia tienen altas tasas de embarazo**
- El período de aprendizaje puede durar 3 a 6 meses**
- Requiere registro diario de los signos de fertilidad**
- La abstinencia sexual puede generar tensiones**
- Requiere fuerte motivación para uso por períodos prolongados**
- No protegen de enfermedades de transmisión sexual (incluyendo VIH/SIDA)**

**RECOMENDACIONES PARA EL USO
DE LOS MÉTODOS DE
ABSTINENCIA PERIÓDICA**

Para el uso de los métodos de abstinencia periódica se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL, 2016)
- Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Prácticas seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS



www.minsal.cl

www.who.int.reproductive-health

CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD PARA LOS MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

- **No hay ninguna condición médica que restrinja el uso, salvo aquellas en que un nuevo embarazo pone en riesgo la vida de la mujer**

ALTO RIESGO OBSTÉTRICO

Cuando la mujer corre un riesgo inaceptable si se embaraza, es preciso advertirle que los siguientes métodos anticonceptivos no son recomendables por la elevada tasa de fracaso que se observa en el uso habitual:

- Métodos de barrera
- **Abstinencia periódica**
- Método de la amenorrea de lactancia
- Coito interrumpido



ALTO RIESGO OBSTÉTRICO

Las condiciones médicas que exponen a una mujer a un alto riesgo obstétrico son:

- Cáncer de mama
- Valvulopatía cardíaca complicada
- Diabetes: insulino-dependiente, con nefropatía, retinopatía, neuropatía u otra enfermedad vascular; o de más de 20 años de duración
- Cáncer de endometrio u ovario
- Epilepsia
- Presión arterial alta (sistólica > 160 mmHg o diastólica > 100 mmHg)
- VIH (estadios OMS 1-4)
- Cardiopatía isquémica
- Enfermedad trofoblástica gestacional maligna
- Tumores malignos del hígado (hepatoma) y carcinoma hepatocelular (CAH)
- Esquistosomiasis con fibrosis del hígado
- Cirrosis grave (descompensada)
- Anemia drepanocítica
- ITS
- Accidente cerebrovascular
- Lupus eritematoso sistémico (LES)
- Mutaciones trombogénicas
- Tuberculosis

CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD PARA LOS MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

Cuidado: Algunas condiciones requieren precaución o postergación del inicio:

- Edad: primeros ciclos después de la menarquia y en la peri-menopausia
- Lactancia materna
- Parto o aborto reciente
- Sangrado intermenstrual
- Descarga vaginal
- Infecciones o enfermedades agudas o crónicas que alteren el moco cervical o la temperatura basal o la regularidad de los ciclos
- Uso de medicamentos que alteren la regularidad de los ciclos o afecten el moco cervical (litio, antidepresivos tricíclicos, ciertos ansiolíticos, ciertos antibióticos y ciertas drogas antiinflamatorias)

MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA VIH e ITS

Las mujeres que viven con VIH o tienen SIDA o están en terapia antiretroviral pueden usar estos métodos, pero no debe recomendarse su uso, por el riesgo de adquirir una ITS u otra variante del virus VIH.

Hay que enfatizar el uso adicional de condones para la protección contra la transmisión del VIH y las ITS.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS



ORIENTACIÓN A LAS Y LOS POTENCIALES USUARIAS/OS

La orientación debe darse idealmente a ambos miembros de la pareja, incluyendo:

- Presentación de todas las opciones anticonceptivas.**
- Las características de la abstinencia periódica, en especial las tasas de embarazo observadas durante el uso habitual de este método y la relación entre uso correcto y eficacia anticonceptiva.**
- Las diferentes técnicas utilizadas para determinar el período fértil; muchas parejas necesitan información básica sobre la fisiología del ciclo menstrual para entender estas técnicas.**
- La importancia de la capacitación inicial y el seguimiento hasta alcanzar la autonomía en el uso de la técnica elegida.**
- La necesidad de llevar un registro de las fechas de las menstruaciones y un registro diario de los signos y síntomas de fertilidad, de acuerdo a la técnica escogida.**

ORIENTACIÓN A LAS Y LOS POTENCIALES USUARIAS/OS (cont.)

- **Los riesgos de usar este método para una mujer que tiene razones médicas para evitar un embarazo.**
- **Las dificultades para usar este método cuando los ciclos menstruales son muy irregulares, en especial después de la menarquia y en la peri-menopausia.**
- **El reconocimiento de los signos y síntomas de la fertilidad, como en el método de la ovulación, se puede aprender durante la amenorrea de lactancia para aplicarlo cuando se reinician los ciclos menstruales. La interpretación de la temperatura basal y de los cambios en el moco cervical puede ser más difícil durante la lactancia. Las usuarias requieren acompañamiento profesional.**




ORIENTACIÓN A LAS Y LOS POTENCIALES USUARIAS/OS (cont.)

- **La mayor eficacia anticonceptiva se obtiene con el uso exclusivo del período infértil para las relaciones sexuales (difícil para la mayoría de las parejas).**
- **Es más eficaz el uso de varias técnicas para identificar el período fértil (método sintotérmico).**
- **La técnica menos precisa para detectar el período fértil es la del calendario.**
- **El método de la ovulación es el más fácil de aprender, incluso para mujeres con nivel educacional bajo.**
- **Para muchas parejas es difícil identificar el período fértil, especialmente en los primeros ciclos y a muchas personas les es difícil mantener la abstinencia, por lo que el seguimiento es importante.**

ORIENTACIÓN A LAS Y LOS POTENCIALES USUARIAS/OS (cont.)

- **Se pueden usar las técnicas para determinar el período fértil en combinación con el uso de anticonceptivos de barrera para la actividad sexual durante los días en que hay probabilidad de embarazo.**
- **El reconocimiento del período fértil más el uso de barreras elimina la necesidad de abstinencia. También restringe el uso de los métodos de barrera, que puede ser incómodo, a sólo unos días del ciclo menstrual.**

TÉCNICAS PARA DETERMINAR EL PERÍODO FÉRTIL



MÉTODO DE LA TEMPERATURA BASAL FUNDAMENTOS

- Hay un alza térmica posovulatoria
- El alza térmica se produce 2-3 días después del pico plasmático de LH
- La ovulación se produce dentro de las 24 horas que siguen al pico de LH en plasma
- El alza térmica es de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ por sobre el promedio de la fase folicular
- El alza térmica debe ser observada por 3 días consecutivos



MÉTODO DE LA TEMPERATURA BASAL REGLAS PARA LA ABSTINENCIA SEXUAL


- **Debe mantenerse abstinencia sexual desde el primer día del ciclo, hasta el cuarto día después del alza de temperatura**
- **No se debe usar el cálculo del ritmo calendario para determinar el primer día fértil porque puede aumentar el riesgo de embarazo**

Días promedio de abstinencia: 18-20



MÉTODO DE LA OVULACIÓN FUNDAMENTOS


- Las características del moco cervical dependen de los niveles de estradiol y progesterona:
 - *claro y filante en el período estrogénico*
 - *espeso y opaco en el período progestativo*
- El moco cervical estrogénico permite el transporte, almacenamiento y sobrevivencia de los espermatozoides



MÉTODO DE LA OVULACIÓN FUNDAMENTOS

Las características del moco cervical:

- Permiten identificar el período fértil
- La mujer puede reconocerlas a nivel de sus genitales externos por observación directa y cambios en sus sensaciones




EFICACIA DEL MÉTODO DE LA OVULACIÓN EN EL ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE LA OMS

GRUPO	EMBARAZOS	CICLOS	TASA ANUAL (por 100 mujeres)
Todas	130	7484	20.4
Uso Correcto	16	6683	3.1
Uso Incorrecto	114	801	86.4*

Datos de 725 mujeres

Adaptado de Trussel & Grummer-Strawn. Fam Plann Persp 22:65, 1990

** Similar a la tasa observada en mujeres que no usan anticoncepción*





MÉTODO SINTOTÉRMICO

DETERMINACIÓN DEL PERÍODO FÉRTIL

Utiliza todas las técnicas anteriores más los síntomas peri-ovulatorios:

- Cálculo del primer día fértil restando 20 días al ciclo más corto
- Temperatura basal
- Moco cervical
- Síntomas peri-ovulatorios (dolor abdominal, tensión mamaria, sangrado, etc.)
- Palpación del cuello uterino





MÉTODO SINTOTÉRMICO

REGLAS PARA LA ABSTINENCIA SEXUAL

Debe mantenerse la abstinencia:

- Desde que el primer indicador positivo (moco cervical, temperatura basal, cálculo) indique el primer día fértil
- Hasta el cuarto día después del día pico del moco cervical o el alza térmica, considerando el último indicador que cambie

Días promedio de abstinencia: 10 - 15





EFICACIA DEL MÉTODO SINTOTÉRMICO SEGUN LA CONDUCTA EN EL PERÍODO FÉRTIL

	CONDUCTA	
	Abstinencia	Uso de Barreras
Ciclos	3208	4196
Embarazos		
Total	7	8
Uso correcto	0	0
Tasa de embarazos*	2.6	2.3

* *Calculada por Índice de Pearl, usando como denominador el total de los meses de exposición*

Adaptado de Estudio Europeo Multicéntrico. Adv Contracept 9:269:283, 1993



MÉTODO DE LOS DOS DÍAS


Es una variación del método de la ovulación o del moco cervical.

Se llama el Método de los Dos Días porque toma en cuenta si tuvo secreciones en el día en que hace la observación o en el día anterior (**hoy o ayer**). Si la mujer tuvo secreciones **hoy o ayer**, puede quedar embarazada. Para evitar un embarazo no debe tener relaciones sexuales sin protección **hoy**.

MÉTODO DEL RITMO-CALENDARIO FUNDAMENTOS

Supone que:

- **La fase lútea dura 12-16 días**
- **La sobrevivencia del óvulo es menor de 24 horas**
- **La sobrevivencia de los espermatozoides es de 2-5 días**
- **La duración de los ciclos previos permite predecir la duración de los ciclos futuros para lo que deben considerarse 6-12 ciclos previos**



MÉTODO DEL RITMO-CALENDARIO

CÁLCULO DEL PERÍODO FÉRTIL

Fórmula de Ogino:

Ciclo más corto -18 días = Primer día fértil

Ciclo más largo -11 días = Ultimo día fértil

Fórmula de Knaus:


Ciclo más corto -17 días = Primer día fértil

Ciclo más largo -13 días = Ultimo día fértil

Otras:

Ciclo más corto -19 ó 20 días = Primer día fértil


Ciclo más largo -10 ó 12 días = Ultimo día fértil



MÉTODO DE LOS DÍAS ESTÁNDAR

- Una mujer puede usar el método de los días estándar si la mayoría de sus ciclos menstruales dura entre 26 y 32 días.
- Se considera que el periodo fértil se extiende desde el día 8 hasta el día 19 de cada ciclo y la pareja debe evitar las relaciones sexuales en este intervalo.
- Si ella tiene más de 2 ciclos más largos o más cortos a lo largo de un año, este método será menos efectivo y se debe sugerirle otro método.

Como recordatorio, se ha diseñado un collar con cuentas de diferentes colores (CycleBeads, el collar del ciclo) que indica los días fértiles e infértiles del ciclo con un color específico; también se puede emplear un calendario para marcar las fechas relevantes.



Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl