

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

Dra. Soledad Díaz

**Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
2018**



ICMER

CONTENIDO DE ESTA PRESENTACION

- **DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU).**
- **EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ANTICONCEPTIVA Y LA SEGURIDAD DE LOS DIU.**
- **CRITERIOS MÉDICOS DE LA OMS PARA EL USO DE LOS DIU.**

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

- **Los dispositivos intrauterinos (DIU) son anticonceptivos reversibles y de largo plazo, efectivos y seguros para la mayoría de las mujeres.**
- **Son usados por alrededor de 160 millones de mujeres en el mundo y por cerca del 30% de las mujeres que se atienden en el SNSS de Chile.**

210.000.000 AQV

160.000.000 DIU → >10.000.000 DIU-LNG

90.000.000 ACO




Fig. 1. Prevalence of IUD use in women aged 15–49, married or in union (2005).

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

DEFINICION

Un dispositivo intrauterino (DIU) consiste en un elemento pequeño y flexible de plástico, con cobre o con levonorgestrel, que impide el embarazo cuando se inserta dentro de la cavidad uterina.



DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

➤ Liberadores de cobre:


T con cobre 380A (T-Cu)

Multiload 375 ®;

Nova T ®

Flexi-T 300 ®

GyneFix ®



➤ Liberadores de Levonorgestrel (LNG):

T-LNG-52 (contiene 52 mg de LNG)


T-LNG-13,5 (contiene 13,5 mg de LNG)

Otras T-LNG (contienen 52 mg)


DIU LIBERADOR DE COBRE

T con Cobre:


Tiene un marco de polietileno en forma de T, con aproximadamente 176 mg de alambre de cobre en el eje vertical y 2 collares de cobre en el eje horizontal con aproximadamente 66,5 mg cada uno. La superficie total de cobre es de $380 \text{ mm}^2 \pm 23 \text{ mm}^2$.



DIU-LNG 13,5 mg vs DIU-LNG 52 mg



- **13,5 mg**
- Tamaño 28 x 30 mm
- Tubo de inserción de menor diámetro (3,8 mm)
- Menores niveles séricos de LNG ~ 160 pg/ml
- Anillo de plata visible para evaluación ultrasónica



- **52 mg**
- Tamaño 32 x 32 mm
- Tubo de inserción 4,4 mm con Evoinserter®
- Niveles séricos iniciales de LNG ~ 300 pg/ml

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS DURACIÓN DE LA EFICACIA

MÉTODO	DURACIÓN SEGÚN REGISTRO (años)
T-Cu 380A	10
T-LNG-52 mg	5
T-LNG-13,5 mg	3

Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos

Más efectivo



Implantes



DIU



**Esterilización
femenina**



Vasectomía

*Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año*



Inyectables



Píldoras, anillos, parches



**Método de la Amenorrea de
Lactancia- (MELA)**



Condón masculino



Diafragma



Condón femenino



Métodos de abstinencia periódica



Espermicidas

Menos efectivo

*Aproximadamente
30 embarazos por
cada 100 mujeres
en un año*

Adaptado de WHO 2006

EFICACIA DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Tasa de embarazos por 100 mujeres en los primeros 12 meses de uso

Método anticonceptivo	Uso correcto y consistente	Uso típico
Sin método	85	85
Implantes de progestágeno solo	0.05	0.05
Vasectomía	0.1	0.1
Inyectables combinados	0.1	3
Inyectable progestágeno solo (AMPD)	0.3	3
Esterilización femenina	0.5	0.5
Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel	0.2	0.2
Dispositivo intrauterino TCu 380A	0.6	0.8
Anticonceptivos orales de progestágeno solo (en lactancia)	0.5	1
Método de la amenorrea de lactancia (MELA)*	0.5	2
Anticonceptivos combinados orales	0.1	6-8
Anillo vaginal combinado y parche transdérmico combinado	0.5	6-8
Anticonceptivos orales de progestágeno solo (sin lactancia)	0.5	6-8
Condón masculino	2	15
Coito interrumpido	4	19
Diafragma con espermicida	6	16
Abstinencia periódica	1-9	25
Condón femenino	5	21
Espermicidas	18	29

0-1 Muy efectivo
2-9 Efectivo
10-30 Menos efectivo

* Tasa de falla en los primeros 6 meses posparto.

Fuente: Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad. MINSAL 2017

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS PREVENCIÓN DE EMBARAZO ECTÓPICO

EMBARAZO

METODO	INTRAUTERINO*	ECTÓPICO*	RAZÓN**
DIU Cobre	0,81	0,068	0,078
Ninguno	42,80	0,266	0,006

* Tasas crudas por 100 años-mujer.

- * Razón Embarazos Ectópicos / Intrauterinos.

Postmarketing Surveillance of NORPLANT, WHO / HRP. Contraception 63:167, 2001.

El DIU-LNG-52 es eficaz en la prevención del embarazo ectópico siendo las tasas de embarazo ectópico de **0,02 por 100 años-mujer.**

French R y cols. Cochrane Database Syst Rev.; (3):CD001776.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS DIU CON COBRE

- El número de espermatozoides en la trompa está reducido significativamente en usuarias de T-Cu. ^a
- Los huevos obtenidos de la trompa de Falopio después de un coito en el periodo fértil en usuarias de T-Cu no están fecundados. ^b
- La frecuencia con que se detecta HCG en la fase post-ovulatoria en usuarias de T-Cu es la misma que en mujeres no expuestas al riesgo de embarazo. ^c
- No se han obtenido huevos del útero en usuarias de T-Cu entre 2 y 5 días después de la ovulación. ^d

Ortiz ME, Croxatto HB. Contraception; 75(6 Suppl):S16-30, 2007; ^a Aref y cols, 1983; Croxatto y cols, 1975; Koch, 1980; Settlage y cols, 1973; Tredway y cols, 1975; ^b Alvarez et al. Fertil Steril. 49: 768; 1988; Herrera et al. ALIRH May 93, Buenos Aires; ^c Wilcox y cols. Fertil Steril 44: 367, 1985 y 47: 265, 1987 ; ^d Croxatto. The Physiology and Genetics of Reproduction. 1974.

MECANISMO DE ACCION DE LOS DIU CON COBRE

**EL UNICO EFECTO DEMOSTRADO DEL
DIU-CU EN LA MUJER ES
LA INHIBICIÓN DE LA FECUNDACIÓN**

**CON EL USO DEL DIU-CU EN LA MUJER
NO SE PRODUCEN EMBRIONES**

Ortiz ME, Croxatto HB. Contraception; 75(6 Suppl):S16-30, 2007.

MECANISMO DE ACCIÓN DEL DIU CON LEVONORGESTREL (DIU-LNG 52 mg)

- **Reduce la cantidad del moco cervical e inhibe la penetración de los espermatozoides.**
- **Inhibe la ovulación en el 55% de los ciclos.**
- **Impide la fecundación.**
- **El DIU-LNG tiene además un claro efecto prefertilización por la presencia de Glicodelina A, potente inhibidor de la adhesión de espermatozoides a la zona pelúcida**

Ortiz ME, Croxatto HB. Contraception; 75(6 Suppl):S16-30, 2007.

Seppala et al. Glycodelin: A major licocalin protein. Endocrine reviews 2002; 23 (4); 401- 430

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

BENEFICIOS PARA LA SALUD

- Son altamente eficaces desde la inserción
- Tienen una duración prolongada
- No interfieren con el coito
- Hay un rápido retorno a la fecundidad después de la extracción
- No afectan la lactancia
- No hay interacción con drogas

DIU con cobre: no producen los efectos sistémicos de los anticonceptivos hormonales y son de bajo costo. Protección contra el cáncer de endometrio.

DIU con LNG: mejoría en anemia, menorragia y endometriosis, control de sangrados por miomas uterinos y adenomiosis. Posible protección contra hiperplasia de endometrio.

* Curtis K y cols. *Contraception* 75 (2007) S60-S69

** Hubacher D, Grimes DA. *Obstet Gynecol Surv* 2002; 57:120-8

** Varma R, Sinha D, Gupta JK. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2006; 125:9-28

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS RECUPERACION DE LA FERTILIDAD

Después del retiro del DIU, la tasa de embarazo por 100 mujeres es alrededor de:

80 a los 12 meses

90 a los 2 años

semejante a las tasas de embarazo de mujeres que no han usado anticoncepción o que discontinúan píldoras anticonceptivas.

Sivin I y col. Am J Obstet Gynecol 166:1208, 1992.

DIU Y CÁNCER

- **Se encontró una disminución en el riesgo de cáncer de endometrio en usuarias de DIU* en nueve estudios de casos y controles :**

**OR combinada ajustada 0,6
(IC 95%=0,4-0,7).**

- **No se encontró asociación entre uso de DIU y otros tipos de cáncer.**

*** Con cobre o no especificado**


Curtis K y cols. Contraception 75 (2007) S60-S69

DIU Y SANGRADO UTERINO

Los DIU con levonorgestrel reducen el sangrado uterino y son una alternativa para mujeres que quieren usar un DIU y tienen sangrados excesivos con los DIU con cobre.



Patrones de sangrado en usuarias de DIU-LNG 13,5 mg vs 52 mg



DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS CON COBRE

TASA DE EVENTOS DE SALUD¹

EVENTO	DIU	NORPLANT
Hipertensión		
clínica	0,4	0,7
límite	0,3	0,6
Migraña/cefalea	2,1	11,5
Alteraciones psíquicas	1,2	2,8

¹ Por 1000 años-mujer

La incidencia de estos eventos es menor en las usuarias de DIU

Postmarketing Surveillance of NORPLANT, WHO / HRP. Contraception 63:167, 2001.

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

EFECTOS ADVERSOS

La inserción y uso de un DIU puede asociarse a:

- **Infecciones, especialmente en el primer mes pos inserción o si se produce un embarazo con el DIU in situ**
- **Expulsión (parcial o completa; advertida o no)**
- **Una inserción inadecuada puede producir una perforación uterina**
- **Dolor**

Farley y col. Lancet 339:785, 1992; Sivin I y cols. Contraception 42:361, 1990; Postmarketing Surveillance of NORPLANT, WHO / HRP. Contraception 63:167, 2001. Rowe y cols. Contraception 93 498-506, 2016; Heinemann y cols. Contraception 91 274–279, 2015

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

EFECTOS ADVERSOS

DIU con cobre: su uso puede asociarse a:

- **Sangrados excesivos o irregulares o más dolorosos**

DIU con levonorgestrel: su uso puede asociarse a:

- **Alteración del patrón de sangrado**
- **Quistes funcionales ováricos**
- **Acné o aumento de vello en áreas dependientes de andrógenos**

Rowe y cols. Contraception 93 498-506, 2016; Gemzell-Danielsson. Fertil Steril 97(3) 616-622, 2012; Lortscher y cols. J Drugs Dermatol 15(6):670-4, 2016.

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS TASA DE INFECCIONES PELVICAS (IP)

- La tasa de incidencia de IP en usuarias de DIU varía entre **1 por 100 y 1 por 1.000 años-mujer** en diferentes estudios, significativamente mayor que en usuarias de anticoncepción hormonal.
- Las diferencias dependen de la definición usada, de los medios disponibles para diagnosticar IP y de la población estudiada.

Factores que modifican el riesgo de presentar una IP, tanto en las usuarias de DIU como en las no usuarias:

- Número de parejas sexuales de la mujer y de su/s compañero/s
- Prevalencia de ETS en la comunidad
- Edad de la mujer

ETS: enfermedad transmisible por vía sexual diagnosticada

Meirik O. Contraception 75 (2007) S41–S47

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS TASA DE INFECCIONES PELVICAS

TIEMPO POST- INSERCION	TASA*
Todo	1,6
Primeros 20 días	9,7
Mas de 20 días	1,4

** Tasa cruda por 1000 años-mujer*

Farley y col. Lancet 339:785, 1992

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS TASA DE INFECCIONES PÉLVICAS

El riesgo es 6 veces mayor en el primer mes después de la inserción de un DIU que en el período posterior.

Se desconoce si el riesgo de presentar una IP después del primer mes de inserción del DIU es mayor en las usuarias que en las no usuarias de DIU; sin embargo, si es mayor, el incremento sería pequeño.

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS CON COBRE

TASA DE EVENTOS DEL TRACTO GENITAL¹

EVENTO	DIU	NORPLANT
Cervicitis	4,3	2,5
Vaginitis	22,1	14,5
Leucorrea	3,1	1,7
Dismenorrea	3,3	1,5
Dolor/otros	1,1	0,5

¹ *Por 1000 años-mujer*

La incidencia de estos eventos es mayor en las usuarias de DIU

Postmarketing Surveillance of NORPLANT, WHO / HRP. Contraception 63:167, 2001.

COMPARACIÓN ENTRE T-CU Y T-LNG

TASAS ACUMULADAS DE TERMINACION A LOS 5 AÑOS

RAZON	DIU	
	T-Cu 380Ag	T LNG-52 mg
Embarazo	1,4	1,1
Expulsión	7,4	11,8*
Amenorrea	0,4	19,7*
Sangrado / dolor	23,3	15,4*
Otras médicas	16,2	16,6
Deseo de embarazo	23,5	25,9
Otras personales	9,4	9,5
Continuación	40,6	33,0
No. de mujeres	1.121	1.124
Años - mujer	3.189	2.912

* *Diferencia estadísticamente significativa*

COMPARACIÓN ENTRE DIU CON CU Y DIU CON LNG

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)



ELSEVIER



Contraception 93 (2016) 498 – 506

Contraception

Original research article

Safety and efficacy in parous women of a 52-mg levonorgestrel-medicated intrauterine device: a 7-year randomized comparative study with the TCu380A^{☆,☆☆}

Patrick Rowe^a, Tim Farley^a, Alexandre Peregoudov^a, Gilda Piaggio^b, Simone Boccard^a,
Sihem Landoulsi^c, Olav Meirik^{d,*}

for the IUD Research Group of the UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of
Research; Development and Research Training in Human Reproduction¹

^aUNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, Geneva, Switzerland

^bMedical Statistics Department, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK

^cDepartment of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland

^dInstituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), Santiago, Chile

Received 16 February 2016; accepted 17 February 2016



IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE LA OMS


- El estudio se hizo en 20 centros en Asia, Europa, North África del Norte América del Sur (11 centros en China)
- Admisiones desde Mayo 1993 a Oct 1998.

Grupo	T-LNG 52 mg	TCu380A
Mujeres asignadas	1.922	1.914
Fallas inserción	12	3
Seguimiento	1.884	1.871
Completaron 7 años	398 (21%)	682 (36%)
Mujeres chinas	79%	81%




EMBARAZOS

Tasa por 100





RETIROS DEL DIU

Tasa por 100




RETIROS DEL DIU POR AMENOREA




Rowe y cols. *Contraception* 93: 498-506, 2016.

RETIROS DEL DIU POR SANGRADO EXCESIVO

Tasa por 100



Tasa por 100



Rowe y cols. *Contraception* 93: 498-506, 2016.

COMPARACIÓN DE DATOS CLÍNICOS

T-LNG 13,5 MG vs T-LNG 52 MG

T-LNG 13,5 mg

Solo indicación anticonceptiva

Altamente efectivo durante 3 años

0,9 % falla acumulativa en 3 años

5,9 % de quistes ováricos funcionales*

12,7 % usuarias en amenorrea *

Eventos adversos similares

Inserción fácil 94,0 % *

Dolor inserción no más que ligero 72,3 % *

T-LNG 52 mg

Anticoncepción, SUA y protección TRH

Altamente efectivo durante 5 años

0,7% falla acumulativa en 5 años

22 % de quistes ováricos funcionales *

23,6 % de usuarias en amenorrea *

Eventos adversos similares

Inserción fácil 86,2 % *

Dolor inserción no más que ligero 57,9 % *

SUA: Sangrados uterinos anormales

TRH: Terapia de reemplazo hormonal

*Diferencia significativa en estudio Fase II.

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

LIMITACIONES PARA EL USO

Se requiere:

- **Un/a profesional de salud capacitado/a para su inserción y extracción**
- **Examen ginecológico previo**
- **Evaluación del riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS)**

Su uso no es controlado por la mujer quien depende de un/a proveedor/a para su inserción y extracción.



DIU Y RIESGO DE ITS Y VIH

- **Los DIU no protegen contra las infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH.**
- **Sólo el condón masculino protege en forma efectiva.**



RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL USO DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

Criteria Médicos de Elegibilidad (CME) y Recomendaciones sobre Practicas Seleccionadas (RPS) para el Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
www.who.int.reproductive-health.



CATEGORIAS USADAS EN CONSENSO

Si una condición se clasifica en:

- **Categoría 1: No hay limitaciones para el uso del método**
- **Categoría 2: Las ventajas de usar el método superan los posibles riesgos**
- **Categoría 3: Los posibles riesgos superan las ventajas de usar el método**
- **Categoría 4: El uso del método representa un riesgo inaceptable para la salud**

CATEGORIA 4 PARA LOS DIU

No debe usarse un DIU:

- **Embarazo en curso**
- **Aborto séptico y sepsis puerperal reciente**
- **Enfermedad inflamatoria pélvica activa (categoría 4 para inicio y 2 para continuación)**
- **Cervicitis purulenta, o infección por clamidia o gonorrea (categoría 4 para inicio y 2 para continuación)**



CATEGORIA 4 PARA LOS DIU

No debe usarse un DIU:

- **Cáncer endometrial (categoría 4 para inicio y 2 para continuación)**
- **Cáncer cervical (categoría 4 para inicio y 2 para continuación)**
- **Anormalidades severas de la cavidad uterina o fibromas que la distorsionen**



CATEGORIA 4 PARA LOS DIU

No debe usarse un DIU:

- **Sangrado vaginal anormal que sugiere una patología importante (categoría 4 para inicio y 2 para continuación)**
- **Enfermedad trofoblástica maligna**
- **Tuberculosis pélvica**



CATEGORIA 3 PARA LOS DIU

Sólo puede usarse un DIU si no hay alternativa y bajo estricta vigilancia médica:

- **Cáncer del ovario**
- **Enfermedad clínica por VIH severa o avanzada (categorías 3 y 4 de la OMS) (categoría 3 para inicio y 2 para continuación)**
- **El riesgo de ITS y el uso de terapia antiretroviral pueden estar en categoría 3 o 2 por lo que hay que usar criterio clínico de evaluación**



CATEGORIA 3 PARA LOS DIU

Sólo puede usarse un DIU si no hay alternativa y bajo estricta vigilancia médica:

- **Intervalo entre las 48 horas y las primeras 4 semanas después del parto**
- **Enfermedad trofoblástica benigna**
- **Casos de violación con riesgo de infección**



CATEGORIA 2 PARA LOS DIU

Situaciones que requieren manejo especial (ejemplos):

- **Mujeres menores de 20 años o nuligestas, por mayor riesgo de expulsión del DIU y de infecciones pélvicas**
- **Posparto inmediato (24 horas)**
- **Portadoras de cardiopatía valvular (riesgo de endocarditis bacteriana)**



CATEGORIA 2 PARA LOS DIU

Situaciones que requieren manejo especial (ejemplos):

- **Vaginitis por tricomonas o vaginosis bacteriana**
- **Otras ITS (hepatitis)**
- **VIH (o riesgo de infección)**
- **SIDA en terapia**



CATEGORIA 2 PARA LOS DIU

Situaciones que requieren manejo especial (ejemplos):

- **Endometriosis**
- **Historia de infección pelviana sin embarazo posterior**
- **Dismenorrea severa**
- **Anemia (no se aplica a T-LNG)**
- **Otras anomalías de cavidad uterina**



CATEGORIAS PARA DIU CON LEVONORGESTREL

Se aplican las mismas categorías que para los DIU con cobre más las categorías de los anticonceptivos hormonales de progestágeno solo.



CATEGORÍA 4 PARA DIU CON LEVONORGESTREL

- **Cáncer de mama actual**



CATEGORÍA 3 PARA DIU CON LEVONORGESTREL

- **Trombosis venosa profunda actual**
- **Embolía pulmonar actual**
- **Antecedente de cáncer de mama**



CATEGORÍA 3 PARA DIU CON LEVONORGESTREL

- **Cirrosis descompensada**
- **Tumores hepáticos: adenoma hepatocelular; hepatoma (maligno)**
- **Migraña con aura si aparece durante el uso del método (categoría 2 para inicio y 3 para continuación)**
- **Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos (+) o si se desconoce la presencia de estos**



CATEGORIA 3 PARA LOS DIU LNG

- **TVP/TP aguda**
- **Cardiopatía isquémica (enfermedad actual o historia)**
(categoría 2 para inicio y 3 para continuación)
- **Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos anti fosfolípidos positivos o valor desconocido**
- **Cáncer de mama pasado y sin evidencia de enfermedad activa durante 5 años**

TVP: trombosis venosa profunda

TP: trombosis pulmonar



CATEGORIA 3 PARA LOS DIU LNG

Sólo puede usarse un DIU LNG si no hay alternativa y bajo estricta vigilancia médica:

- **Cirrosis grave descompensada**
- **Tumores del hígado benignos (adenoma hepatocelular)**
- **Tumores del hígado maligno (hepatoma)**



CONDICIÓN	AOC/PAC/AVC	AIC	AOPS	AMPD EN-NET	Implantes de LNG/ETG	DIU-Cu		DIU-LNG	
I=Inicio, C=Continuación, LM=Lactancia materna, NA=No aplica									
Neoplasia intraepitelial cervical	2	2	1	2	2	1		2	
CÁNCER CERVICAL (en espera de tratamiento)	2	2	1	2	2	I	C	I	C
						4	2	4	2
ENFERMEDADES DE LA MAMA									
d)Cáncer de mama									
(i) actual	4	4	4	4	4	1		4	
(ii) pasado y sin evidencia de enfermedad activa durante 5 años	3	3	3	3	3	1		3	
CÁNCER DE ENDOMETRIO	1	1	1	1	1	I	C	I	C
						4	2	4	2
CÁNCER DE OVARIO	1	1	1	1	1	I	C	I	C
						3	2	3	2
FIBROMAS UTERINOS									
b) Con distorsión de la cavidad uterina	1	1	1	1	1	4		4	
ANOMALÍAS ANATÓMICAS									
a) Distorsionan la cavidad uterina						4		4	
b) No distorsionan la						2		2	

CONCLUSIONES




- **Los dispositivos intrauterinos son métodos anticonceptivos seguros y eficaces.**
- **Pueden usarlos la mayoría de las mujeres.**
- **Es necesario hacer una buena evaluación de las potenciales usuarias para:**
 - **descartar contraindicaciones y factores de riesgo (categorías 4 y 3)**
 - **evaluar situaciones especiales (categoría 2)**

CONCLUSIONES

- **Una correcta técnica de inserción permite reducir el riesgo de infecciones y perforación**
- **La calidad de los servicios influye en las tasas de continuación y en la satisfacción de las usuarias.**

PARA EL USO SEGURO DE LOS DIU SE DEBEN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE:

- **Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile 2017** www.minsal.cl
- **Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS** www.who.int.reproductive-health



Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl