

ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA DURACIÓN

Dras. Soledad Díaz y María José Miranda
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
2018



ANTICONCEPTIVOS DE LARGA DURACIÓN: SIGLAS USADAS

ARLD: Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración

ARAP: Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada

LARC: Long Acting Reversible Contraceptives

ANTICONCEPTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES EN CHILE

- **DIU con cobre (T-Cu > 300 mm)**
- **DIU con levonorgestrel (T-LNG 20, T-LNG 6)**
- **Implantes subdérmicos de levonorgestrel**
- **Implantes subdérmicos de etonorgestrel**

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- **Larga duración (3 años y más)**
- **Reversibles**
- **Muy efectivos**
- **Seguros**
- **Costo-efectivos**

CARACTERISTICAS COMUNES

- **Apropiados para la mayoría de las mujeres, especialmente cuando los estrógenos están contraindicados**
- **Pueden usarse en lactancia**
- **Criterios Médicos de Elegibilidad similares, con diferencias según la vía de administración.**

IMPLANTES SUBDÉRMICOS DE PROGESTÁGENO SOLO

Jadelle® y Sinoplant *:

- Dos cilindros sólidos de 43 mm de largo, cada uno contiene 75 mg de levonorgestrel.
- Liberan alrededor de 70 mcg diarios de LNG en el primer año de uso y 30 mcg por día posteriormente



Implanon®:

- Un cilindro de 4 centímetros que contiene 68 mg de etonogestrel.
- Entrega 40 mcg al día del esteroide.



•Jadelle y Sinoplant han reemplazado a Norplant y son equivalentes en cuanto a liberación de LNG, eficacia anticonceptiva y efectos clínicos en los primeros años de uso

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

➤ Liberadores de cobre:


T con cobre 380A (T-Cu)

Multiload 375 ®;

Nova T ®

Flexi-T 300 ®

GyneFix ®



➤ Liberadores de Levonorgestrel (LNG):

T-LNG-20 (Mirena®), contiene 52 mg de LNG)

T-LNG-6 (Jaydess®, contiene 13,5 mg de LNG)

LevoNova (LNG-20)


DIU LIBERADOR DE COBRE

T con Cobre:

Tiene un marco de polietileno en forma de T, con aproximadamente 176 mg de alambre de cobre en el eje vertical y 2 collares de cobre en el eje horizontal con aproximadamente 66,5 mg cada uno. La superficie total de cobre es de $380 \text{ mm}^2 \pm 23 \text{ mm}^2$.




DIU-LNG 13,5 mg vs DIU-LNG 52 mg



JAYDESS®

- 13,5 mg
- Tamaño 28 x 30 mm
- Tubo de inserción de menor diámetro (3,8 mm)
- Menores niveles séricos de LNG ~ 160 pg/ml
- Anillo de plata visible para evaluación ultrasónica



MIRENA®

- 52 mg
- Tamaño 32 x 32 mm
- Tubo de inserción 4,4 mm con Evoinserter®
- Niveles séricos iniciales de LNG ~ 300 pg/ml

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LARGA DURACIÓN

MÉTODO	VIDA ÚTIL SEGÚN REGISTRO (años)
JADELLE	5
SINOPLANT	4
IMPLANON	3
T-Cu 380A	10
T-LNG-20	5
T-LNG-6	3

Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos

Más efectivo




Implantes



DIU



Esterilización
femenina



Vasectomía

Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año



Inyectables



Píldoras, anillos, parches



Método de la Amenorrea de
Lactancia- (MELA)



Condón masculino



Diafragma



Condón femenino



Métodos de abstinencia periódica



Espermicidas

Menos efectivo

Aproximadamente
30 embarazos por
cada 100 mujeres
en un año

Adaptado de WHO 2006

PORCENTAJES DE MUJERES CON EMBARAZOS NO PLANIFICADOS Y CONTINUIDAD EN 1 AÑO DE USO.

Método	Porcentaje uso perfecto	Porcentaje uso típico	Porcentaje continuidad
Ningún método	85%	85%	
Abstinencia periódica			
Calendario, ovulación, sintotérmico	3-5%	24%	47%
Métodos de barrera			
Condón masculino	2%	18%	43%
Condón femenino	5%	21%	41%
Diafragma	6%	12%	57%
Métodos hormonales			
Píldora combinada	0,30%	9%	67%
Anillo vaginal combinado	0,30%	9%	67%
Parche combinado	0,30%	9%	67%
AMPD	0,20%	6%	56%
DIU-LNG	0,20%	0,20%	80%
Implantes subdérmicos	0,05%	0,05%	84%
DIU T de CU 380	0,60%	0,80%	78%
Esterilización quirúrgica			
Femenina	0,50%	0,50%	100%
Masculina	0,10%	0,15%	100%

COMPARACIÓN ENTRE IMPLANTES



TASA ACUMULADA DE EMBARAZO A LOS 3 AÑOS DE USO




Figure 2 Survival curves with pregnancy occurrence from device insertion up to 3 years of follow-up.

DISCOTINUACIÓN DE JADELLE E IMPLANON A LOS 3 AÑOS (tasa x 100)

PROBLEMA	JADELLE	IMPLANON
Embarazo	0,4	0,4
Sangrados	12,5	16,7
Otras causas médicas	3,3	2,9
Personales (todas)	16,4	16,0

- 3 Embarazos en Jadelle, todas > 70kg
- 3 Embarazos en Implanon, una <70 kg


SÍNTOMAS DURANTE EL USO DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS (tasa x 100 a los 3 años)

PROBLEMA	JADELLE	IMPLANON
Cefalea	32	31
Mareos	19	18
Acné	19	17
Dolor pélvico	22	20
Amenorrea	15	19 *
Sangrado irregular	48	49
Sangrado excesivo	12	13
Sangrado prolongado	22	23


* p = 0,001

Bahamondes y cols. Hum Reprod 30:2527-2538, 2015.

TASAS DE CONTINUACIÓN A LOS 3 AÑOS DE USO




COMPARACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS



EMBARAZOS

Tasa por 100



RETIROS DEL DIU


Tasa por 100

◆ LNG-IUD
■ TCu380A



Tasa acumulada 7-años (95% CI)

DIU-LNG 70,6 (68,3 – 72,9)

TCu380A 40,8 (38,3 – 43,3)




RETIROS DEL DIU POR AMENORRREA




RETIROS DEL DIU POR SANGRADO EXCESIVO

Tasa por
100



Tasa por
100



DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

BENEFICIOS PARA LA SALUD

- Son altamente eficaces desde la inserción
- Tienen una duración prolongada
- No interfieren con el coito
- Hay un rápido retorno a la fecundidad después de la extracción
- No afectan la lactancia
- No hay interacción con drogas

DIU con cobre: no producen los efectos sistémicos de los anticonceptivos hormonales y son de bajo costo. Protección contra el cáncer de endometrio.

DIU con LNG: mejoría en anemia, menorragia y endometriosis, control de miomas uterinos y adenomiosis. Posible protección contra hiperplasia de endometrio.

* Curtis K y cols. *Contraception* 75 (2007) S60-S69

** Hubacher D, Grimes DA. *Obstet Gynecol Surv* 2002; 57:120-8

** Varma R, Sinha D, Gupta JK. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2006; 125:9-28

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

EFECTOS ADVERSOS

DIU con cobre: el uso puede asociarse a:

- **Sangrados excesivos o irregulares o más dolorosos**

DIU con levonorgestrel: el uso puede asociarse a:

- **Alteración del patrón de sangrado**
- **Quistes funcionales ováricos**
- **Acné o aumento de vello en áreas dependientes de andrógenos**

DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

EFECTOS ADVERSOS

La inserción de un DIU puede asociarse a:

- **Infecciones, especialmente en el primer mes pos inserción o si se produce un embarazo con el DIU in situ**
- **Expulsión (parcial o completa; advertida o no)**
- **Una inserción inadecuada puede producir una perforación uterina**
- **Dolor**

*Farley y col. Lancet 339:785, 1992; Sivin I y cols. Contraception 42:361, 1990;
Postmarketing Surveillance of NORPLANT, WHO / HRP. Contraception 63:167, 2001.
Rowe y cols. Contraception 93 498-506, 2016; Heinemann y cols. Contraception 91 274–279, 2015*

**CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD
DE LA OMS
PARA IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS Y
DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS**

CATEGORÍAS USADAS EN LOS CRITERIOS MÉDICOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS

Categoría	Con Criterio Clínico	Criterio Clínico Limitado
1	Use el método en cualquier circunstancia	SI
2	Generalmente use el método	SI
3	No se recomienda habitualmente el uso del método salvo que otros métodos apropiados no estén disponibles o no sean aceptables	NO
4	No se debe usar el método	NO

Organización Mundial de la Salud (OMS). Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos. Quinta Edición. 2015

CONDICIONES CLASIFICADAS EN CATEGORÍA 4

DIU T CU

- Embarazo en curso
- Sepsis puerperal o aborto séptico recientes.
- Cáncer endometrial/cervical
- Enf. trofoblástica maligna
- Distorsión severa de cavidad uterina
- EIP activa
- Cervicitis purulenta o ITS activa
- TBC pélvica conocida
- Sangrado etiología desconocida

IMPLANTES

- Cáncer de Mama actual

DIU-LNG

- DIU + Implantes

Organización Mundial de la Salud (OMS). Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos. Quinta Edición. 2015

CONDICIONES CLASIFICADAS EN CATEGORÍA 3

DIU T CU

- Enf. trofoblástica benigna
- SIDA (2 o 3)
- Cáncer ovario
- Intervalo 48 hrs- 4 semanas posparto
- Alto riesgo ITS (2 o 3)

IMPLANTES

- TEV/TEP actual
- Historia de Cáncer Mama
- Hepatitis viral activa
- Cirrosis descompensada
- Tumores hepáticos
- Sangrado de etiología desconocida
- LES con anticuerpos antifosfolípidos + o desconocidos
- Migraña con aura, cardiopatía isquémica y accidente vascular cerebral (si aparecen durante el uso del método)

DIU-LNG

- DIU + Implantes

Organización Mundial de la Salud (OMS). Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos. Quinta Edición. 2015

Tabla C.2. Resumen de los Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Anticonceptivos Hormonales y DIU (ejemplo)
Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, 2017

CONDICIÓN	AOC/PAC/AVC	AIC	AOPS	AMPD EN-NET	Implantes de LNG/ETG	DIU-Cu	DIU-LNG
I=Inicio, C=Continuación, LM=Lactancia materna, NA=No aplica							
CARACTERÍSTICAS PERSONALES E HISTORIA REPRODUCTIVA							
EMBARAZO	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	4*	4*
EDAD	Menarquia a <40=1	Menarquia a <40=1	Menarquia a <18=1	Menarquia a <18=2	Menarquia a <18=1	Menarquia a <20=2	Menarquia a <20=2
	≥40=2	≥40=2	18-45=1	18-45=1	18-45=1	≥20=1	≥20=1
			>45=1	>45=2	>45=1		
			>45=1	>45=2	>45=1		
PARIDAD							
a) Nulípara	1	1	1	1	1	2	2
b) Mujeres que han tenido 1 o más partos	1	1	1	1	1	1	1
LACTANCIA MATERNA							
a) < 6 semanas posparto	4	4	2*	3*	2*		
b) 6 semanas a < 6 meses (principalmente con lactancia materna)	3	3	1	1	1		
c) > 6 meses posparto	2	2	1	1	1		




ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA DURACIÓN: ¿PARA QUIÉN?

Para cualquier mujer que los solicite, si está en categoría 1 o 2 de los Criterios Médicos de Elegibilidad. Especialmente:

- **Cuando se requiere un método reversible de alta eficacia**
- **Cuando el embarazo es un riesgo para la salud**
- **Cuando la consistencia en el uso del anticonceptivo es difícil**
- **Cuando hay contraindicación para el uso de estrógenos**

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ANTICONCEPTIVOS REVERSIBLES DE LARGA DURACIÓN

- **Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud 2017** www.minsal.cl
- **Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Practicas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS** www.who.int.reproductive-health



Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl