

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

Dr. David Eisen, Dra. Soledad Díaz
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
2016

ICMER



CONTENIDOS DE ESTA PRESENTACIÓN

- **ASPECTOS GENERALES Y DE SERVICIOS**
- **DESCRIPCIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA FEMENINA**
- **DESCRIPCIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA MASCULINA**
- **RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) PARA EL USO DE ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA**

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

La Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) se refiere a los procedimientos de esterilización femenina y masculina. Ambos son métodos irreversibles y de alta eficacia usados por millones de parejas en el mundo.

Proporción de mujeres y hombres esterilizados en relación a total de usuarias/os de anticonceptivos

	Mujeres	Hombres
Ámbito mundial	18,9	2,4
Latinoamérica	25,9	2,3

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

La esterilización quirúrgica femenina (AQV femenina) consiste en la oclusión bilateral de las trompas de Falopio por ligadura, corte, sección, cauterización, o colocación de anillos, clips, grapas o dispositivos intratubarios.

La esterilización quirúrgica masculina (AQV masculina) o vasectomía consiste en la sección y obstrucción de los conductos deferentes por medios quirúrgicos. La vasectomía es más sencilla, tiene menos riesgos y es menos costosa que la AQV femenina.

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

TASAS DE EMBARAZO EN EL PRIMER AÑO

Método	Tasa más baja observada ^a	Tasa en uso típico ^b
<hr/>		
Esterilización		
femenina	0.5	0.5
masculina	0.1	0.15

^a Basado en el número de embarazos observado en 100 usuarias que usan el método en forma correcta y consistente durante un año

^b Basado en el número de embarazos observado en 100 usuarias que usan el método en forma típica

Adaptado de Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud, 2005.

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA MECANISMO DE ACCIÓN

Al ocluir las trompas de Fallopio o al ocluir los conductos deferentes se impide el encuentro entre el ovocito maduro (óvulo) y el espermatozoide y, por consiguiente, la fecundación.

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA POTENCIALES USUARIAS/OS

La AQV es un método al que puede acceder cualquier persona por:

- Demanda voluntaria**
- Razones médicas**
- Solicitud de terceros en casos especiales**

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA ORIENTACIÓN

- **En forma individual o en pareja**
- **Según la decisión reproductiva**
- **En el contexto de los métodos anticonceptivos alternativos disponibles**
- **Decisión libre e informada**

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA ORIENTACIÓN

Contenidos:

- **Eficacia**
- **Irreversibilidad***
- **Procedimientos**
- **Riesgos**
- **Criterios de elegibilidad**
- **Consentimiento escrito**
- * Alta improbabilidad de reversión

Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos

Más efectivo




Implantes



DIU




**Esterilización
femenina**



Vasectomía

*Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año*



Inyectables



Píldoras, anillos, parches



**Método de la Amenorrea de
Lactancia- (MELA)**



Condón masculino



Diafragma



Condón femenino



Métodos de abstinencia periódica



Espermicidas


Menos efectivo

Adaptado de WHO 2006

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA SERVICIOS


- **Estos métodos requieren de profesionales capacitados/as en los procedimientos y la evaluación médica previa de las y los potenciales usuaria/os.**
- **Por su carácter permanente, la orientación y el consentimiento informado son especialmente importantes.**
- **Deben respetarse las normas establecidas por el Ministerio de Salud de Chile y las recomendaciones de la OMS.**

DESCRIPCIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA FEMENINA



AQV FEMENINA

La esterilización femenina (AQV femenina) consiste en la oclusión bilateral de las trompas u oclusión tubaria bilateral, la que requiere un procedimiento quirúrgico en el nivel terciario de atención.




AQV FEMENINA

Procedimientos quirúrgicos:

Minilaparatomía

Laparotomía

Laparoscopia



Oclusión: Ligadura y sección, cauterización
o colocación de anillos, clips o grapas

Oportunidad: Intervalo, posparto, cesárea,
posaborto, concurrente con cirugía
abdominal o vaginal programada

AQV FEMENINA

Procedimientos quirúrgicos:

Previa anestesia local, regional o general, se puede usar una minilaparotomía suprapúbica (en intervalo) o infraumbilical (en posparto), o una laparoscopia para abordar las trompas. Una vez individualizadas, estas se ocluyen según la técnica preferida (Pomeroy, Irving, Parkland, Uchida, electrocoagulación bipolar u otra). En todos los casos se deben observar los controles y prácticas pre y post-operatorias habituales.

Engender Health. Minilaparotomy for Females Sterilization. An Illustrated Guide for Service Providers. 2003.

Eisenberg & Sciarra J. Surgical Procedures for Tubal Sterilization. 2008.

En www.engenderhealth.org.

TÉCNICA DE POMEROY PARA LA AQV FEMENINA





Fig. 4.3 Técnica de Pomeroy. Ligadura de la trompa con un hilo de sutura reabsorbible.



AQV FEMENINA

TASA ACUMULADA DE EMBARAZO EN MUJERES ENTRE 28 - 33 AÑOS DE EDAD

MÉTODO	Tasa Acumulada (por 1000 mujeres)	
	1er año	10 años
Salpingectomía parcial (intervalo)	7.5	33.5
Salpingectomía parcial (postparto)	0.0	5.6
Spring clip	21.2	31.3
Coagulación bipolar	2.6	21.3
Coagulación unipolar	0.0	15.6




Adaptado de Peterson y col. Am J Obstet Gynecol 174:1161, 1996

AQV FEMENINA: BENEFICIOS

- **Eficacia anticonceptiva**
- **Ausencia de efectos sistémicos**
- **Sin efectos sobre la función sexual**
- **Sin efecto sobre la lactancia**
- **Protección contra el cáncer de ovario**
- **Protección contra el embarazo ectópico**

Pati S y cols. *Obstet Gynecol Clin North Am* 27(4):859-99, 2000; Sanket S y cols. *The New England Journal of Medicine* 373;15, 2014. Díaz S & Meirik O. *IPPF Med Bull* 37(2):4, 2003. Gentile GP y cols. *Fertil Steril.*; 69(2):179, 1998. Amatayakul K. y cols. *Adv Contracept Off J Soc Adv Contracept.*; 7(4):363, 1991. Hankinson SE y cols. *J Am Med Assoc.*; 270(23):2813, 1993. Miracle-McMahill HL y cols. *Am J Epidemiol.*; 145(4):349, 1997. Peterson HB y cols. *N Engl J Med.*; 336(11):762, 1997.



AQV FEMENINA: EFECTOS ADVERSOS


- **Asociados al procedimiento quirúrgico (raros)**
 - Complicaciones anestésicas**
 - Trauma de las vísceras abdominales**
 - Infección**
 - Hematoma**

- **Eventual arrepentimiento en mujeres jóvenes**

www.engenderhealth.org/pubs/sterilization

Gentile GP y cols. Fertil Steril.; 69(2):179, 1998


Hillis SD y cols. Obstet Gynecol. 93(6):889-95, 1999.



ARREPENTIMIENTO Y REVERSIBILIDAD

- **Entre un 5% y 15% de las mujeres evidencian algún grado de arrepentimiento.**
- **La edad temprana es el predictor de arrepentimiento más significativo (20% de las mujeres esterilizadas a una edad joven).**
- **No más del 2% acuden a procedimientos de reversión, siendo las mujeres menores de 30 años las que con mayor frecuencia lo solicitan.**
- **El éxito de la reversión se relaciona con la longitud de la trompa remanente después de la oclusión.**
- **La técnica de re-anastomosis ístmico-ístmica tiene la mayor tasa de éxito.**

DESCRIPCIÓN DE LA ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA MASCULINA



AQV MASCULINA

La esterilización masculina (AQV masculina) o vasectomía consiste en la sección y obstrucción de los conductos deferentes por medios quirúrgicos.

La vasectomía es más sencilla, tiene menos riesgos y es menos costosa que la AQV femenina.


AQV MASCULINA

Procedimientos quirúrgicos:

Vasectomía con o sin bisturí

Oclusión: **Sección y ligadura o cauterización**

Oportunidad: **Cualquier momento**



TÉCNICA DE LA VASECTOMÍA SIN BISTURÍ

Se hace, previa anestesia local, una punción única en el rafe medio del escroto para abordar los deferentes. En ésta técnica se utilizan 2 pinzas, una pinza que termina en un anillo que fija el deferente en el rafe y una pinza de disección similar a la pinza mosquito curva puntiaguda que punciona el escroto y disecciona los deferentes, preservando la arteria deferencial. Se secciona de 1 a 1.5 cm del conducto deferente, se liga y se realiza interposición de fascia entre los dos extremos de los deferentes seccionados y ligados. Ésta técnica disminuye la posibilidad de hemorragia, es menos traumática y no requiere de suturas en la piel escrotal. Es menos dolorosa y se reporta alta tasa de satisfacción de los usuarios.

TÉCNICA DE LA VASECTOMÍA CONVENCIONAL

Se realizan dos incisiones escrotales, se expone, aísla y secciona de 1 a 1.5 cm del conducto deferente de cada lado, se realiza ligadura de cada extremo con sutura no absorbible usando electrocoagulación para sellar el conducto previamente ligado, y se realiza interposición de fascia entre los dos extremos de los deferentes seccionados y ligados cerrando finalmente la incisión escrotal.


EFICACIA ANTICONCEPTIVA DE LA AQV MASCULINA

Es uno de los métodos anticonceptivos más efectivos, con tasas de falla en el primer año de 0.1 a 0.2 por cada 100 mujeres, parejas de los hombres vasectomizados.

Tiene una eficacia retardada y se requieren tres meses para la depleción completa de espermatozoides en la mayoría de los hombres, durante los cuales la pareja debe usar otro método anticonceptivo.

AQV MASCULINA: BENEFICIOS

- **Eficacia anticonceptiva**
- **Ausencia de efectos sistémicos**
- **Sin efectos sobre la función sexual**
- **Puede realizarse en forma ambulatoria**



AQV MASCULINA

Efectos adversos:


**Asociados al procedimiento quirúrgico (raros):
Infección – Hematoma – Dolor crónico**

Limitaciones:

Efecto retardado:

Efectiva después de 3 meses

Se recomienda control con espermiograma *



* WHO/OMS. Recomendaciones Sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos. Ginebra, 2005. w.who.int/reproductive-health



ARREPENTIMIENTO Y REVERSIBILIDAD

- **Se estima que hasta el 6% de los hombres que se han sometido a una vasectomía desean una reversión y un 3,5% se la realiza (vasovasostomía).**
- **La tasa de permeabilidad a los 3 meses post reversión es de aproximadamente un 80-90%.**
- **La tasa global de embarazo es sobre el 70% si la reversión se realiza antes de 3 años de la realización de la vasectomía y 52% cuando la reversión es posterior.**

RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL USO DE ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

- **Crterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Practicas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).**

www.who.int/reproductive-health



ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA OMS

A: Aceptar: No hay razón médica para negar la AQV a mujeres u hombres con esta condición.

C: Cuidado: La AQV puede practicarse, pero con mayor preparación y precaución.

R: Retrasar: Debe esperarse para practicar la AQV hasta que la condición sea evaluada y/o corregida.

S: Condiciones especiales: Cuando están presentes ciertas condiciones, la AQV debe realizarse en un lugar adecuado, por un cirujano y equipo quirúrgico experimentado, con equipamiento suficiente para poder ofrecer anestesia general y asistencia médica posteriormente.

AQV FEMENINA: CATEGORÍA C

- Edad muy joven
- Obesidad 30 kg/m^2 de índice de masa corporal.
- Historia de hipertensión, si la presión arterial no puede evaluarse.
- Hipertensión controlada, si la presión arterial puede evaluarse.
- Hipertensión con presión arterial sistólica 140-159 o diastólica 90-99 mm Hg.
- Historia de isquemia cardíaca.
- Historia de accidente vascular cerebral.
- Valvulopatía cardíaca no complicada.
- Lupus eritomatoso sistémico.
- Epilepsia.
- Cáncer de mama actual.
- Miomas uterinos.

AQV FEMENINA: CATEGORÍA C

- Historia de enfermedad inflamatoria pelviana, sin embarazo subsiguiente.
- Cirugía previa abdominal o pélvica.
- Esquistosomiasis con fibrosis del hígado.
- Diabetes sin enfermedad vascular, sea o no insulina-dependiente.
- Cirrosis hepática compensada.
- Tumores hepáticos benignos y malignos.
- Anemia ferropriiva (Hb 7 a 10 g/dl), talasemia, anemia falciforme.
- Hernia diafragmática (para laparoscopia).
- Enfermedad renal.
- Deficiencia nutricional severa.
- Esterilización concurrente con cirugía electiva.
- Desórdenes depresivos.

AQV FEMENINA: CATEGORÍA R

- Embarazo (posible o comprobado).
- Posparto entre 7 y 42 días.
- Enfermedad tromboembólica actual.
- Cirugía mayor con inmovilización prolongada.
- Isquemia cardíaca actual.
- Sangrado vaginal no explicado, antes de su evaluación.
- Enfermedad trofoblástica gestacional maligna.
- Cáncer cervical en espera de terapia.
- Cáncer endometrial.
- Cáncer de ovario.

AQV FEMENINA: CATEGORÍA R

- Infección pélvica activa.
- ITS activa, incluyendo cervicitis purulenta.
- Enfermedad actual de la vesícula biliar.
- Hepatitis viral activa.
- Anemia con Hb < 7g/dl.
- Infecciones de la piel abdominal.
- Infección sistémica, respiratoria o gastrointestinal aguda.
- Esterilización concurrente con cirugía de emergencia o condición infecciosa.

AQV FEMENINA: CATEGORÍA R

Posparto inmediato

- Preclampsia, eclampsia.
- Ruptura prolongada de membranas 24 hrs.
- Sepsis puerperal, fiebre en el parto o puerperal.
- Hemorragia severa antes o después del parto.
- Trauma severo del tracto genital.

Posaborto

- Sepsis o fiebre.
- Hemorragia severa.
- Trauma severo del tracto genital.
- Hematometra aguda.

AQV FEMENINA: CATEGORÍA E

- Perforación o rotura uterina después de un parto o un aborto.
- Múltiples factores de riesgo para patología cardiovascular arterial.
- Hipertensión con presión arterial sistólica ≥ 160 o diastólica ≥ 100 mmHg.
- Hipertensión con enfermedad vascular.
- TVP/EP con terapia anticoagulante.
- Valvulopatía cardíaca no complicada.
- Lupus eritomatoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos (o valor desconocido), trombocitopenia severa o tratamiento inmunosupresor.

AQV FEMENINA: CATEGORÍA E

- Endometriosis.
- SIDA.
- Tuberculosis pélvica.
- Desórdenes de la coagulación.
- Diabetes con nefropatía / retinopatía / neuropatía; con enfermedad vascular o de más de 20 años de evolución.
- Hipertiroidismo.
- Cirrosis hepática severa descompensada.
- Enfermedades respiratorias crónicas: asma, bronquitis, enfisema, infección pulmonar.
- Útero fijo por cirugía o infección previa.
- Hernia de la pared abdominal o hernia inguinal.

AQV MASCULINA: CATEGORÍA C

- **Edad muy joven.**
- **Lesión previa del escroto.**
- **Varicocele grande.**
- **Hidrocele grande.**
- **Criptorquidia.**
- **Diabetes.**
- **Desórdenes depresivos.**

AQV MASCULINA: CATEGORÍA R

- **Infección local en la piel del escroto, balanitis, epididimitis, orquitis.**
- **Infección de transmisión sexual activa.**
- **Infección sistémica o gastroenteritis.**
- **Filariasis; elefantiasis.**
- **Tumor intraescrotal.**

AQV MASCULINA: CATEGORÍA E

- **Hernia inguinal.**
- **Trastornos de la coagulación.**
- **SIDA con tratamiento antirretroviral.**

Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl