

# ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA CON LEVONORGESTREL: EFICACIA Y MECANISMO DE ACCIÓN

ME Ortiz, S Díaz, HB Croxatto

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva

2016



ICMER

## *¿Que es la Anticoncepción de Emergencia (AE)?*

- Es el **único** método anticonceptivo que la mujeres pueden usar para prevenir un embarazo no deseado, después de una relación sexual sin protección.
- Sirve solamente en esta situación de emergencia y no como método anticonceptivo de uso regular.
- Debe considerarse como una alternativa de uso ocasional.

## ***¿En qué situaciones se usa la Anticoncepción de Emergencia?***

- En el caso de una relación sin uso de método anticonceptivo.
- En el caso de una relación sexual usando un anticonceptivo pero se usó en forma incorrecta u ocurrió un accidente con éste.
- Para prevenir embarazo en casos de violación.


# ***Qué es el levonorgestrel (LNG)***

El levonorgestrel (LNG) es un esteroide sintético derivado de la 19-nortestosterona, que actuando a través del receptor de la progesterona imita los efectos de la hormona natural, por lo que se clasifica como agonista o progestina.

# ¿Cómo se usan las píldoras de anticoncepción de emergencia con levonorgestrel (PAE LNG)?

Algunos productos registrados, en cada envase, traen dos píldoras que contienen 0.75 miligramos de levonorgestrel cada una o, una píldora que contiene 1.5 miligramos de levonorgestrel

*Se pueden tomar*




**Lo importante es tomar 1.5 mg de levonorgestrel lo antes posible, en un plazo no mayor de 120 horas (5 días) después de la relación sexual no protegida.**

# *Cuando las PAE LNG no están disponibles ¿Hay productos alternativos?*

**Sí**, las píldoras anticonceptivas de uso regular que contienen solamente levonorgestrel tales como Levonorgestrel LCh o Microval, pueden reemplazar al producto dedicado. Dado que estas píldoras contienen una cantidad pequeña de levonorgestrel, **se debe completar la dosis total de 1.5 mg para que actúen como anticonceptivo de emergencia.**

**Ejemplo: Si cada pastilla contiene 0.03 mg de levonorgestrel, hay que tomar dos veces 25 pastillas**



***EFICACIA DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA CON LNG***



# *¿Cuán eficaz son las PAE para prevenir el embarazo?*

La eficacia se ha expresado


- Como porcentaje de embarazos evitados, siendo el 100% el número de embarazos que **se estima** habrían ocurrido si no se usa el método.
- Como tasa de embarazo por 100 mujeres.

# ¿Cuál es la **eficacia anticonceptiva** estimada de las PAE en el uso habitual?


De **100** mujeres que tienen una sola relación sexual sin anticoncepción **en la 2<sup>a</sup> ó 3<sup>a</sup> semana del ciclo menstrual**



**8** mujeres se embarazarían **si no usan** anticoncepción de emergencia (8%).



**2** mujeres se embarazarían **si usan** anticoncepción de emergencia



Así, se embaraza el 25% de las mujeres (2 de 8) lo que significa que las PAE evitarían el embarazo solamente en el 75% de los casos (6 de 8).

Si estas mismas 100 mujeres usaran anticoncepción hormonal regular durante todo un año, se embarazaría entre el 1 y el 8% de los casos (1 a 8 de 100).

## *Eficacia estimada del LNG administrado como anticonceptivo de emergencia*

| Autores  | Mujeres número    | Intervalo coito – LNG horas  | Eficacia %                            |
|--|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ho, Kwan. Hum Reprod 8:389, 1993.                    | 331               | ≤ 48                         | <b>60</b>                             |
| WHO, Lancet 352:428, 1998.                           | 450<br>338<br>187 | ↓ ≤ 24<br>25 - 48<br>49 - 72 | ↓ <b>95</b><br><b>85</b><br><b>58</b> |
| WHO, Lancet 360:1803, 2002.<br>(dos dosis de 0.75mg) | 1183<br>164       | ≤ 72<br>96 - 120             | <b>79</b><br><b>60</b>                |
| WHO, Lancet 360:1803, 2002.<br>(una dosis de 1.5mg)  | 1198<br>150       | ≤ 72<br>96 - 120             | <b>84</b><br><b>63</b>                |
| Hamoda et al. Obstet Gynecol 104:1307, 2004.         | 966               | 0 - 72                       | <b>64</b>                             |

*Eficacia estimada del LNG administrado como anticonceptivo de emergencia según el intervalo entre coito y uso en cuatro estudios de la OMS*


| Intervalo coito-LNG (h) | Embarazos (n) | Mujeres (n) | Tasa embarazo % | RR (IC 95%)       |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 0-24                    | 32            | 3054        | <b>1.0</b>      | 1 (Ref)           |
| 25-48                   | 14            | 2065        | <b>0.7</b>      | 0.68 (0.36-1.28)  |
| 49-72                   | 17            | 1059        | <b>1.6</b>      | 1.74 (0.94-3.19)  |
| 73-96                   | 3             | 386         | <b>0.8</b>      | 0.87 (0.26-2.89)  |
| 97-120                  | 12            | 230         | <b>5.2</b>      | 5.81 (2.87-11.76) |
| Todos                   | 76            | 6794        | <b>1.1</b>      |                   |

## *Asignación del riesgo de embarazo para calcular la eficacia de las PAE*

Para calcular la eficacia de las PAE, la estimación se basa en la fecha en qué podría ocurrir o haber ocurrido la ovulación en ese ciclo. Para ello:

- Se considera la duración promedio de los ciclos menstruales previos de la mujer.
- A partir de ese dato **se estima** la fecha probable de su próxima menstruación.
- A esa fecha se le restan 14 días, que es la duración promedio de la fase lútea.
- **Se presume** que la fecha resultante corresponde a la fecha probable de la ovulación en ese ciclo.
- Al intervalo coito-ovulación obtenido de este modo, se le asigna la probabilidad de embarazo que indica la tabla de Wilcox.

# *Fertilidad basal de la especie humana*



En resumen, la probabilidad de embarazo en un ciclo menstrual es de 5-30%

# Probabilidad de concepción y embarazo después de un coito único

| Día de la relación sexual | Probabilidad %          |                               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                           | Concepción <sup>1</sup> | Embarazo Clínico <sup>2</sup> |
| -6                        | 0                       | 0                             |
| -5                        | 8                       | 0                             |
| -4                        | 17                      | 13                            |
| -3                        | 8                       | 8                             |
| -2                        | 36                      | 29                            |
| -1                        | 34                      | 27                            |
| 0 (ovulación)             | 36                      | 8                             |
| +1                        | 0                       | 0                             |
| +2                        | 0                       | 0                             |
| +3                        | 0                       | 0                             |
| +4                        | 0                       | 0                             |
| +5                        | 0                       | 0                             |



221 parejas  129 ciclos

Tabla de Wilcox: Wilcox et al NEJM 333:1517,1995; Human Reprod, 13:394, 1998

<sup>1</sup> Casos en los que se detectó hCG en la orina, <sup>2</sup> Casos que evolucionaron a embarazo clínico.

## *Asignación del riesgo de embarazo*



Probabilidad de embarazo  
según tabla de Wilcox


## *Errores de la estimación de la eficacia*

Los métodos usados para estimar la eficacia anticonceptiva de las PAE conducen a sobrestimar la proporción de embarazos que se previenen, al presumir erróneamente un mayor número de mujeres expuestas al riesgo de embarazo que el número real.

## *Errores de la estimación de la eficacia*


- La duración del ciclo en que se usaron las PAE se estimó de acuerdo a la duración del ciclo menstrual previo.
- La duración de los ciclos menstruales previos es muy inexacta para predecir la duración del ciclo siguiente.
- No todas las mujeres que han usado las PAE tienen espermatozoides en la vagina y/o endocervix

# ¿En qué días del ciclo menstrual ocurre la ovulación?



En un ciclo normal, la ovulación puede ocurrir en cualquier día del ciclo, desde el día 10 al día 21 y en sólo 9 de cada 100 veces una mujer ovula en el mismo día en dos ciclos menstruales consecutivos.

## *Días del ciclo menstrual en que ocurre la ovulación*



# *Exposición seminal entre mujeres que solicitan anticoncepción de emergencia*

**Objetivo:** Determinar el número de espermatozoides presentes en la vagina y/o endocervix de mujeres que solicitaron anticoncepción de emergencia después de un coito no protegido o por deslizamiento o ruptura del condón

| <u>Observaciones durante primeras seis horas</u>                | <b>N°</b> | <b>%</b>    |
|---|-----------|-------------|
| Mujeres que solicitaron anticoncepción de emergencia (tratadas) | <b>69</b> | <b>100</b>  |
| Mujeres tratadas sin espermatozoides                            | <b>25</b> | <b>36.2</b> |
| Mujeres tratadas con espermatozoides                            | <b>44</b> | <b>63.8</b> |
| <hr/>   |           |             |
| Mujeres que deseaban embarazarse (controles)                    | <b>20</b> | <b>100</b>  |
| Mujeres controles sin espermatozoides                           | <b>0</b>  | <b>0</b>    |
| Mujeres controles* con espermatozoides                          | <b>20</b> | <b>100</b>  |

\* En las mujeres controles, la cantidad de espermatozoides fue significativamente mayor que en las tratadas en las que no se encontraron espermatozoides

## *Eficacia de las PAE: conclusión*


- Afirmación errónea: “Las PAE previenen más embarazos de los que evitarían si actuaran sólo antes de la ovulación”.
- La estimación de la eficacia de la AE basada en la longitud del ciclo menstrual previo no es correcta.
- Los datos demuestran que muchas mujeres no están expuestas al embarazo ya sea porque sus relaciones fueron fuera del período fértil o porque no habían espermatozoides.

***MECANISMO DE ACCION DE LA  
AE CON LNG***

*Para que ocurra la generación de un nuevo individuo tienen que producirse ciertos procesos.*


*Destacaremos los que son más relevantes para comprender **el mecanismo de acción** de la AE con levonorgestrel*


# *Tiene que haber una relación sexual en el período fértil*



Un coito puede generar un embarazo cuando ocurre en el día de la ovulación ó en cualquiera de los 5 días que la preceden. A este período de 6 días se le llama período fértil del ciclo menstrual.


# Los espermatozoides tienen que llegar al sitio de la fecundación






*Tiene que producirse la ovulación para lo que es esencial que la hipófisis libere gonadotropinas y que éstas lleguen al folículo maduro.*

# Tiene que haber un ciclo menstrual normal



*La fecundación tiene que producirse durante las primeras horas después de la ovulación, cuando el ovocito aún está rodeado de un cúmulo de células foliculares.*



*Para llegar hasta el ovocito, los espermatozoides deben entrar al cúmulo de células foliculares que lo rodean, posteriormente, el ovocito se desnuda*

Espermatozoide + Ovocito maduro



Básicamente, **la fecundación** consiste en la unión **de un espermatozoide** proveniente del aparato reproductor masculino con el **ovocito maduro** de la mujer, transformándose en huevo fecundado que puede desarrollarse y posteriormente implantarse en el útero dando **inicio al embarazo**.


*Tiene que haber desarrollo embrionario previo a la implantación*




↓ Cigoto



2 células



4 células




8 células




blastocisto

## *El embrión tiene que ser transportado hasta el sitio de la implantación*




Normalmente, el embrión demora alrededor de 4 días para llegar al útero, donde permanece libre durante 2 o 3 días antes de implantarse.

# *El embrión tiene que ser transportado hasta el sitio de la implantación*



Normalmente, el embrión demora alrededor de 4 días para llegar al útero, donde permanece libre durante 2 o 3 días antes de implantarse

# *Tiene que ocurrir el rescate del cuerpo lúteo en el ciclo concepcional*



El blastocisto produce **HCG**. La HCG pasa a la sangre materna y actúa sobre el cuerpo lúteo que está en el ovario. Gracias a este estímulo, el cuerpo lúteo sigue produciendo **progesterona** que es la hormona que impide que se produzca la menstruación.

# *¿Cómo evita el embarazo el LNG administrado como AE?*

Al comenzar este siglo había tres hipótesis principales

- Impedir la migración de los espermatozoides hasta la trompa de Falopio.
- Impedir o retrasar la ovulación.
- Impedir que el huevo fecundado se implante en el útero.

Según los resultados de estudios recientes, ¿cuáles de estas hipótesis persisten como verdaderas?

# *Estudios diseñados para entender el mecanismo de acción del LNG como AE*

**Año 2000**

**Efectos sobre ascenso de los espermatozoides**  
**Kesseru 1974**

**Efecto de dosis mayores**  
**Landgren 1989; Ugocsai 2002**

## **Efectos sobre:**

### **Ovulación**

Durand 2001; Hapangama 2001; Marions 2002; Croxatto 2004; Marions 2004; Okewole 2007

### **Endometrio**


Durand 2001; Wu 2001\*  
Palomino 2003\*; Durand 2005; Vargas 2006\* Palomino, 2010

### **Implantación**

Muller, 2003; Ortiz 2004;  
Novikova, 2007; Noé 2007\*;  
Lalitkumar 2007, Noé 2010;  
Noé 2011


**\* Publicados en resúmenes de congresos científicos**

*¿Por qué las PAE pueden impedir la migración de los espermatozoides hasta la trompa de Fallopio?*



Porque el LNG que contienen torna muy viscosa la secreción del cuello del útero hasta el punto de suprimir totalmente el avance de los espermatozoides a través del moco cervical. Kesserü et al. Contraception 1974; 10:411-424.


# ¿Por qué las PAE pueden impedir o retrasar la ovulación?




Porque impiden que la hipófisis entregue a la sangre la cantidad de gonadotrofinas que se requieren para que el folículo libere al óvulo

Durand 2001; Hapangama 2001;  
Marions 2002; Croxatto 2004;  
Marions 2004; Okewole 2007


# ¿Por qué las PAE LNG pueden impedir o retrasar la ovulación?



# Mecanismo de acción de las PAE LNG




# ¿En qué momento las PAE LNG pueden interferir con la ovulación?



La ovulación se puede alterar, bloquear o postergar consistentemente, si al momento de tomar las PAE LNG, el folículo no ha crecido más allá de 17 mm. Esto se logra porque el LNG inhibe a la hipófisis, la que no entrega a la sangre la cantidad necesaria de LH para provocar la ovulación.

# ¿Qué pasa si la mujer se toma las PAE LNG después que ha ocurrido el pico pre-ovulatorio de LH?




Las PAE fallan cuando la mujer las toma muy tarde para impedir la ovulación o después que esta ocurrió.

# ¿Por qué las PAE LNG no impiden la implantación?



Las biopsias obtenidas en período receptivo de mujeres tratadas con LNG en el período periovulatorio, muestran endometrio normal o mínimos cambios en parámetros morfológicos y moleculares en comparación con las obtenidas en ciclos controles de las mismas mujeres

*Durand 2001; Palomino 2003; Durand 2005; Vargas 2006;  
Palomino, 2010*



Porque el LNG **no** interfiere con la preparación del endometrio para recibir al embrión en desarrollo

# *Efectos de LNG y YUZPE sobre el endometrio durante la ventana de implantación*

## **Morfológicos**

Desarrollo cronológico  
Glándulas  
Estroma  
Mitosis  
Vacuolas en epitelio glandular  
Endometrio grosor  
Pinópodos

## **Funcionales**

### **Marcadores de receptividad endometria**

Receptor de progesterona  
Receptor de estrógenos  
Leukaemia inhibitory factor (LIF),  
Interleukinas (ILs),  
Prostaglandinas, cyclooxygenase-2 (COX-2),  
Transforming growth factor beta,  
Glicodelina,  
Factor Necrosis Tumoral alpha (TNF-a)  
Integrinas, Mucina-1 (MUC-1)

\*LNG no inhibe la adhesión de blastocitos in vitro en cultivo tridimensional de células de endometrio

*Swahn M-L y col. A Obstet Gynecol Scan 1996;75:738*

*Raymond E. y col. Hum Rep, 2000;11:2251*

*Marions L. y col. Obstet Gynecol 2002, 100:65*

*Meng C.-X. y col. Hum Rep, 2010;25 : 874*

*Palomino, WA y col. Fertil Steril 2010;94:1589*

*\*Lalitikumar y col Hum Reprod. 2007;22:3031*

*\*Meng C.-X. y col. Fertil Steril. 2009; 91:256*

# *Estudio in vitro*

Estudio realizado en Suecia y Dinamarca:

## Diseño

- Modelo tri-dimensional de endometrio creado co-cultivando células endometriales de estroma y epitelio de fase lútea temprana .
- Se examinó la expresión de marcadores de receptividad endometrial por inmuno-histoquímica .
- Se investigó el efecto de mifepristona y levonorgestrel sobre la viabilidad e implantación de blastocistos humanos.

## Resultados

- En el modelo se expresaron los factores involucrados en la receptividad endometrial.
- Ninguno de los 15 embriones cultivados con mifepristona se implantó ( $P < 0.01$ ).
- Se implantaron **10/17** en el grupo control y **6/14** embriones cultivados en el grupo con levonorgestrel (n.s.).

*Lalitkumar PG y cols. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model. Hum Reprod 2007 Sep 21.*

## *Conclusión del estudio in vitro*

El LNG no afecta la capacidad del endometrio de ser receptivo y no afecta la capacidad del embrión de hacer el "hatching", invadir el endometrio e implantarse.

**“El LNG no impide la implantación de embriones humanos en cultivos de endometrio”**

*Lalitkumar PG y cols. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model. Hum Reprod 2007 Sep 21.*

# *Administración post-ovulatoria de LNG en monas Cebus apella que se habían apareado el día anterior*

## Diseño

- Monas *Cebus apella* tratadas con LNG o vehículo 24 horas después del coito
- Ovulación diagnosticada por ecografía

*Ortiz y cols., Human Reproduction 19:1352-56, 2004.*

# *Administración post-ovulatoria de LNG en monas Cebus apella que se habían apareado el día anterior*

## Resultados

| Tratamiento | Preñadas/Apareadas |
|-------------|--------------------|
| Controles   | <b>13 / 24</b>     |
| LNG         | <b>13 / 24</b>     |

*Ortiz y cols., Human Reproduction 19:1352-56, 2004*

# ¿Qué pasa cuando las PAE LNG se administran antes o después de la ovulación?

## Estudios:

### ➤ *Novikova N y cols.*

99 casos analizados / 51 con riesgo de embarazo  
Ovulación diagnosticada por niveles hormonales en sangre.

*Contraception 75:112-8, 2007*

### ➤ *Noe G y cols.*

393 casos analizados / 148 con riesgo de embarazo  
Ovulación diagnosticada por ecografía transvaginal y niveles hormonales en sangre.

*Contraception 2010;81:414-20 y Contraception 2011;84:486-49.*

# ¿Qué pasa cuando las PAE LNG se administran antes o después de la ovulación?

| Administración de PAE LNG | Autor    | No. mujeres en riesgo de embarazo | Embarazos Esperados / Observados |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Antes de la ovulación     | Novikova | 34                                | 4.2 / 0                          |
|                           | Noé      | 103                               | 16.2 / 0                         |
| Después de la ovulación   | Novikova | 17                                | 3.5 / 3 *                        |
|                           | Noé      | 45                                | 8.7 / 8 *                        |

\*: no significativo

Novikova N y cols. *Contraception* 75:112-8, 2007: 99 casos analizados/51 con riesgo.


Noé y cols, *Contraception* 81:414-20 , 2010; *Contraception* 84:486-49, 2011: 393 casos analizados/148 con riesgo

# *Mecanismo de acción: Conclusiones*

Estos estudios muestran que:

- Las PAE LNG inhiben la ovulación.
- Las PAE LNG no alteran el endometrio ni inhiben la implantación.
- Las PAE LNG son muy efectivas para evitar el embarazo cuando se administran antes de la ovulación.
- En cambio, cuando se administran después de la ovulación, se observa el mismo número de embarazos que se hubiesen producido si no se administran.

# ¿Por qué el LNG previene solamente algunos embarazos?



## *Las PAE LNG no impiden la implantación*

Cuando se usan PAE LNG como anticoncepción de emergencia no se produce la fecundación y por lo tanto no se forma un embrión.

Si no hay embrión,  
no puede haber aborto.

## *DECLARACIÓN DE LA OMS SOBRE LA AE LNG (2005)*

“Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y no tienen efecto sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona cuando son administrados después de la ovulación”

# ***ANTICONCEPCION HORMONAL DE EMERGENCIA***

## ***CONCLUSION***

- La anticoncepción de emergencia es efectiva, segura y necesaria.
- Los datos disponibles permiten asegurar que no actúa después de la fecundación ni sobre la implantación, sino sobre etapas previas del proceso reproductivo.

# Referencias sobre mecanismo de acción de la AE con LNG (I)

- Croxatto HB, Ortiz ME, Muller L. Mechanism of action of emergency contraception. *Steroids* 68:1095-8, 2003
- Croxatto HB, Brache V, Pavéz M y cols. Pituitary-ovarian function following the standard levonorgestrel emergency contraception. *Contraception* 70:442-50, 2004.
- Croxatto HB. Condiciones en las que levonorgestrel previene o no logra prevenir el embarazo. XX Reunión de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana (ALIRH). Buenos Aires, Argentina 23-28.04.2007.
- Croxatto HB, Ortiz ME. Anticoncepción de emergencia con levonorgestrel. En: Selección de Temas en Ginecoobstetricia. Tomo II. E Guzman (ed). Publimpacto 2007. Santiago.
- Durand M, Cravioto MC, Raymond EG y cols. On the mechanism of action of short-term levonorgestrel administration in emergency contraception. *Contraception* 64:227-34, 2001.
- Durand M, Seppala M, Cravioto Mdel C, Koistinen H, Koistinen R, Gonzalez-Macedo J, Larrea F. Late follicular phase administration of levonorgestrel as an emergency contraceptive changes the secretory pattern of glycodeilin in serum and endometrium during the luteal phase of the menstrual cycle. *Contraception* 71:451-7, 2005.
- Gemzell-Danielsson K, Marions L. Mechanisms of action of mifepristone and levonorgestrel when used for emergency contraception. *Human Reproduction Update* 10:341-8, 2004.

# Referencias sobre mecanismo de acción de la AE con LNG (II)

- Gemzell-Danielsson K. Effects of levonorgestrel on ovarian function when used for emergency contraception. *Minerva Ginecol* 58:205-7, 2006.
- Kesserü E, Garmendia F, Westphal N, Parada J. The hormonal and peripheral effects of d-Norgestrel in post-coital contraception. *Contraception* 10:411-4, 1974.
- Hapangama D, Glasier AF, Baird DT. The effects of pre-ovulatory administration of the levonorgestrel on the menstrual cycle. *Contraception* 63:123-9, 2001.
- Lalitkumar PG, Lalitkumar S, Meng CX, Stavreus-Evers A, Hambiliki F, Bentin-Ley U, Gemzell-Danielsson K. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model. *Human Reproduction* Sep 21, 2007.
- Landgren BM, Johannisson E, Aedo AR, Kumar A, Yong-en S. The effect of levonorgestrel administered in large doses at different tages of the cycle on ovarian function and endometrial morphology. *Contraception* 39:275-89, 1989.
- Marions L, Cekan SZ, Bygdeman M, Gemzell-Danielsson K. Effect of emergency contraception with levonorgestrel or mifepristone on ovarian function. *Contraception* 69: 373-7, 2004.
- Marions L, Hultenby K, Lindell I y cols. Emergency contraception with levonorgestrel and mifepristone: mechanism of action. *Obstetrics and Gynecology* 100:65-71, 2002.

# *Referencias sobre mecanismo de acción de la AE con LNG (III)*

- Muller AL, Llados C, Croxatto HB. Postcoital treatment with levonorgestrel does not disrupt post-fertilization events in the rat. *Contraception* 67:415-9, 2003.
- Noe G, Croxatto HB, Salvatierra AM, Reyes V, Villarroel C, Muñoz C, Morales G, Retamales A. Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation. *Contraception* 81: 414-20, 2010.
- Noe G, Croxatto HB, Salvatierra AM, et al. Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation in 450 women. *Contraception* 2011, en prensa.
- Novikova N, Weisberg E, Stanczyk FZ, Croxatto HB, Fraser IS. Effectiveness of levonorgestrel emergency contraception given before or after ovulation - a pilot study. *Contraception* 75 (2):112-8, 2007.
- Okewole IA, Arowojolu AO, Odusoga OL, Oloyede OA, Adeleye OA, Salu J, Dada OA. Effect of single administration of levonorgestrel on the menstrual cycle. *Contraception* 75:372-7, 2007.
- Palomino A, Boric A, Gabler F y cols. Efecto de levonorgestrel como anticoncepción de emergencia sobre receptores de endometrio durante la ventana de implantación. Resúmenes de la XVIII Reunión de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana. Varadero, Cuba 28-31 Mayo, 2003.

# *Referencias sobre mecanismo de acción de la AE con LNG (IV)*

- Palomino WA, Kohen P, Devoto L. A single midcycle dose of levonorgestrel similar to emergency contraceptive does not alter the expression of the L-selectin ligand or molecular markers of endometrial receptivity. *Fertility and Sterility* 94: 1589-94 , 2010.
- Ugocsai G, Rozsa M, Ugocsai P. Scanning electron microscopic (SEM) changes of the endometrium in women taking high doses of levonorgestrel as emergency postcoital contraception. *Contraception* 66:433-7, 2002.
- Vargas M Tapia A, Henríquez S, Quezada M, Reyes P, Cárdenas H, Noe G, Salvatierra A, Gangi L, Monroe D, Velasquez L, Croxatto HB. Efecto de la administración postovulatoria de levonorgestrel sobre el perfil de expresión de 20.383 genes durante el período de receptividad endometrial analizado por microarreglos de ADN. XIX Reunión Bienal de la Asociación latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana ALIRH. Cartagena de Indias, Colombia Mayo 10-13 de 2006.
- Wilcox AJ, Weinberg CR, Baird DD. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. *New Engl J Med* 333:1517-21, 1995.
- Wilcox AJ, Weinberg, CR, Baird DD. Post-ovulatory ageing of the human oocyte and embryo failure. *Human Reproduction* 13: 394-7, 1998.