# **DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS**

Dra. Soledad Díaz Instituto Chileno de Medicina Reproductiva 2017



#### CONTENIDO DE ESTA PRESENTACION


- > DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU).
- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA ANTICONCEPTIVA Y LA SEGURIDAD DE LOS DIU.
- > CRITERIOS MÉDICOS DE LA OMS PARA EL USO DE LOS DIU.

#### **DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS**

Los dispositivos intrauterinos (DIU) son anticonceptivos reversibles y de largo plazo, efectivos y seguros para la mayoría de las mujeres.

Son usados por alrededor de 160 millones de mujeres en el mundo y por cerca del 30% de las mujeres que se atienden en el SNSS de Chile.


210.000.000 AQV 160.000.000 DIU 90.000.000 ACO



# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS DEFINICION

Un dispositivo intrauterino (DIU) consiste en un elemento pequeño y flexible de plástico, con cobre o con levonorgestrel, que impide el embarazo cuando se inserta dentro de la cavidad uterina.





#### TIPOS DE DIU

Liberadores de cobre:

T de cobre 380A (T-Cu)

Multiload 375 ®;

Nova T®

Flexi-T 300®

**GyneFix** ®





LevoNova (LNG-20)


Mirena® (T-LNG-20, contiene 52 mg de LNG)

Jaydess® (T-LNG-6, contiene 13,5 mg de LNG)






### DIU-LNG 13,5 mg vs DIU-LNG 52 mg



**JAYDESS®** 

- 13,5 mg
- Tamaño 28 x 30 mm
- Tubo de inserción de menor diámetro (3,8 mm)
- Menores niveles séricos de LNG
   ~ 160 pg/ml
- Anillo de plata visible para evaluación ultrasónica



#### **MIRENA®**

- 52 mg
- Tamaño 32 x 32 mm
- Tubo de inserción 4,4 mm con Evoinserter®
- Niveles séricos iniciales de LNG
   ~ 300 pg/ml

#### Comparación de la efectividad típica de los métodos anticonceptivos

#### Más efectivo









Esterilización femenina



Generalmente
2 o menos
embarazos por
cada 100
mujeres en un
año















Método de la Amenorrea de Lactancia- (MELA)



Condón masculino



Diafragma



Condón femenino



Métodos de abstinencia periódica



**Espermicidas** 

Menos efectivo

**Aproximadamente** 

30 embarazos por cada 100 mujeres

en un año

Adaptado de WHO 2006

#### EFICACIA DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Tasa de embarazos por 100 mujeres en los primeros 12 meses de uso

Método anticonceptivo	Uso correcto y consistente	Uso típico
Sin método	85	85
Implantes de progestágeno solo	0.05	0.05
Vasectomía	0.1	0.1
Inyectables combinados	0.1	3
Inyectable progestágeno solo (AMPD)	0.3	3
Esterilización femenina	0.5	0.5
Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel	0.2	0.2
Dispositivo intrauterino TCu 380A	0.6	0.8
Anticonceptivos orales de progestágeno solo (en lactancia)	0.5	1
Método de la amenorrea de lactancia (MELA)*	0.5	2
Anticonceptivos combinados orales	0.1	6-8
Anillo vaginal combinado y parche transdérmico combinado	0.5	6-8
Anticonceptivos orales de progestágeno solo (sin lactancia)	0.5	6-8
Condón masculino	2	15
Coito interrumpido	4	19
Diafragma con espermicida	6	16
Abstinencia periódica	1-9	25
Condón femenino	5	21
Espermicidas	18	29
0-1 Muy efectivo 2-9 Efectivo	10-30 Menos efectivo	

<sup>\*</sup> Tasa de falla en los primeros 6 meses posparto.

### DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS PREVENCIÓN DE EMBARAZO ECTÓPICO

#### **EMBARAZO**

METODO	INTRAUTERINO*	ECTÓPICO*	RAZÓN**
DIU Cobre	0.81	0.068	0.078
Ninguno	42.80	0.266	0.006

<sup>\*</sup> Tasas crudas por 100 años-mujer.

\* Razón Embarazos Ectópicos / Intrauterinos.
 Postmarketing Surveillance of NORPLANT, WHO / HRP. Contraception 63:167, 2001.

El DIU-LNG-20 es eficaz en la prevención del embarazo ectópico siendo las tasas de embarazo ectópico de 0.02 por 100 años-mujer.

French R y cols. Cochrane Database Syst Rev.; (3):CD001776.

#### MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS DIU CON COBRE

- El número de espermatozoides en la trompa esta reducido significativamente en usuarias de T-Cu. <sup>a</sup>
- Los huevos obtenidos de la trompa de Falopio después de un coito en el periodo fértil en usuarias de T-Cu no están fecundados. <sup>b</sup>
- La frecuencia con que se detecta HCG en la fase post-ovulatoria en usuarias de T-Cu es la misma que en mujeres no expuestas al riesgo de embarazo. c
- ➤No se han obtenido huevos del útero en usuarias de T-Cu entre 2 y 5 días después de la ovulación. d

Ortiz ME, Croxatto HB. Contraception; 75(6 Suppl):S16-30, 2007; <sup>a</sup> Aref y cols, 1983; Croxatto y cols, 1975; Koch, 1980; Settlage y cols, 1973; Tredway y cols, 1975; <sup>b</sup> Alvarez et al. Fertil Steril. 49: 768; 1988; Herrera et al. ALIRH May 93, Buenos Aires; <sup>c</sup> Wilcox y cols. Fertil Steril 44: 367, 1985 y 47: 265, 1987; <sup>d</sup> Croxatto. The Physiology and Genetics of Reproduction. 1974.

#### MECANISMO DE ACCION DE LOS DIU CON COBRE

# EL UNICO EFECTO DEMOSTRADO DEL DIU-CU EN LA MUJER ES LA INHIBICIÓN DE LA FECUNDACIÓN

# CON EL USO DEL DIU-CU EN LA MUJER NO SE PRODUCEN EMBRIONES

Ortiz ME, Croxatto HB. Contraception; 75(6 Suppl):S16-30, 2007.

# MECANISMO DE ACCIÓN DEL DIU CON LEVONORGESTREL (DIU-LNG 20)

- > Reduce la cantidad del moco cervical e inhibe la penetración de los espermatozoides.
- ➤ Inhibe la ovulación en el 55% de los ciclos.
- > Impide la fecundación.
- ➤ El DIU-LNG tiene además un claro efecto prefertilización por la presencia de Glicodelina A, potente inhibidor de la adhesión de espermatozoides a la zona pelúcida

# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS BENEFICIOS PARA LA SALUD

- > Son altamente eficaces desde la inserción
- > Tienen una duración prolongada
- No interfieren con el coito
- Hay un rápido retorno a la fecundidad después de la extracción
- No afectan la lactancia
- No hay interacción con drogas

**DIU con cobre:** no producen los efectos sistémicos de los anticonceptivos hormonales y son de bajo costo. Protección contra el cáncer de endometrio.

**DIU con LNG**: mejoría en anemia, menorragia y endometriosis, control de miomas uterinos y adenomiosis. Posible protección ontra hiperplasia de endometrio.

# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS RECUPERACION DE LA FERTILIDAD

Después del retiro del DIU, la tasa de embarazo por 100 mujeres es alrededor de:

80 a los 12 meses

90 a los 2 años

semejante a las tasas de embarazo de mujeres que no han usado anticoncepción o que discontinúan píldoras anticonceptivas.

Sivin I y col. Am J Obstet Gynecol 166:1208, 1992.

# DIU Y CÁNCER

 Se encontró una disminución en el riesgo de cáncer de endometrio en usuarias de DIU\* en nueve estudios de casos y controles :

OR combinada ajustada 0,6 (IC 95%=0,4-0,7).

- No se encontró asociación entre uso de DIU y otros tipos de cáncer.
- \* Con cobre o no especificado


#### **DIU Y SANGRADO UTERINO**

Los DIU con levonorgestrel reducen el sangrado uterino y son una alternativa para mujeres que quieren usar un DIU y tienen sangrados excesivos con los DIU con cobre.





# Patrones de sangrado en usuarias de DIU-LNG 13,5 mg vs 52 mg



# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS CON COBRE TASA DE EVENTOS DE SALUD<sup>1</sup>

EVENTO	DIU	NORPLANT	
Hipertensión			
clínica	0.4	0.7	
límite	0.3	0.6	
Migraña/cefalea	2.1	11.5	
Alteraciones psíquicas	1.2	2.8	

Postmarketing Surveillance of NORPLANT, WHO / HRP. Contraception 63:167, 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Por 1000 años-mujer La incidencia de estos eventos es menor en las usuarias de DIU

# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS EFECTOS ADVERSOS

#### La inserción de un DIU puede asociarse a:

- ➤ Infecciones, especialmente en el primer mes pos inserción o si se produce un embarazo con el DIU in situ
- Expulsión (parcial o completa; advertida o no)
- Una inserción inadecuada puede producir una perforación uterina
- > Dolor

# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS EFECTOS ADVERSOS

El uso de un DIU con cobre puede asociarse a:

Sangrados excesivos o irregulares o más dolorosos

El uso de un DIU con levonorgestrel puede asociarse a:

- > Alteración del patrón de sangrado
- Quistes funcionales ováricos
- > Acné o aumento de vello en áreas dependientes de andrógenos

# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS TASA DE INFECCIONES PELVICAS (IP)

- La tasa de incidencia de IP en usuarias de DIU varía entre 1 por 100 y 1 por 1.000 años-mujer en diferentes estudios, significativamente mayor que en usuarias de anticoncepción hormonal.
- Las diferencias dependen de la definición usada, de los medios disponibles para diagnosticar IP y de la población estudiada.

Factores que modifican el riesgo de presentar una IP, tanto en las usuarias de DIU como en las no usuarias:

- Número de parejas sexuales de la mujer y de su/s compañero/s
- > Prevalencia de ETS en la comunidad
- Edad de la mujer

# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS TASA DE INFECCIONES PELVICAS

TIEMPO POST- INSERCION	TASA*	
Todo	1.6	
Primeros 20 días	9.7	
Mas de 20 días	1.4	

<sup>\*</sup> Tasa cruda por 1000 años-mujer Farley y col. Lancet 339:785, 1992

#### DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS TASA DE INFECCIONES PÉLVICAS

El riesgo es 6 veces mayor en el primer mes después de la inserción de un DIU que en el período posterior.

Se desconoce si el riesgo de presentar una IP después del primer mes de inserción del DIU es mayor en las usuarias que en las no usuarias de DIU; sin embargo, si es mayor, el incremento sería pequeño.

# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS CON COBRE TASA DE EVENTOS DEL TRACTO GENITAL<sup>1</sup>

EVENTO	DIU	NORPLANT
Cervicitis	4.3	2.5
Vaginitis	22.1	14.5
Leucorrea	3.1	1.7
Dismenorrea	3.3	1.5
<b>Dolor/otros</b>	1.1	0.5

Postmarketing Surveillance of NORPLANT, WHO / HRP. Contraception 63:167, 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Por 1000 años-mujer La incidencia de estos eventos es mayor en las usuarias de DIU

# COMPARACIÓN ENTRE T-CU Y T-LNG TASAS ACUMULADAS DE TERMINACION A LOS 5 AÑOS

	DIU	
RAZON	T-Cu 380Ag	T LNG-20
Embarazo	1.4	1.1
Expulsión	7.4	11.8*
Amenorrea	0.4	19.7*
Sangrado / dolor	23.3	15.4*
Otras médicas	16.2	16.6
Deseo de embarazo	23.5	25.9
<b>Otras personales</b>	9.4	9.5
Continuación	40.6	33.0
No. de mujeres	1121	1124
Años - mujer	3189	2912

<sup>\*</sup> Diferencia estadísticamente significativa

# COMPARACIÓN ENTRE DIU CON CU Y DIU CON LNG ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)





Contraception

Contraception 93 (2016) 498 - 506

Original research article

Safety and efficacy in parous women of a 52-mg levonorgestrel-medicated intrauterine device: a 7-year randomized comparative study with the TCu380A \*\*, \*\*\*\*\*\*

Patrick Rowe<sup>a</sup>, Tim Farley<sup>a</sup>, Alexandre Peregoudov<sup>a</sup>, Gilda Piaggio<sup>b</sup>, Simone Boccard<sup>a</sup>, Sihem Landoulsi<sup>c</sup>, Olav Meirik<sup>d,\*</sup>

for the IUD Research Group of the UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research; Development and Research Training in Human Reproduction <sup>1</sup>

<sup>a</sup>UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, Geneva, Switzerland <sup>b</sup>Medical Statistics Department, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK <sup>c</sup>Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland <sup>d</sup>Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER), Santiago, Chile

Received 16 February 2016; accepted 17 February 2016







# IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE LA OMS

- El estudio se hizo en 20 centros en Asia, Europa, North África del Norte América del Sur (11 centros en China)
- ➤ Admisiones desde Mayo 1993 a Oct 1998.


Grupo	LNG-IUD	TCu380A
Mujeres asignadas	1,922	1,914
Fallas inserción	12	3
Seguimiento	1,884	1,871
Completaron 7 años	398 (21%)	682 (36%)
Mujeres chinas	<b>79%</b>	81%




#### **EMBARAZOS**




## **RETIROS DEL DIU**



#### RETIROS DEL DIU POR AMENOREA



#### RETIROS DEL DIU POR SANGRADO EXCESIVO



# COMPARACIÓN DE DATOS CLÍNICOS DIU-LNG 13,5 MG VS DIU-LNG 52 MG

Λ	/D	FCC®
		LJJ

Solo indicación anticonceptiva

Altamente efectivo durante 3 años

0,9 % falla acumulativa en 3 años

5,9 % de quistes ováricos funcionales\*

12,7 % usuarias en amenorrea \*

**Eventos adversos similares** 

Inserción fácil 94,0 % \*

Dolor inserción no más que ligero 72,3 % \*

#### **MIRENA®**

Anticoncepción, SUA y protección TRH

Altamente efectivo durante 5 años

0,7% falla acumulativa en 5 años

22 % de quistes ováricos funcionales \*

23,6 % de usuarias en amenorrea \*


**Eventos adversos similares** 

Inserción fácil 86,2 % \*

Dolor inserción no más que ligero 57,9 % \*

\*Diferencia significativa en estudio Fase II.

# COMPARACIÓN DE DOSIS DIARIA DE LIBERACIÓN DE LNG IN VIVO (μ /24 HR): DIU-LNG 13,5 mg y DIU-LNG 52 mg



# DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS LIMITACIONES PARA EL USO

#### Se requiere:

- Un/a profesional de salud capacitado/a para su inserción y extracción
- > Examen ginecológico previo
- Evaluación del riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS)

Su uso no es controlado por la mujer quien depende de un/a proveedor/a para su inserción y extracción.

#### DIU Y RIESGO DE ITS Y VIH


Los DIU no protegen contra las infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH.

Sólo el condón masculino protege en forma efectiva.



# RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL USO DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS

Criterios Médicos de Elegibilidad (CME) y Recomendaciones sobre Practicas Seleccionadas (RPS) para el Uso de Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) www.who.int.reproductive-health.





### CATEGORIAS USADAS EN CONSENSO

### Si una condición se clasifica en:

- Categoría 1: No hay limitaciones para el uso del método
- Categoría 2: Las ventajas de usar el método superan los posibles riesgos
- Categoría 3: Los posibles riesgos superan las ventajas de usar el método
- Categoría 4: El uso del método representa un riesgo inaceptable para la salud

### CATEGORIA 4 PARA LOS DIU

#### No debe usarse un DIU:

- > Embarazo en curso
- ➤ Aborto séptico y sepsis puerperal reciente
- > Enfermedad inflamatoria pélvica activa
- Cervicitis purulenta, o infección por clamidia o gonorrea







### CATEGORIA 4 PARA LOS DIU

### No debe usarse un DIU:

- Cáncer endometrial
- Cáncer cervical
- Anormalidades severas de la cavidad uterina o fibromas que la distorsionen







### CATEGORIA 4 PARA LOS DIU

### No debe usarse un DIU:

- > Sangrado vaginal anormal que sugiere una patología importante
- Enfermedad trofoblástica maligna
- > Tuberculosis pélvica







### CATEGORIA 3 PARA LOS DIU

Sólo puede usarse un DIU si no hay alternativa y bajo estricta vigilancia médica:

- Cáncer del ovario
- Enfermedad clínica por VIH severa o avanzada (categorías 3 y 4 de la OMS) (inicio)
- El riesgo de ITS y el uso de terapia antiretroviral pueden estar en categoría 3 o 2 por lo que hay que usar criterio clínico de evaluación







### CATEGORIA 3 PARA LOS DIU

Sólo puede usarse un DIU si no hay alternativa y bajo estricta vigilancia médica:

- ➤ Intervalo entre las 48 horas y las primeras 4 semanas después del parto
- > Enfermedad trofoblástica benigna
- Casos de violación con riesgo de infección







### CATEGORIA 2 PARA LOS DIU

Situaciones que requieren manejo especial (ejemplos):

- Mujeres menores de 20 años o nuligestas, por mayor riesgo de expulsión del DIU y de infecciones pélvicas
- Posparto inmediato (24 horas)
- Portadoras de cardiopatía valvular (riesgo de endocarditis bacteriana)







#### CATEGORIA 2 PARA LOS DIU

# Situaciones que requieren manejo especial (ejemplos):

- Vaginitis por tricomonas o vaginosis bacteriana
- Otras ITS (hepatitis)
- VIH (o riesgo de infección)
- > SIDA en terapia







### **CATEGORIA 2 PARA LOS DIU**

# Situaciones que requieren manejo especial (ejemplos):

- **Endometriosis**
- Historia de infección pelviana sin embarazo posterior
- Dismenorrea severa
- > Anemia (no se aplica a T-LNG)
- Otras anomalías de cavidad uterina







### CATEGORIAS PARA DIU CON LEVONORGESTREL

Se aplican las mismas categorías que para los DIU con cobre más las categorías de los anticonceptivos hormonales de progestágeno solo.





# CATEGORÍA 4 PARA DIU CON LEVONORGESTREL

Cáncer de mama actual





# CATEGORÍA 3 PARA DIU CON LEVONORGESTREL

- >Trombosis venosa profunda actual
- Embolía pulmonar actual
- Sangrados vaginales inexplicados
- > Antecedente de cáncer de mama





# CATEGORÍA 3 PARA DIU CON LEVONORGESTREL

- Cirrosis descompensada
- Tumores hepáticos: adenoma hepatocelular; hepatoma (maligno)
- Migraña con aura si aparece durante el uso del método
- Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos (+) o si se desconoce la presencia de estos

### CATEGORIA 3 PARA LOS DIU LNG

- > TVP/TP aguda
- Cardiopatía isquémica (enfermedad actual o historia) (continuación)
- Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos anti fosfolípidos positivos o valor desconocido
- Migraña con aura a cualquier edad (continuación)
- Cáncer de mama pasado y sin evidencia de enfermedad activa durante 5 años





### CATEGORIA 3 PARA LOS DIU LNG

Sólo puede usarse un DIU LNG si no hay alternativa y bajo estricta vigilancia médica:

- Cirrosis grave descompensada
- > Tumores del hígado benignos (adenoma hepatocelular)
- > Tumores del hígado maligno (hepatoma)





CONDICIÓN	AOC/PAC/AVC	AIC	AOPS	AMPD EN-NET	Implantes de LNG/ETG	DIU-Cu		DIU-LNG					
I=Inicio, C=Continuación, LM=Lactancia materna, NA=No aplica													
INFECCIONES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTIVO													
PATRONES DE													
SANGRADO VAGINAL								'	С				
Patrón irregular sin	1	1	1	1	1	1		1	1				
sangrado abundante	1	1	1	1	_			1	1				
b) Sangrado abundante													
o prolongado	1*	1*	2*	2*	2*	2*		1*	2*				
(incluyendo patrones													
regulares e irregulares)													
SANGRADO VAGINAL						1	С	ı	С				
DE ETIOLOGÍA						·	•	·					
DESCONOCIDA													
(sospecha de una	2*	2*	2*	3*	3*	4*	2*	4*	2*				
condición grave)													
Antes de la evaluación													
ENDOMETRIOSIS	1	1	1	1	1	2		1					
TUMORES OVÁRICOS	1	1	1	1	1	1		1					
BENIGNOS	1	1	1	1	1	1		1					
DISMENORREA SEVERA	1	1	1	1	1	2		1					
ENFERMEDAD													
TROFOBLÁSTICA													
GESTACIONAL													
a) Niveles reducidos o													
indetectables de βhCG	1	1	1	1	1	3		3					
b)Niveles													

CONDICIÓN	AOC/PAC/AVC	AIC	AOPS	AMPD EN-NET	Implantes de LNG/ETG	DIU-Cu		DIU-LNG					
I=Inicio, C=Continuación, LM=Lactancia materna, NA=No aplica													
Neoplasia intraepitelial cervical	2	2	1	2	2	1		2					
CÁNCER CERVICAL (en espera de tratamiento)	2	2	1	2	2	4	C 2	1 4	C 2				
ENFERMEDADES DE LA MAMA													
d)Cáncer de mama													
(i) actual	4	4	4	4	4	1		4					
(ii) pasado y sin evidencia de enfermedad activa durante 5 años	3	3	3	3	3	1		3					
CÁNCER DE ENDOMETRIO	1	1	1	1	1	1 4	C 2	1 4	C 2				
CÁNCER DE OVARIO	1	1	1	1	1	ا 3	C 2	1 3	C 2				
FIBROMAS UTERINOS													
b) Con distorsión de la cavidad uterina	1	1	1	1	1	4		4					
ANOMALÍAS ANATÓMICAS													
a) Distorsionan la cavidad uterina						4		4					
b) No distorsionan la						2		2					

### **CONCLUSIONES**


- Los dispositivos intrauterinos son métodos anticonceptivos seguros y eficaces.
- Pueden usarlos la mayoría de las mujeres.
- Es necesario hacer una buena evaluación de las potenciales usuarias para:
  - descartar contraindicaciones y factores de riesgo (categorías 4 y 3)
  - evaluar situaciones especiales (categoría 2)

### **CONCLUSIONES**

- ➤ Una correcta técnica de inserción permite reducir el riesgo de infecciones y perforación
- La calidad de los servicios influye en las tasas de continuación y en la satisfacción de las usuarias.

### PARA EL USO SEGURO DE LOS DIU SE DEBEN SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE:

- Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud de Chile www.minsal.cl
- Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de Anticonceptivos de la OMS www.who.int.reproductive-health







## Muchas gracias por su atención

www.icmer.org

www.anticoncepciondeemergencia.cl

www.infojoven.cl